

Catàleg de flora vascular del municipi de Setcases (Catalunya)

XAVIER OLIVER

xvioliver@gmail.com

Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural

Rebut: 26.10.2021

Acceptat: 30.10.2021

RESUM

Es presenta la llista de plantes vasculares del municipi de Setcases (El Ripollès, Catalunya) (nord-est de la península Ibèrica) en base a les referències publicades existents i el treball de camp dels últims 40 anys de l'autor. La llista consta de 1315 tàxons dels quals 1234 són autòctons, 22 híbrids, i 59 al·lòctons. D'aquests al·lòctons, 19 són invasors del medi natural, 32 són tàxons espontanis naturalitzats en ambients condicionats per l'acció humana i 8 accidentals, amb poblacions poc viables.

Es comenta per a cada tàxon els sinònims habituals, els noms comuns en català, castellà, francès i anglès. Els ambients on normalment es troben, el desnivell altitudinal, la seva raresa i fenologia.

La flora vascular detectada al municipi representa el 37,52% de la flora vascular detectada a Catalunya, el 35,54% dels tàxons controlats als Pirineus i el 62,08% de la flora de la comarca del Ripollès.

Paraules clau: Setcases, Catalunya, flora vascular, catàleg.

ABSTRACT

The list of vascular plants of the municipality of Setcases (El Ripollès, Catalonia) is presented (northeast of the Iberian Peninsula) based on existing published references and the author's fieldwork of the last 40 years. The list consists of 1315 taxa of which 1234 are autochthonous, 22 hybrid, and 59 allochthonous. Of these allochthons, 19 are invaders of the natural environment, 32 are spontaneous taxa naturalized in environments conditioned by human action and 8 accidental, with populations that are not very viable. The environments where they are normally found, the altitudinal difference, their rarity and phenology.

The vascular flora detected in the municipality represents 37.52% of the vascular flora detected in Catalonia, 35.54% of the taxa monitored in the Pyrenees and 62.08% of the flora of the Ripollès region.

Keywords: Setcases, Catalonia, vascular flora, checklist.

INTRODUCCIÓ

Setcases és un municipi de la comarca del Ripollès, província de Girona, de 49,1 km² de superfície amb 181 habitants (IDESCAT, 2006) i que limita al nord amb França, i en ple Pirineu oriental.

El municipi presenta un relleu muntanyós amb un desnivell important des dels 1200 fins als 2881 m (Pic de Bastiments) amb nombrosos cims de més de 2500 m, i on podem diferenciar tres estatsge altitudinals amb un clima i una vegetació ben diferenciada:

- Estatge montà, entre 1.200 i 1.600(1.800) m, amb una vegetació mediterrània amb un domini dels boscos caducifolis (rouredes de roure de fulla gran, fagedes, freixenedes, bedollars i boscos de ribera), prats montans i conreus.
- Estatge subalpí, entre 1.600 (1.800) i 2.300 m, amb una vegetació similar a la taigà del nord d'Europa i als estatges subalpins de les muntanyes alpines del continent, amb boscos de pi roig, de pi negre, i d'avets, matollars de neret, ginebró i bàlec, i prats.
- Estatge alpí, per sobre dels 2.200 (2.400) m, amb una vegetació només formada per prats, tarteres i rocams, amb plantes molt especialitzades en les condicions climàtiques existents, relacionades sovint amb plantes dels estatges alpins de les serralades europees i la tundra àrtica.




Figura 1. Àmbit de territori objecte del catàleg (municipi de Setcases).

METODOLOGIA

El llistat comentat de la flora vascular de Setcases s'ha elaborat a partir de les referències publicades i de la feina de camp realitzada per l'autor en els últims 40 anys.

Les referències més utilitzades són per una banda obres sintètiques (Cadevall, 1913-1937; Bolòs & Vigo, 1984-2001; Bolòs et *al.*, 2005; Sáez & Aymerich, 2021 i Font, 2021) i per altra articles de diferents autors que han estudiat la zona (Companyó, 1864; Gautier, 1989; Bubani, 1897-1902 Vayreda, 1880-1931; Sennen 1913-34; Susplugas, 1942; Braum-Blanquet, 1945-1948, Vigo, 1983), i finalment articles de citacions puntuals o revisions taxonòmiques. En general, en totes aquestes obres, la majoria realitzades ja fa anys, les citacions són poc precises, de manera que és difícil determinar la ubicació concreta per retrobar la localitat i en molts casos fins i tot no es pot saber si la citació és a dins de l'àmbit de l'estudi. Un exemple són les citacions del Costabona realitzades per Companyó i Vayreda. En els casos d'espècies que no han aparegut en els nostres treballs les hem fet constar com a espècies citades a prop, i en el cas de ser determinacions errònies també s'ha fet constar.

El treball de camp de l'autor correspon a diversos projectes de recerca desenvolupats a l'àmbit del catàleg, entre ells l'elaboració del catàleg de flora vascular de la comarca del Ripollès (Oliver, 2021), de les llistes vermelles de la flora vascular del Ripollès (Oliver 2013, 2017, 2021), del catàleg d'hàbitats de la Garrotxa i del Ripollès (Oliver, 2021), i dels programes de seguiments d'espècies amenaçades, i d'hàbitats (Oliver, 2021).

RESULTATS

El catàleg consta de 1315 tàxons amb presència al municipi, dels quals 22 corresponen a híbrids, 59 tàxons al·lòctons, dels quals 8 tàxons es consideren accidentals, amb poblacions poc viables, 32 tàxons subespontanis que mantenen poblacions en llocs amb una pressió antròpica important, i 19 espontanis, aquests últims invasors dels hàbitats seminaturals i naturals del municipi.




Figura 2. Proporció de tàxons autòctons, híbrids i tàxons al·lòctons en el catàleg,




Figura 2. Proporció de tàxons al·lòctons subespontanis accidentals, al·lòctons espontanis que només colonitzen ambients molt pertorbats per l'acció antròpica, i al·lòctons espontanis invasors d'ambients naturals.

EL CATÀLEG

La flora vascular del municipi de Setcases consta fins al moment de 1.308 plantes que creixen espontàniament. A continuació s'esmenten els tàxons controlats fins al moment.

Els tàxons s'han ordenat en grans grups:

- Els Pteridòfits.
- Les Gimnospermes.
- Les Angiospermes:
 - * Les dicotiledònies.
 - * Les monocotiledònies.

Dins de cada grup, per facilitar la consulta i cerca, les famílies s'han ordenat alfabèticament, i els tàxons també:

- Autòctons en negreta.
- Al·lòctons amb poblacions naturalitzades viables (espontànies) sense negreta: poden ser espontanis només en ambients molt afectats per l'activitat humana (AL/ESP) o espontanis molt invasors dels ambients naturals i seminaturals (AL/INV).
- Al·lòctons adventicis (subespontanis) (AL/SUB): aquells escapats però amb poblacions no viables.
- Citats al municipi però no confirmats, a prop dels límits del municipi o citats erròniament, en lletra més petita i en gris.

De cada tàxon del catàleg es detalla:

1. NOM CIENTÍFIC, en general se segueix Sáez & Aymerich, 2019.
2. SINÒNIMS utilitzats normalment o en referències utilitzades [entre claudàtors].
3. NOM COMÚ en català. En castellà. En francès. En anglès.

4. Els HÀBITATS principals de cada tàxon:

- BOSC boscos: (cad) caducifolis, (per) perennifolis, (h) humits, (s) secs, (br) boscos de ribera.
- MAT matollars: (b) bardisses, (n) de neret, (g) de gòdua, (bg) de bàlec i ginebró.
- HERB herbassars: (h) humits, (s) secs, (m) megafòrbies, vorades (v).
- AQUA aquàtiques: (j) jonqueres, (f) fontinals (rierols), (cr) creixenars, (m) mulleres, (c) congestes, (b) basses, (t) torrents.
- PRAT: prats (h) humits i de dall, (s) prats secs, (a) anuals, sòls prims, sobre roques amb poc sòl.
- ROC: ambients rupícoles (m) murs, (r) rocams, (t) tarteres i (c) codolars.
- RUD: ambients ruderals (h) humits, (s) secs, (t) trepitjats.
- ARV: arvenses (camps, conreus i horts).

Els hàbitats, poden anar acompanyats a més de (si) substrats silicis, (ca) substrats calcaris, i (ac) substrats àcids, (r) substrats rocallosos.

5. ALTITUD, amb l'interval altitudinal on s'ha detectat.

6. ABUNDÀNCIA, entre rrr (raríssim amb molt poques localitats) fins a ccc (molt abundant per tot arreu).

7. FENOLOGIA, interval de mesos on s'ha detectat floració (I-XII).

8. Altres comentaris d'interès, com planta amenaçada (AME), protegida (PRO), al·lòctona (AL), i s'especifica si és subespontània (SUB), espontània d'ambients antropitzats (ESP) i espontània invasora d'ambients naturals (INV). En alguns casos s'indica ER, quan s'han eliminat les exemplars detectats.

Divisió PTERIDOFITA

Classe Equisetatae

Equisetaceae

- Equisetum arvense* L. Cua de cavall. Cola de caballo. Prêle des champs. Common horsetail. AQU/ARV. 1200-1680 m. rr. III-V.
- Equisetum hyemale* L. Cua de cavall. Rabo de raposo. Prêle d'hiver. Dutch rush. BOSC(br)/AQUA(h). 1230 m. rrr. VI. AME.
- Equisetum palustre* L. Cua de cavall. Cola de caballo. Prêle des marais. Marsh horsetail. BOSC(br)/AQU. 1250-1350 m. rrr. V-VI.
- Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum* Cua de cavall. Cola de caballo. Prêle rameuse. Branched horsetail. ROC(m). 1300 m. rrr. IV-V.
- Equisetum telmateia* Ehrh. Cua de cavall. Cola de caballo. Grande Prêl. Great Horsetail. HERB(h). 1220-1450 m. rrr. V.
- Equisetum xmoorei* Newman BOSC(br). 1230-1550 m rrr. VI.

Classe Filicetes

Lycopodiaceae

- Huperzia selago* (L.) Schrank & C.F.P. Mart. [*Lycopodium selago* L.] -. -. Lycopode sélagine. Northern firmoss. BOSC/MAT(ac). 1500-2600 m. rr. VII-IX.

Selaginellaceae

- Selaginella selaginoides* (L.) Schrank & C.F.P. Mart. Licopodi comú. Licopódio selago. Sélaginelle spinuleuse. Lesser clubmoss. AQU(m,f). 1450-2400 m. rr. VI-IX.

Classe Lycopodiatae

Aspleniaceae

- Asplenium adiantum-nigrum* L. [*A. adiantum-nigrum* subsp. *adiantum-nigrum*] Falzia negra. Culantrillo negro. Falzia negra. Doradille noire/Capillaire noir. Black spleenwort BOSC/ROC. 1200-2200 m. c. VI-VIII.
- Asplenium fontanum* (L.) Bernh. subsp. *fontanum* Falguereta de cingle. Culantrillo blanco menor. Asplénium des fontaines. -. ROC(h). 1100-1500 m. rr. V-XI. 1200-1500 m. cc.
- Asplenium quadrivalens* (D.E.Meyer) Landolt [*A. trichomanes* L. subsp. *quadrivalens* D.E. Meyer] Falzia roja. Culantrillo menor. Capillaire des murailles. Maidenhair spleenwort. ROC. 1200-2000 m. c. V-XI.
- Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. Falzia prima. Culantrillo del norte. Doradille du nord. Forked spleenwort. ROC. 1200-2500 m. cc. IV-IX.
- Asplenium x murbeckii* Drfl. in Oesterr. [*A. ruta-muraria* subsp. *ruta-muraria* x *A. septentrionale* subsp. *septentrionale*] ROC(m). 1200-1450 m. rrr. VI-VII.
- Asplenium ruta-muraria* L. subsp. *ruta-muraria* Falzia blanca. Culantrillo blanco. Rue des murailles. Wallrue. ROC. 1200-1500 m. cc. IV-XI.
- Asplenium viride* Huds. [*A. trichomanes-ramosum* L.] Falzia verda. Culantrillo verde. Asplénium vert. Brightgreen spleenwort. ROC. 1200-2700 m. r. VII-IX.
- Asplenium trichomanes* L. Falzia roja. Culantrillo menor. Capillaire des murailles. Maidenhair spleenwort. ROC. 1200-2000 m. c. V-XI.

Athyiaceae

Athyrium filix-femina (L.) Roth Falguera femella. Helecho hembra. Fougère femelle. Lady fern. BOSC/HERB(h). 1200-2500 m. cc. V-IX.

Athyrium distentifolium Opiz BOSC(t)/ROC(t,h) 2100-2160 m. rrr. AME.

Blechnaceae

Struthiopteris spicant (L.) F.W. Weiss subsp. *spicant* [*Blechnum spicant* (L.) Roth subsp. *spicant*] Blècnum. Lonchite. Blechne. Deer fern. ROC(r,t). 1420-2100 m. r. VII-IX.

Cystopteridaceae

Cystopteris alpina (Lam.) Desv. [*Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. subsp. *alpina* (Lam.) Hartman] -. Helecho frágil. Capillaire blanc. -. ROC(r). 2530-2680 m. rrr. VII-VIII. AME.

Cystopteris fragilis (L.) Schott subsp. *fragilis* (Fomin) O. Bolòs et J. Vigo Falguera frágil. Helecho frágil. Capillaire blanc. -. ROC(r,m,t). 1200-2800 m. cc. VII-X.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman Gimnocarpi silicícola. Gimnocarpio glabro. Polypode dryoptère. -. BOSC(h), MAT(n)(si). 1540-2450 m. c. VII-X.

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman Gimnocarpi calcícola. Gimnocarpio glanduloso. Polypode de robert. -. ROC(t)(ca). 1600-2280 m. c. VII-IX.

Dennstaedtiaceae

Pteridium aquilinum (L.) Kunhn subsp. *aquilinum* Falguera, falguera comuna. Helecho común. Grande fougère. Bracken. BOSC/MAT/PRAT(h)(ac). 1200-1880 m. cc. VI-IX.

Dryopteridaceae

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. *affinis* [*D. pseudomas* (Wollaston) Holub & Pouzar] Falguera mascle. BOSC(h). 1220 m. rrr.

Dryopteris borrieri (Newman) Oberh. & Tavel [*D. affinis* subsp. *borrieri* (Newman) Fraser-Jenk.] Falguera mascle. Helecho macho. Fougère mâle. Male fern. BOSC(h). 1240-1450 m. rrr. V-X.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray Falguera austriaca. -. Fougère dilatée. -. BOSC(h). 1400-2200 m. r. V-IX.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott [*D. filix-mas* subsp. *filix-mas*] Falguera mascle. Helecho macho. Fougère mâle. Male fern. BOSC/HER(h,m). 1220-2000 m. cc. VI-IX.

Dryopteris oreades Fomin [*D. filix-mas* (L.) Schott subsp. *oreades* (Fomin) O. Bolòs et Vigo]. -. Helecho macho caucásico. -. -. ROC(t,r). 1720-2400 m. c. VIII-X.

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy [*D. carthusiana* (Villar) H.P. Fuchs subsp. *assimilis* (Walker) O. Bolòs et al.; *Polystichum spinulosum* DC.] Drioptéride pàlida. Dryoptéris élargi. -. BOSC(h). 1400-1525 m. rr. VII-IX.

Polystichum aculeatum (L.) Roth Falguera vera. Polístico común. Polystic à aiguillons. Hard shield fern. ROC. 1340-1800 m. rr. VII-IX.

Polystichum lonchitis (L.) Roth Polístic pirinenc. Polístico de montaña. Polystic en fer de lance. -. ROC(t,r). 1500-2600 m. r. VIII-IX.

Polypodiaceae

Polypodium vulgare L. (*P. vulgare* subsp. *vulgare*) Polipodi. Polipodio. Polypode commum. Common polypodi. ROC(r,m)/BOSC(h). 1200-2250 m. c. VII-X.

Pteridaceae

Cryptogramma crispera (L.) R. Br. -. Alosuro. Cryptogramme crispée. -. ROC(t,si). 1780-2800 m. c. VII-VIII.

Thelypteridaceae

Phegopteris connectilis (Michaux) Watt [*Thelypteris phegopteris* (L.) Slosson; *Polypodium phegopteris* L.] -. -. Fougère-à-moustache Petite. Beech Fern. BOSC(h). rrr. VII-VIII. AME

Woodsiaceae

Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray -. -. Woodsie dels Alps. -. ROC(r). 2050-2760 m. rr. VII-VIII. PRO.

Classe Psilotopsida

Ophioglossaceae

Ophioglossum vulgatum L. Llagues de crist. Lengua de serpente. Ophioglosse commun. Adder's tongue. 1260 m. rrr. VI.

Botrychium lunaria (L.) Swartz Herba de les llunetes/Llunària. Lunaria. Botryche lunaire. Common moonwort. PRAT(h). 1320-2650 m. c. VI-IX.

Botrychium matricariifolium (Retz.) Koch -. -. Botryche à feuilles de camomille. Chamomile grape-fern. BOSC(h)(si). 1500 m. rrr. VI. PRO.

DIVISIÓ SPERMATOPHYTA

CLASSE GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Juniperus communis L. subsp. *communis* (Suter) Celak. Ginebre. Enebro. Genévrier commun. Common juniper. BOSC/MAT/PRAT. 1200-1800 m. cc. VI-VIII.

Juniperus communis L. subsp. *nana* Syme [*J. communis* subsp. *alpina* (Suter) Celak] Ginebró. Enebro rastrero. Genévrier nain. -. BOSC/MAT/PRAT. 1600-2780 m. cc. VII-VIII.

Pinaceae

Pinus sylvestris L. Pi roig. Pino albar. Pin sylvestre. Scots pine. BOSC. 1200-1720 m. cc. V-VI.

Pinus uncinata DC. [*Pinus mugo* Turra subsp. *uncinata* (Ramond ex DC. in Lam. et DC.) Domin] Pi negre. Pino negro. Pin à crochets. Mountain pine. BOSC. 1400-2600 m. ccc. V-VI.

Pinus x rhaetica Brügger [*P. sylvestris* x *P. uncinata*] 1450-1680 m. c.

Picea abies (L.) H. Karst. Pícea. Pícea. Épicea. Norway spruce. 1400-1700 m. rr. AL/SUB.

Abies alba Mill. Avet. Abeto. Sapin. Silver fir. BOSC(h). 1320-2000 m. c. V.

CLASSE ANGIOSPERMAE

SUBCLASSE DICOTILEDÒNIES

Adoxaceae

Sambucus nigra L. subsp. *nigra* Sabuc, saüc. Saüco. Sureau noir. Common elder. BOSC. 1200-1600 m. ccc. V-VI.

Sambucus racemosa L. Sabuc, saüc racemós. Saüco de montaña. Sureau de montagne. Red elder. BOSC(h). 1300-2000 m. V-VI.

Sambucus ebulus L. . Èvol, saüc pudent. Saüco menor. Hièble. Dwarf elder. 1200-1680 m. RUD. cc. V-VII.

Viburnum lantana L. Cartellatge, tortellatge. Lantana. Lantane,. Wayfaring tree. BOSC(s). 1200-1660 m. c. V-VII.

Amarantaceae

- Amaranthus deflexus* L. Amarant deflex. Bledo rastrero. Amarante couchée. Largefruit amaranth. RUD(t). 1200-1240 m. rr. VIII. AL/ESP.
- Amaranthus hybridus* L. Amarant. Amaranto. Amarante hybride. Green amaranth. ARV,RUD. 1200 m. rrr. VIII-IX. AL/ESP.
- Amaranthus retroflexus* L. Amarant. Amaranto. Amarante réfléchie. Common amaranth. RUD. 1200-1840 m. r. VIII-IX. AL/ESP.
- Atriplex patula* L. Salat de fulla estreta. Armuelle de hoja estrecha. Arroche étalée. Common orache. RUD. 1200-1540 m. rr. VII-IX.
- Beta vulgaris* L. Bleda. Acelga. Bette commune. Beet. RUD. 1200 m. rrr. AL/SUB.
- Blitum bonus-henricus* (L.) Rchb. [*Chenopodium bonus-henricus* L.] . Sarró, espinac de muntanya. Zurrón. Herbe du bon henri. Good-king-henry. RUD. 1200 m. rrr. VII-IX.
- Chenopodium album* L. Blet. Berza perruna. Ansérine blanche. Fat hen. RUD(t). 1200-2100 m. cc. VII-VIII.
- Chenopodium vulvaria* L. Blet pudent. Sardinera. Chénopode fétide. Stinking goosefoot. RUD. 1240 m. rrr. VI.
- Chenopodium hybridum* (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch [*Chenopodium hybridum* L.] -. -. Chénopode à feuilles de stramoine. -. ARV/RUD. 1240 m. rrr.
- Dysphania ambrosioides* (L.) Mosyakin & Clemants [*Chenopodium ambrosioides* L.] Te bord. Té de méxico. Chénopode fausse ambrosie. Wormseed. RUD. 1240 m. rrr. VII-VIII. AL/SUB.
- Lipandra polysperma* (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch [*Chenopodium polyspermum* L.] ARV(h). Blet polisperm. Cenizo polispermo. Chénopode à graines nombreuses. Manyseed goosefoot. 1200-1320 m. r. VII.

Apiaceae

- Aegopodium podagraria* L. - Pie de cabra. Podagraire. Wild masterwort. BOSC(br). 1200 m. rrr. VII. AME.
- Aethusa cynapium* L. subsp. *cynapium* Julivertassa. Cicuta menor. Ciguë des jardins. Fool's parsley. RUD. 1200-1540 m. rr. VII.
- Angelica sylvestris* L. Angélica. Angélica. Angélique des bois. Wild angelica. BOSC(br)/HERB(h)/AQUA. 1200-1900 m. c. VI-VIII.
- Anthriscus sylvestris* L. Cominassa. Cicutaria. Anthrisque sauvage. Cow parsley. PRAT(h)/HERB(m)/BOSC(br). 1200-2040 m. c. V-VII.
- Astrantia major* L. Astrància. Grande astrance. Great masterwort. HERB/PRAT(h). 1200-2010 m. cc. VI-VIII.
- Astrantia minor* L. Astrància menuda. Astrancia menor. Petite astrance. Lesser masterwort. MAT/HERB/PRAT. 1420-2300 m. c. VII-VIII.
- Bupleurum petraeum* L. Error.
- Bupleurum ranunculoides* L. Orella de llebre. Cuchilleja menor. Buplèvre à feuilles de graminée. Hare's-ear. PRAT(ca). 1460-1900 m. c. VII-VIII.
- Carum carvi* L. Comí.Comino. Cumin des prés. Caraway. PRAT/HERB(h). 1200-2000 m. c. VI-VIII.
- Chaerophyllum aureum* L. Cominassa. Cerefolio dorado. Cerfeuil d'or. Golden chervil. RUD. 1200-2060 m. ccc. VI-VIII.
- Chaerophyllum hirsutum* L. -. -. -. -. HERB(h)/AQUA(h,f)/BOSC(br). 1200-2200 m. ccc. VI-VII.
- Chaerophyllum temulum* L. BOSC(br)/HERB(c). 1220-1260 m. rr. VI-VII.
- Conium maculatum* L. Cicuta -. -. -. RUD(h). rrr. VII-VIII.
- Conopodium majus* (Gouan) Loret subsp. *majus* Anyol. Castañuela. Grand conopode. Earthnut. BOSC/MAT/PRAT(ac). 1200-2060 m. cc. VI-VIII.
- Coristospermum lucidum* (Mill.) Reduron, Charpin & Pimenov [*Ligusticum lucidum* Mill.] Turbit de muntanya. -. Ligustique des pyrénées. Southern lovage. ROC(t)/HERB(v). 1260-1870 m. r. VI-IX.
- Daucus carota* L. subsp. *carota* Pastanaga borda. Zanahoria silvestre. Carotte sauvage. Wild carrot. RUD/HERB/PRAT. ccc. VI-X.
- Endressia pyrenaica* (DC.) J. Gay PRAT(ac,h). 1600-2020 m. r. VII-VIII.

- Epikeros pyrenaicus* (L.) Raf [*Selinum pyrenaicum* (L.) Gouan] Selí pirinenc. Hinojo de prado. Sélin des Pyrénées. Pyrenean angelica. BOSC/MAT/PRAT (ac). 1350-2500 m. c. VII-VIII.
- Eryngium bourgatii* Gouan Espinacal/Panical blau. Cardo azul. Panicaut de bourgat. Field eryngo. PRAT. 1460-2550 m. ccc. VII-VIII.
- Eryngium campestre* L. Espinacal/Panical. Cardo corredor. Panicaut champêtre. Field eryngo. PRAT(s). 1200-1350 m. r. VI.
- Eryngium ×chevalieri* Sennen [*E. bourgatii* × *E. campestre*] PRAT. 1380 m. rrr.
- Foeniculum vulgare* Mill. [*F. vulgare* subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.] Fonoll. Hinojo. Fenouil. Fennel. PRAT(s)/HERB(v). 1200-1460 m. c. VI-X.
- Helosciadium nodiflorum* (L.) W.D.J. Koch [*Apium nodiflorum* (L.) Lag.] Creixen bord. Berraza. Ache faux cresson. Wild celery. AQUA(cr). 1350 m. rr. VI-VIII.
- Heracleum pyrenaicum* Lam. [*Heracleum sphondylium* L. subsp. *pyrenaicum* (Lam.) Bonnier et Layens var. *pyrenaicum*] Pàmpola/Belleraca. Belleraca. Berce des Pyrénées. Pyrenean hogweed. PRAT/HERB(h). 1200-2250 m. cc. VI-VIII.
- Imperatoria ostruthium* L. [*Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch]] Salsufraji. Peucédano alpino. Impéatoire. Masterwort. HERB/AQUA(h). 1200-2340 m. c. VI-VIII.
- Laserpitium gallicum* subsp. *paradoxum* (A. Bolos & Font Quer) P. Monts. -. -. -. ROC(r,t). 1425 -1650 m. VI-VII.
- Laserpitium latifolium* L. subsp. *latifolium* Angèlica. Cominos negros. Laser à feuilles larges. Broad-leaved sermountain. BOSC/HERB/MAT/PRAT. 1250-2230 m. cc. VII-VIII.
- Laser trilobum* (L.) Borkh. ex G.Gaertn. Error.
- Libanotis pyrenaica* (L.) O. Schwarz [*Seseli libanotis* (L.) W.D.J. Koch] Sèseli pirinenc. -. Libanotis des montagnes. Mountain stone-parsley. PRAT(s)(p). 1700-2280 m. r. VII-VIII.
- Meum athamanticum* Jacq. Meu/Herba del mèu. Hinojo ursino. Cerfeuil des alpes. Baldmoney. PRAT(h,ac). 2020-2440 m. r. VII-VIII.
- Molospopermum peloponnesiacum* (L.) Koch Coscoll. Coscollo. Couscouil. Striped Hemlock. ROC(r)(t)/HERB(m)/MAT(s)(p). 1220-2340 m. c. VI-VIII.
- Oreoselinum nigrum* Delarbre [*Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench] -. -. -. HERB(v). 1240-1300 m. rr. VII-IX.
- Pastinaca sativa* L. subsp. *sylvestris* (Mill.) Rouy & E.G. Camus Xirivia silvestre. Chirivía. Panais des bois. Wild parsnip. HERB/BOSC(s). 1240-1550 m. c. VII-VIII.
- Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss. -. -. -. ARV/RUD(t). 1240 m. rrr. VII.
- Pimpinella major* (L.) Huds. L. var. *rubra* (Hoppe) Fiori et Bég. Pimpinella gran. Pimpinella mayor. Grande pimpinelle. Greater burnet-saxifrage. HERB(m,h)/PRAT(h). 1240-1850 m. r. VII-VIII.
- Ptychotis saxifraga* (L.) Loret & Barr. Orelludeta. Perejil de glera. Ptychotis saxifrage. -. ROC(t). 1240-1750 m. c. VII-VIII.
- Sanicula europaea* L. Herba de sant Llorenç. Hierba de san Lorenzo. Sanicle. Wood sanicle. BOSC(br). 1200-1350 m. r. VII-VIII.
- Seseli annuum* L. subsp. *annuum* -. -. Séséli annuel. -. VOR(s),ROC. 1200-1400 m. rr.
- Seseli montanum* L. subsp. *montanum* Sèseli de muntanya. -. Séséli comú. Séséli des montagnes. -. PRAT(s). 1200-1980 m. c. VII-IX.
- Seseli montanum* subsp. *nanum* (Dufour) O. Bolòs & Vigo [*S. nanum* Duf. in Bory; *S. montanum* var. *nanum* Seg.] Sèseli. -. Séséli nain. -. ROC(ca). 2240-2760 m. rrr. VII.
- Thapsia nestleri* (Soy.-Will.) Wojew., Banasiak, Reduron & Spalik subsp. *flabellata* (P. Monts.) Fern. Prieto, Garcia Fresno, Sanna & Cires [*Laserpitium nestleri* subsp. *flabellatum* P. Monts.] PRAT/BOSC (r,h,ca). 1450-2040 m. r. VII-VIII.
- Tordylium maximum* L. -. -. -. RUD(h). 1250 m. rrr. VI-VIII.
- Torilis arvensis* (Huds.) Link Julivert bord. -. Torilis des champs. -. RUD. 1240-1620 m. r. VI-VIII.
- Torilis japonica* (Houtt.) DC. -. -. -. HERB(r)/BOSC(br). 775-1600 m. c. VI-IX.
- Trinia glauca* (L.) Dumort. Trinia. -. Trinie commune. Honewort. ROC(r)/PRAT(r) (ca). 1480-2380 m. rr. VI-VII.

Xatartia scabra (Lapeyr.) Meisn. Julivert d'isard. -. Persil d'isard. Xatardia. ROC(t). 2050-2750 m. r. VII-IX. PRO.

Apocinaceae

Vincetoxicum hirundinaria Medik. [*V. hirundinaria* subsp. *intermedium* (Loret & Barrandon) Markgraf.] Pebrotera borda. Hirundinaria. Dompte-venin intermédiaire. Pale swallow wort. MAT/BOSC. 1200-1850 m. cc. VI-VII.

Aquifoliaceae

Ilex aquifolium L. Grèvol. Acebo. Houx. Holly. BOSC(h). 1200-1900 m. c. V-VI.

Araliaceae

Hedera helix L. subsp. *helix* Heura. Hiedra. Lierre. Ivy. BOSC/ROC(m). 1200-1700 m. cc. VIII-XI.

Asteraceae

Achillea chamaemelifolia Pourr. -. -. Achillée à feuilles de camomille. -. ROC(r,si). 1230-1680 m. r. VII-VIII.

Achillea millefolium L. - Herba de tall/ Milfulles. Milenrama. Achillée millefeuille. Yarrow. PRAT/HERB(v). cc. V-X.

Achillea nana L. Error.

Achillea odorata L. Lladracà. Camomila. Achillée odorante. Cream flowered Sneezewort. PRAT(s). 1350-1780 m. r. VI-VIII.

Achillea ptarmica L. Error.

Achillea pyrenaica Godr. [*A. ptarmica* L. subsp. *pyrenaica* (Godr.) Heimerl] Camamilla de muntanya/ Camamilla. -. Achillée des Pyrénées. -. AQUA(f). 1225-2650 m. c. VI-X.

Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kern. subsp. *alliariae* -. -. Adénostyle à feuilles d'alliaire. -. HERB(m)/MAT(n). 1500-1450 m. c. VI-IX.

Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh. subsp. *pyrenaica* (Lange) M. Dillenberger & Kadereit [*A. alliariae* subsp. *pyrenaica* (Lange) Rouy; *A. alliariae* subsp. *hybrida* auct.]. Error.

Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh. subsp. *helvetica* (Chrtek & Pouzar) Chrtek & Pouzar Antenària carpàtica. -. Antennaire des capates. -. PRAT. 2100-2750 m. c. VII-IX.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Pota de gat. -. Pied-de-chat dioïque. -. PRAT(ac). 1400-2700 m. ccc. V-VII.

Anthemis arvensis L. subsp. *arvensis* Camamilla borda. Manzanilla silvestre. Camomille sauvage. Corn chamomile. ARV/RUD. 1240-1320 m. rr. VI-IX.

Anthemis cotula L. Camamilla pudent. -. Anthémis fétide. Stinking chamomile. RUD(t). 1280 m. rrr. VI.

Anthemis cretica L. subsp. *carpatica* (Willd.) Grierson Àntemis de muntanya. -. Anthémis des Carpates. -. ROC/PRAT(s). r. 1970-2480 m. VI-VIII.

Arctium lappa L. subsp. *lappa* -. Bardana. Bardane commune. Beggar's Buttons. HERB(v). 1220 m. rrr. VIII.

Arctium minus (Hill) Bernh. Enganxadones/Repalassa. Lampazo. Bardane à petites têtes. Lesser Burdock. RUD. ccc. VII-IX.

Arnica montana L. subsp. *montana* Àrnica. Àrnica. -. -. PRAT(ac). 1350-2410 m. r. VII-VIII. PRO.

Artemisia absinthium L. Donzell. Ajenjo. Absinthe. Wormwood. RUD(s). 1200-2050 m. c. VII-IX.

Artemisia campestris L. [*A. campestris* subsp. *glutinosa* (Besser) Batt.] Botja llemenosa. Escobilla parda. Armoise des champs. Field Sagewort. PRAT(s)/ROC(m). 1260-1380 m. rrr. VII-VIII.

- Artemisia umbelliformis* Lam. [*A. gabriellae* Braun-Blanq.] Artemisia de muntanya. -. Génépi laineux. -. ROC. 2200-2800 m. rr. VII-VIII.
- Artemisia verlotiorum* Lamotte -. -. Armoise de chine. Chinese wormwood. RUD. 1200-1340 m. c. VIII-X. AL/INV.
- Artemisia vulgaris* L. Altimiri/Altimira. -. Armoise citronnelle. Mugwort. RUD. 1200-1920 m. ccc. VI-IX.
- Aster alpinus* L. Àster alpí. Aster alpino. Aster des Alpes. -. PRAT. 1500-2800 m. c. VI-IX.
- Bellis perennis* L. Margarita/Margarideta. Bellorita silvestre. Pâquerette. Daisy. RUD(t). 1200-2000 m. c. III-VI.
- Bombycilaena erecta* (L.) Smoljan. [*Micropus erectus* L.] -. -. Cotonnière dressée. Micropus. PRAT(r). 1430 m. rrr. VI.
- Carduus carlinifolius* Lam. [*C. defloratus* L. subsp. *carlinifolius* (Lam.) Arènes] Card prim-cardo de montaña. Chardon à feuilles de carline. -. PRAT(s,r)/ROC(t). 1400-2200 m. c. 1400-2200 m. cc. VII-IX.
- Carduus carlinoides* Gouan subsp. *carlinoides* Card carlinoide. Cardo blanco pirenaico. Chardon fausse carline. Pyrenean thistle. ROC(t). 1700-2640 m. c. VII-IX.
- Carduus crispus* L. subsp. *multiflorus* (Gaudin) Franco [*C. crispus* L. subsp. *occidentalis* Chassagne et Arènes] Card cresp. Cardo crispado. Chardon à fleurs nombreuses. Welled Thistle. RUD. 1200-1800 m. rr. VI-VIII.
- Carduus nutans* L. Card nutant. -. Chardon penché. Musk thistle. RUD. 1500-1760 m. rrr. VII.
- Carlina acanthifolia* All. subsp. *cynara* (Pourr. ex Duby) Arcang. - Carlina. Carlina. Carlina artichaut. -. PRAT. c. VI-IX.
- Carlina acaulis* L. subsp. *caulescens* (Lam.) Schübl. et Martens. Carlina borda. Ajonjera. Carlina caulescente. Stemless carline thistle. PRAT. 1200-2500 m. c. VI-IX.
- Carlina vulgaris* L. subsp. *spinosa* (Velen.) Vandas Carlina de monte. -. Carlina thistle. PRAT(s). 1200-1720 m. c. VI-VII.
- Centaurea calcitrapa* L. Obriülls. Cardo estrellado. Centaurée chausse-trappe. Purple star-thistle. RUD(t)/ARV. 1200-1780 m. c. VI-IX.
- Centaurea cephalariifolia* Willk. [*C. scabiosa* subsp. *cephalariifolia* (Willk.) Greuter] -. -. -. Greater knapweed. PRAT/RUD. 1200-1880 m. c. VI-VIII.
- Centaurea jacea* L. subsp. *vinyalsii* (Sennen) O. Bolòs, Nuet et Panareda Caps de burro/Caps blaus. Centaurea de prado-. Centaurée jacée. -. PRAT. 1200-1920 m. cc. VI-X.
- Centaurea nigra* L. subsp. *nigra* Caps de burro. Aciano negro. Centaurée noire. Lesser knapweed. PRAT(h). 1240-1840 m. r. VI-IX.
- Centaurea triumfettii* All. subsp. *semidecurrans* (Jord.) Dostál [*C. montana* subsp. *semidecurrans* (Jord.) O. Bolòs & Vigo] -. -. Centaurea triumfettii. Squarrose Knapweed. RUD(t)/PRAT. 1980-2200 m. rr. VII-VIII.
- Cicerbita alpina* (L.) Wallr. [*Lactuca alpina* (L.) A. Gray] -. -. -. HERB(m). 2200-2340 m. rrr. VII-VIII.
- Cicerbita muralis* (L.) Wallr. subsp. *muralis* [*Mycelis muralis* (L.) Dumort.] Caps de burro. Cañamones. Centaurée noire. Lesser knapweed. BOSC(h). 1240-1780 m. c. VI-IX.
- Cichorium intybus* L. subsp. *intybus* Xicoira. Achicoria amarga. Chicorée amère. Chicory. RUD(t). rr. 1200-1280 m. VII.
- Cirsium acaulon* (L.) Scop. subsp. *acaulon* [*C. acaule* Scop.] Calcida acaule. Cardo. Cirse acaule. Dwarf Thistle. PRAT(h). 1240-2325 m. cc. VI-IX.
- Cirsium arvense* (L.) Scop. Calcida. Cardo blanco. Cirse des champs. Canada Thistle. RUD/ARV. 1200- 1800 m. c. VI-IX.
- Cirsium eriophorum* (L.) Scop. subsp. *richterianum* (Gillot) Petrak Cardigassa. Cardo plumero. Cirse de Richter. Woolly thistle. PRAT(r)/RUD. 1200-2020 m. cc. VII-X.
- Cirsium monspessulanum* (L.) Hill Capferrat. Cardo hemorroidal. Cirse de Montpellier. -. AQUA(j). 1220-1460 m. r. VI-IX.
- Cirsium palustre* (L.) Scop. Cardigassa palustre. Cardo palustre. Cirse des marais. Marsh thistle. AQUA(j,m). 1200-2200 m. c. VII-IX.

- Cirsium rivulare* (Jacq.) All. Cardigassa rivular. Cardo gigante de río. Cirse des ruisseaux. Brook thistle. AQUA (j,f). 1200-1800 m. c. VI-VIII.
- Cirsium tuberosum* (L.) All. Cardigassa tuberosa. -. Cirse tubéreux. Tuberous Thistle. PRAT(h). 1520-2200 m. r. VII-VIII.
- Cirsium vulgare* (Savi) Ten. Card. Cardo borriquero. Cirse commun. Spear thistle. RUD. 1200-2100 m. c. VI-IX.
- Cirsium xneyrae* E.G. Camus [*C. borderei* Rouy, *C. monspessulanum* × *C. palustre*] AQUA(j). 1550 m. rrr. VII.
- Cirsium xmedium* All. [*C. acaulon* subsp. *acaulon* × *C. tuberosum*] PRAT. 2120 m. rrr. VIII.
- Cota triumfettii* (L.) J. Gay [*Anthemis triumfettii* (L.) DC.] Cota de bosc. -. Anthémis de Trionfetti. Southern Dog-daisy. HERB(v)/PRAT(h). 1440-1700 m. rr. VII.
- Crepis blattarioides* (L.) Vill. [*C. conyzifolia* (Gouan) A. Kern.] -. -. -. PRAT(ac,h). 2020 m. rrr. VII-IX. AME.
- Crepis capillaris* (L.) Wallr. [*C. virens* subsp. *capillaris* (L.) Cout.] Crepis capillar. -. Crépide à tiges capillaires. Smooth Hawk's-beard. PRAT(h,t)/RUD(h). 1220-1980 m. cc. VI-VIII.
- Crepis foetida* L. subsp. *foetida* -. -. Crépide fétide. Stinking hawk's-Beard. Rud(t). 1240 m. rrr. VI.
- Crepis lampsanoides* (Gouan) Tausch. Citat a prop.
- Crepis mollis* (Jacq.) Asch. Crepis blana. -. Crépide molle. Northern Hawk's-beard. PRAT(h). HERB(m)/BOSC(r). 1320-2020 m. rrr. VII-VIII.
- Crepis pygmaea* L. Crepis nana. -. Crépide naine. -. ROC(t). 2420-2780 m. r. VII-IX.
- Crepis pyrenaica* (L.) Greuter Crepis pirinenca. -. Crépide des Pyrénées. -. HERB(m)/PRAT(h). 1420-2100 m. VII-VIII.
- Crepis setosa* Haller fil. subsp. *setosa* -. -. Crépide hérissée. Bristly hawk's-beard. RUD(h,t). 1220-1680 m. r. V-VIII.
- Crepis taraxacifolia* Thuill. [*C. vesicaria* L. subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell.] Cama-roja roja. -. Crépide à feuilles de pissenlit. -. RUD(h,t). 1200-1460 m. r. V-VII.
- Cynara cardunculus* L. Herba-col. -. -. -. ARV/RUD. 1240-1280 m. rr. VII. AL/SUB.
- Doronicum austriacum* Jacq. Error.
- Doronicum grandiflorum* Lam. Dorònic de pedrusca. Árnica fals. Doronic à grandes fleurs. -. ROC(t). 2400-2700 m. rr. VII-IX.
- Doronicum pardalianches* L. Dorònic cordat. Doronico. Doronic à feuilles cordées. -. BOSC(h,br). 1200-1680 m. rr. V-VII.
- Echinops sphaerocephalus* L. subsp. *sphaerocephalus* Card d'eriçó. -. Oursin à têtes rondes. Common Globe-thistle. 1340-1620 m. rrr. VII.
- Erigeron acris* L. [*E. acer* L. subsp. *acer*] Herba de dolor. -. Vergerette âcre. -. PRAT. 1200-2100 m. c. VII-VIII.
- Erigeron aragonensis* Vierh. [*E. uniflorus* L. subsp. *aragonensis* (Vierh.) O. Bolòs & Vigo] Erígeron aragonès. Vergerette d'Arago. -. PRAT(ac). 2000-2800 m. cc. VI-VIII.
- Erigeron alpinus* L. [*E. pyrenaicus* (Pourr.) A.W. Hill; *E. verguinii* Sennen] -. -. -. PRAT. r. 1550-2300 m. VII-IX.
- Erigeron annuus* (L.) Pers. -. Estenactis. Erigeron anual. Vergerette annuelle. Daisy fleabane. PRAT/RUD. c. 1200-2000 m. c. VI-X. AL/INV.
- Erigeron canadensis* L. [*Conyza canadensis* (L.) Cronq.] Coniza canadencia. -. Vergerette du Canada. Horsetweed. RUD. 1200-1980 m. cc. VI-IX. AL/INV.
- Erigeron glabratus* Bluff & Fingerh. subsp. *occidentalis* (Vierh) A. Pujadas [*E. polymorphus* subsp. *occidentalis* Vierh.] Erígeron glabre. Vergerette glabre. Variable fleabane. PRAT(ac). 1900-2480 m. c. VII-IX.
- Eupatorium cannabinum* L. subsp. *cannabinum* Canabassa. Eupatorio. Eupatoire chanvrine. Hemp agrimony. HERB(v,h). 1200-1640 m. cc. VI-IX.
- Filago germanica* (L.) Huds. [*F. vulgaris* Lam., *F. pyramidata* subsp. *canescens* (Jord.) O. Bolos & Vigo] -. Filago vulgar. Cottonnière commune. Common Cottonrose. PRAT(r). 1260 m. rrr. VII.

- Filago lutescens*** Jord. [*F. pyramidata* subsp. *lutescens* (Jord.) O. Bolòs & Vigo] -. -. Cotonnière jaunâtre. Red-tipped Cudweed. PRAT(r)/RUD(t). 1240-1420 m. rr. VI-VIII.
- Filago pyramidata*** L. [*F. obovata* Pomel; *F. pyramidata* var. *obovata* (Pomel) Wagenitz; *F. pyramidata* var. *prostrata* (Fiori) Wagenitz] Herba del borm. Hierba algodonera. Cotonnière à feuilles spatulées. Broad-leaved Cudweed. PRAT(r). 1260 m. rrr. VII.
- Galinsoga quadriradiata*** Ruiz & Pav. [*G. ciliata* (Raf.) S.F. Blake; *G. parviflora* subsp. *hispida* (DC.) O. Bolòs & Vigo] Galinsoga. Galinsoga. Galinsoga à petites fleurs. Gallant soldier. ARV/RUD. 1200-1300 m. r. VI-IX. AL/ESP.
- Gnaphalium uliginosum*** L. [*Filaginella uliginosa* (L.) Opiz] Gnafali uliginós. -. Cotonnière des fanges. March Everlasting. AQUA(j). 1560 m. rrr. VIII.
- Helianthus tuberosus*** L. . Trumfa nyama/Nyàmera. Tupinambo. Topinambour. Jerusalem artichoke. RUD(h),BOSC(br). 1200- 1560 m. c. IX-X.
- Helminthotheca echioides*** (L.) Holub [*Picris echioides* L.] Arpell. Lengua de gato. Picris fausse vipérine. Bristly Oxtongue. RUD. 1240 m. rrr.VII.
- Hieracium alatum*** Lapeyr. -. -. -. BOSC(per)/MAT (ac). 1600-2450 m m. rrr. VII.
- Hieracium amplexicaule*** L. Herba de l'esperver. Hieracio amplexicaule. Épervière embrassante. -. ROC(r). 1340-2640 m. c. VI-VIII.
- Hieracium candidum*** Scheele ROC(ca). 1780-2300 m. rrr. VII-VIII.
- Hieracium cerinthoides*** L. -. -. -. HERB(v,ac). 1320 m. rrr. VII.
- Hieracium cordatum*** Costa [incl. *H. glaucophyllum* Scheele and *H. hispanicum* Arv.-Touv.] -. -. -. ROC. 1300 m. rrr. VII.
- Hieracium glaucinum*** Jord. [*H. praecox* Schultz.-Bip.] -. -. Épervière bleuâtre. -. BOSC/PRAT. 1320-1680 m. c. VII.
- Hieracium gouanii*** Arv.-Touv. [*H. cordifolium* subsp. *gouanii* (Arv.-Touv.) Zahn; ?*H. vernicosum* Arv.-Touv.] -. -. -. ROC(r)/HERB(v). 1240-1480 m. rr. VII-VIII.
- Hieracium hirsutum* Tausch Citat a prop.
- Hieracium lachenalii* Suter [*H. vulgatum* subsp. *lachenalii* (Suter) Zahn; *H. vulgatum* auct.] Citat a prop.
- Hieracium langei*** Fr. -. -. -. BOSC(ac). 2175 m. rrr. VII.
- Hieracium lychnitis* Scheele [*H. compositum* auct., non Lapeyr.] Citat a prop.
- Hieracium murorum*** L. Esperver de murs. Hieracio común de bosque. Épervière des murs. Wall hawkweed. BOSC/HERB(v). 1240- 2080 m. c. VI-IX.
- Hieracium neopicris* Arv.-Touv. Citat a prop.
- Hieracium nobile*** Gren. & Godr. -. -. -. 2400 m. rrr.
- Hieracium prenanthoides* Vill. Citat a prop a comprovar.
- Hieracium sabaudum*** L. -. -. -. BOSC/MAT/HERB(v) (ac). 1240-1640 m. c. VII-IX.
- Hieracium umbellatum*** L. -. -. -. BOSC(ac). 1340 m. rrr. VII.
- Hieracium villosum* Jacq. Citat a prop, a confirmar.
- Homogyne alpina*** (L.) Cass. Homògine. -. Homogyne des alpes. -. MAT(n). 1940-2340 m. r. VI-VIII.
- Hypochoeris radicata*** L. subsp. *radicata* Herba plana. Barbas de chivo. Porcelle enracinée. Gosmore. PRAT. 1200-1890 m. cc. VI-IX.
- Jacobaea adonidifolia*** (Loisel.) Mérat [*Senecio adonidifolius* Loisel.] Herba dels talls. Suzón fino. Séneçon à feuilles d'adonis. -. MAT(si). 1240-2200 m. c. VI-IX.
- Jacobaea leucophylla*** (DC.) Pelsér [*Senecio leucophyllus* DC.] Herba blanca. Yerba blanca. Séneçon à feuilles blanches. -. ROC(t). 1700-2850 m. c. VII-IX. PRO.
- Lactuca plumieri*** (L.) Gren. & Godr. [*Cicerbita plumieri* (L.) Kirschl.] Lletuga de muntanya. Cerraja lechuguera. Laitue de plumier. Hairless blue sow-thistle. HERB(m). 1580-2060 m. r. VII-VIII.
- Lactuca serriola*** L. Enciam bord. Lechuga espinosa. Laitue sauvage. Prickly lettuce. RUD(h). 1200-1560 m. r. VIII.
- Lapsana communis*** L. -. Hierba de los pechos. Lampsane commune. Common Nipplewort. RUD(h). 1220-1620 m. c. VI-VIII.
- Leontodon hispidus*** L. subsp. *hispidus* (DC.) Soják Queixalets/Leòntodon hispíd. Leóntodon de prado. Liondent hispide. Greater hawkbit. PRAT. 1220-2340 m. ccc. VI-IX.

- Leucanthemopsis alpina* (L.) Heywood subsp. *alpina* Margarida alpina. Piretro alpino. Leucanthème des Alpes. Alpine moon-daisy. PRAT/ROC(t). 1920-2850 m. c. VI-X.
- Leucanthemum ageratifolium* Pau [*L. vulgare* Lam. subsp. *puijulae* Sennen] Margarita de prat. Margarita mayor. Marguerite. Ox-eye daisy. PRAT/HERB(h,v). 1200-1870 m. cc. V-VIII.
- Leucanthemum catalaunicum* Vogt [*L. vulgare* subsp. *catalaunicum* (Vogt) O. Bolòs & Vigo; *L. maximum* auct.] Margarida. -. Marguerite géante. -. PRAT(s)/ROC(t). 1450-2120 m. r. V-IX.
- Leucanthemum delarbrei* Timb.-Lagr. subsp. *ruscinonense* (Jeanb. & Timb.-Lagr.) Vogt, F. Wagner & Oberpr. [*L. monspeliense* auct., non (L.) H.J. Coste] -. -. Marguerite de Montpellier. -. ROC(r). 1950-2800 m. rr. VI-VIII.
- Logfia minima* (Sm.) Dumort. [*Filago minima* (Sm.) Pers.] Filago mínima. -. Cottonnière naine. Little Cottonrose. PRAT(r). 1260-1340 m. rr. VII.
- Matricaria chamomilla* L. [*Chamomilla recutita* (L.) Rauschert] Camamila. Camamila. Camomille sauvage. German Chamomile. ARV/RUD(t). 1260 m. rr. VI.
- Matricaria discoidea* DC. [*Chamomilla suaveolens* (Pursh) Rydb.; *Matricaria suaveolens* (Pursh) Buchen., non L.] -. -. Matricaire odorante. Pineapple weed. RUD(t). 1200-2100 m. c. VI-IX.
- Omalotheca sylvatica* (L.) Sch. Bip. & F.W. Schultz [*Gnaphalium sylvaticum* L.] Gnafali selvàtic. Algodonosa de bosque. Gnaphale des bois. -. HERB(c). 1200-2200 m. r. VII-IX.
- Omalotheca supina* (L.) DC. [*Gnaphalium supinum* L.] Gnafali nan. Borosilla de montaña. Gnaphale nain. Dwarf cudweed. AQUA(c). 2100-2720 m. r. VII-IX.
- Onopordum acanthium* L. subsp. *acanthium* Cardot gros. Cardo borriquero. Chardon aux ânes. Cotton Thistle. RUD(h). 1450-1670 m. rr. VII-VIII.
- Pentanema conyzae* (Griess.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M.M. Mart. Ort. [*Inula conyzae* (Griess.) DC.] Ínula. Coniza. Herbe aux mouches. Ploughman's spikenard. HERB(v). 1200-1580 m. r. VII-IX.
- Picris hieracioides* L. [*P. hieracioides* subsp. *rieli* (Sennen) O. Bolòs & Vigo; *P. hieracioides* subsp. *villarsii* (Jord.) Nyman] Parraca. Parraca. Picris fausse épervière. Hawkweed. PRAT/HERB/ROC(t) (s). 1200-2200 m. ccc. VI-XI.
- Pilosella breviscapa* (DC.) Soják [*Hieracium breviscapum* DC.] Herba de l'esperver. -. Piloselle à tiges courtes. -. PRAT 1680-2720 m. cc. VII-VIII.
- Pilosella heteromelana* (Zahn) Mateo [*Hieracium hypeuryum* subsp. *heteromelanum* Zahn] PRAT(ac). 1850-2100 m. c. VII-VIII.
- Pilosella lactucella* (Wallr.) P.D. Sell & C. West [*Hieracium lactucella* Wallr.] -. -. Piloselle auricule. -. PRAT(ac). 1420-2540 m. cc. VII-VIII.
- Pilosella officinarum* Vaill. [*Hieracium pilosella* L.] Herba cançera. Pelosilla. Piloselle. Mouse-ear hawkweed. PRAT. r. VII-VIII.
- Pilosella peleteriana* (Merat) F.W. Schultz & Sch. Bip. [*Hieracium peleterianum* Merat] -. -. Piloselle de Lepèletier. Shaggy Mouse-ear-hawkweed. PRAT/MAT(ac). 1400-2300 m. cc. VII-VIII.
- Pilosella saussureoides* Arv.-Touv. [incl. *P. tardans* (Peter) Soják; *Hieracium niveum* (Müll.-Arg.) Zahn] Pelosella. Pelosilla nívea. Piloselle. -. PRAT. cc. VI-VIII.
- Podospermum laciniatum* (L.) DC. [*Scorzonera laciniata* L.] Barball. Margallos. Scorsonère à feuilles de chausse-trape. Cutleaf Vipergrass. RUD(t). 1320 m. rrr. VII.
- Prenanthes purpurea* L. Prenantes. Ajonjera. Prénanthe pourpre. Purple lettuce. BOSC(h). 1260-2100 m. c. VII-VIII.
- Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh. subsp. *dysenterica* Herba de Sant Roc. Hierba de gato. Pulicaire dysentérique. Fleabane. AQUA(j). 1240-1350 m. rr. VII. MED.
- Rudbeckia laciniata* L. -. -. -. -. HERB(h)/BOSC(r). 1240 m. rrr. AL/INV/ER.
- Schlagintweitia chamaepicris* (Arv.-Touv.) Greuter [*Hieracium chamaepicris* Arv.-Touv.] -. -. -. -. 2300 m. rrr.
- Scorzoneroïdes autumnalis* (L.) Moench subsp. *autumnalis* [*Leontodon autumnalis* L. subsp. *autumnalis*] Leontodon autumnal. -. Liondent d'automne. Autumn Hawkbit. RUD/PRAT (t). 1200-1820 m. c.
- Scorzoneroïdes carpetana* subsp. *duboisii* (Sennen) Gallego [*S. duboisii* (Sennen) Greuter; *Leontodon duboisii* Sennen] -. -. Liondent de dubois. -. AQUA(f,m). 1600-2600 m. c.

- Scorzoneroïdes pyrenaica* (Gouan) Holub subsp. *pyrenaica* [*Leontodon pyrenaicus* subsp. *pyrenaicus* Gouan] Leontodon pirinenc. -. Liondent des Pyrénées. -. PRAT/ROC(r) (ac) 1820-2700 m. cc. VII-IX.
- Senecio doronicum* (L.) L. subsp. *longifolius* (Willk.) J. Calvo Llengua de bou. -. Séneçon doronic. -. PRAT(h). 1850 m. rrr. VII.
- Senecio inaequidens* DC. Seneci del Cap. Senecio de El Cabo. Séneçon du cap. Narrow-leaved ragwort. RUD/MAT. 1200-2680 m. AL/INV.
- Senecio pyrenaicus* L. in Loefl. subsp. *pyrenaicus* Leontodon pirinenc. -. Liondent des pyrénées. Pyrenean hawkbit. ROC(t)/MAT. 1800-2750 m. c. VII-VIII.
- Senecio pyrenaicus* subsp. *caespitosus* (Brot.) Franc [*Senecio tournefortii* subsp. *caespitosus* (Brot.) Cout.]. Error.
- Senecio viscosus* L. Seneci viscos. Hierba cana viscosa. Séneçon visqueux. Fetid groundsel. ROC(t). 1320-2080 m. c. VII-IX.
- Senecio vulgaris* L. Xenixell. Casamelos. Séneçon commun. Groundsel. ARV/RUD. 1200-2000 m. cc. II-XII.
- Serratula tinctoria* L. Serràtula tintòria. Serratula. Serratule des teinturiers. Dyer's plumeless Saw-wort. BOSC/MAT/PRAT/AQUA(j,m) (ac). 1260-1600 m. cc. VII-IX.
- Solidago canadensis* L. -. Vara de oro del Canadá. Gerbe-d'or. Canadian Goldenrod. HERB(h)/BOSC(br). 1320 m. rrr. AL/INV.
- Solidago virgaurea* L. Herba daurada. -. Solidage verge-d'or. Common goldenrod-goldenrod. BOSC/MAT/PRAT. 1200-2680 m. cc. VII-IX.
- Sonchus asper* (L.) Hill subsp. *asper* Lletissó/Lletsó. Cerraja dentada. Laiteron piquant. Prickly sow-thistle. RUD/ARV. 1200-2000 m. cc. VI-IX.
- Sonchus oleraceus* L. Lletissó/Lletsó. Cerraja. Laiteron maraîcher. Smooth sow thistle. RUD/ARV. 1200-1670. c. VI-IX.
- Symphotrichum pilosum* (Willd.) G.L. Nesom [*Aster pilosus* Willd.] Setembres/Setembrines. -. -. Hairy aster. RUD(s)/PRAT(s). 1200-1280 m. r. VII-XI. AL/INV.
- Symphotrichum ×salignum* (Willd.) G.L. Nesom [*Aster salignus* Willd.; *S. lanceolatum* × *S. novi-belgii*] Setembrina. Cielo estrellado. Aster à feuilles de saule. Common New York aster. RUD. 1280 m. rrr. AL/SUB.
- Tanacetum corymbosum* (L.) Schultz Bip. subsp. *corymbosum* Crisantem corimbós. Tanaceto corimboso. Tanaisie en corymbes. Corymb-flower tansy. HERB(v). 1200-1800 m. cc. VI-VIII.
- Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip. Segura. Segura. Grande camomille. Feverfew. RUD. 1220-1430 m. rr. VI. AL/SUB.
- Tanacetum vulgare* L. [*Chrysanthemum tanacetum* Karsch, non Vis.] Tanarida. Tanaceto. Tanaisie. Tansy. RUD. 1200-2000 m. rr. VI-X.
- Taraxacum gasparrinii* Lojac. [? *T. laevigatum* auct.] -. -. Pissenlit. -. RUD(t,r). 1280 m. rrr. VI.
- Taraxacum officinale* Weber in Wiggers Pixallits. Diente de león. -. Common dandelion. RUD(t)/PRAT(t). ccc. II-XI.
- Taraxacum pyrenaicum* Reut. [*T. dissectum* auct.]. Xicoïna/Xicoïa. -. Pissenlit découpé. -. PRAT(t)/RUD(t). 1200-2650 m. cc.
- Thrinacia hispida* Roth [*Leontodon taraxacoides* subsp. *hispidus* (Roth) Kerguelen; *L. rothii* Ball, nom. illeg.; *L. saxatilis* subsp. *rothii* Maire; *L. taraxacoides* subsp. *longirostris* Finch & P.D. Sell] -. -. Liondent à bec long. PRAT(s). 1280 m. rrr. VII.
- Tragopogon dubius* Scop. Inflabous. -. Salsifis douteux. -. RUD(h). 1240 m. rrr. VI.
- Tragopogon pratensis* L. Salsifí de prat. -. -. PRAT(h). 1220-2100 m. c. VI-VIII.
- Trommsdorffia maculata* (L.) Bernh. [*Hypochaeris maculata* L.] Herba del porc. -. Porcelle tachetée. -. PRAT(ac). 1340-2240 m. r. VI-VIII.
- Tussilago farfara* L. Pota de cavall/ Peu d'euga. Tusilago. Pas-d'âne. Coltsfoot. AQUA(j,b)/BOSC(br). 1200-2100 m. c. III-IV.

Betulaceae

- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. Vern. Aliso. Aulne glutineux. Black alder. BOSC(br). 1200-1600 m. c. III-V.
- Betula pendula* Roth. Beç/Bedoll. Abedul. Bouleau verruqueux. Silver birch. BOSC(h,br). 1200-2200 m. cc. IV-V.
- Betula pubescens* Ehrh. Beç/Bedoll pubescent. Chopa blanca. Bouleau blanc. White birch. BOSC(br). 1480-2000 m. r. IV.
- Betula x aschersoniana* Hayek [*B. pendula* x *B. pubescens*] BOSC(br). 1580 m. rrr.
- Corylus avellana* L. Avellaner. Avellano. Noisetier. Common hazel. BOSC. 1200-2000 m. ccc. II-IV.

Boraginaceae

- Aegonychon purpurocaeruleum* (L.) J. Holub [*Lithospermum purpurocaeruleum* L.; *Buglossoides purpurocaeruleum* (L.) I.M. Johnst.] Mill gruà. -. Grémil bleu pourpre. Purple gromwell. BOSC(br). 1240 m. rrr. V.
- Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb. subsp. *arvensis* Ancusa arvensis. Miel de avispa. Buglosse des champs. Annual bugloss. ARV. 1250 m. rr. V. AL/ESP.
- Buglossoides arvensis* (L.) I.M. Johnst. subsp. *arvensis* [*Lithospermum arvense* L. subsp. *arvense*] Mill de sol petit. Mijo de sal. Grémil des champs, Corn Gromwell. ARV. 1240-1310 m. rr. IV-VI.
- Cynoglossum officinale* L. Besneula. Viniega. Cynoglosse officinale. Hound's-tongue. HERB(r). 1680 m. rrr.
- Echium vulgare* subsp. *pustulatum* (Sm.) Bonnier & Layens [*E. vulgare* L. subsp. *argentae* (Pau) Font Quer] Viperina. Viborera común. -. -. PRAT(s)/RUD(s). 1200-2000 m. IV-X.
- Lithospermum officinale* L. Mill del sol/Mill gruà. Mijo de sol. Grémil officinal. Gromwell. 1200-2020 m. c. V-VIII.
- Myosotis alpestris* F.W. Schmidt subsp. *alpestris* [*M. sylvatica* subsp. *alpestris* (F.W. Schmidt) Gams] Miosotis alpestre. Nomeolvides alpino. Myosotis des Alpes. Alpine wood forget-me-not. PRAT. 1580-2800 m. V-VIII. cc.
- Myosotis alpestris* subsp. *pyrenaeorum* (Blaise & Kerguelen) Valdes [*M. pyrenaica* auct., non Pourr.; *M. alpina* Lapeyr.] PRAT(r)/ROC(t). 2200-2580 m. r. VII-IX.
- Myosotis arvensis* (L.) Hill. subsp. *arvensis* Nomoblidid de camp. Nomeolvides. Myosotis des champs. Common scorpiongrass. ARV/RUD/HERB(v). 1200-2050 m. c. VI-VIII.
- Myosotis decumbens* subsp. *teresiana* (Sennen) Grau [*M. sylvatica* Hoffm. subsp. *teresiana* (Sennen) O. Bolòs et Vigo] Miosotis de bosc. Nomeolvides de prado. Myosotis. Wood forget-me-not. BOSC(h). 1200-2050 m. cc. V-VIII.
- Myosotis hervei* Sennen [*M. palustris* subsp. *tuxeniana* O. Bolòs & Vigo; *M. tuxeniana* (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs & Vigo] Miosotis d'aigua. -. -. Water forget-me-not. AQUA(f,cr) 1200-1800 m. r.
- Myosotis stricta* Roem. & Schult. PRAT(r). 2000-2340 m. rrr. VII-VIII.
- Pulmonaria affinis* F.W. Schultz Fulles de la mare de déu/Pulmonària de fulla ampla. -. Pulmonaire semblable. -. BOSC(br). 1220 m. rrr. V.
- Pulmonaria longifolia* (Bastard) Boreau [*P. longifolia* subsp. *cevennensis* Bolliger] Fulla o fulles de la Mare de Déu/ Pulmonària de fulla estreta. Pulmonaria. Pulmonaire à feuilles longues. -. BOSC(s)/PRAT(s). 1220-1820 m. c. IV-VI.
- Symphytum uplandicum* Nyman Consolda. Consuelda mayor. Consoude. Russian Comfrey. AQUA(h). 1240 m. rrr. VI.
- Symphytum tuberosum* L. subsp. *tuberosum* Consolda. Consuelda menor. Consoude tubéreuse. Tuberous comfrey. BOSC(h,br). 1220-1700 m. rr. V-VI.

Brassicaceae

- Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande Herba d'all. Hierba del ajo. Alliaire. Garlic mustard. RUD(h)/BOSC(h). 1200-1620 m. cc. V-VI.
- Alyssum alyssoides* (L.) L. Herba de la ràbia. Alisón calicino. Alysson à calices persistants. -. PRAT(a). 1200-2100 m. c. V-VIII.
- Alyssum cacuminum* Spaniel, Marhold & Lihová [*A. cuneifolium* auct., non Ten.] -. -. -. ROC(t). 2300-2700 m. c. VII-VIII.
- Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. Arabidopsis. -. Arabette de thalius. Mouse-ear cress. PRAT(a)/ARV. 1230-1380 m. rrr. IV-VI.
- Arabis alpina* L. subsp. *alpina* Àrabis alpina. Arabieta de los Alpes. Arabette des alpes. Alpine rockcress. ROC(r,t)(h)/BOSC(h). 1200-2620 m. c. V-VIII.
- Arabis ciliata* Clairv. [*A. corymbiflora* Vest.] PRAT(s). 1500-2200 m. c. VI-VIII.
- Arabis serpillifolia* Vill. -. -. -. ROC(r,ca). 1000-2000 m. c. VI-VII.
- Barbarea intermedia* Boreau Barbarea pirinenca. Barbárea de hoja recortada. Barbarée intermédiaire. Intermediate yellow rocket. RUD/BOSC(br). 1200-2060 m. r. IV-VI.
- Barbarea verna* (Mill.) Asch. -. -. -. RUD/BOSC(br). codolars. V-VI. 1125-1425 m.
- Biscutella coronopifolia* L [*B. laevigata* subsp. *coronopifolia* (L.) Rouy & Foucaud] -. -. -. PRAT/HERB(v). 1200-1340 m. r. VI-VIII.
- Biscutella laevigata* L. subsp. *laevigata* Herba de les llunetes. Antejos. Biscutelle commune. Buckler mustard. ROC(t),PRAT(ca). 1500-2340 m.c. VI-VIII.
- Biscutella intermedia* Gouan [*B. pyrenaica* A. Huet; *B. laevigata* subsp. *pyrenaica* (Huet) Nyman] -. -. -. ROC(t). 2000-2700 m. c. VI-VIII.
- Bunias erucago* L. -. -. -. ARV. 1260-1450 m. rr. V-VI.
- Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. Caps blancs/Bosses de pastor. Bolsa de pastor. Bourse-à-pasteur. Shepherd's purse. ARV/RUD. 1200-2200 m. cc. III-VI.
- Capsella rubella* Reut. [*C. bursa-pastoris* subsp. *rubella* (Reut.) Hobkirk] RUD(t). -. -. -. 950-2050 m. rr. VI.
- Cardamine amara* subsp. *pyrenaea* Sennen [*C. amara* L. subsp. *amara* auct., non L.] -. -. Cresson amer. -. AQUA(f). 1200-2380 m. c. V-VIII.
- Cardamine alpina* Willd. [*C. bellidifolia* L. subsp. *alpina* (Willd.) B.M.G. Jones] Cardamina alpina. -. Cardamine des Alpes. -. AQUA(c,si). 2500-2650 m. rrr. VIII.
- Cardamine heptaphylla* (Vill.) O.E. Schulz Canuguera. Canudera. Cardamine à sept folioles. Pinnate coralroot. BOSC(h). 1220-1600 m. rr. IV-VI.
- Cardamine hirsuta* L. Cardàmine hirsuta. -. Cardamine hirsute. -. PRAT(a). 1200-1350 m. rr. II-V.
- Cardamine impatiens* L. subsp. *impatiens* -. -. -. BOSC(h,br). 1220-1670 m. cc. VI.
- Cardamine pentaphyllos* (L.) Crantz Citació antiga no precisa i no retrobada.
- Cardamine occulta* Hornem. -. -. -. RUD. 1240 m. rrr. VI. AL/INV.
- Cardamine crassifolia* Pourr. [*C. pratensis* subsp. *nuriae* (Sennen) Sennen] Cardamine à feuilles épaisses. -. AQUA(m,f). 1600-2340 m. r. VI-VII.
- Cardamine raphanifolia* Pourr. [*C. pyrenaica* (L.) Rothm., nom. illeg., non Kuntze] Cardamina pirinenca. -. Cardamine à feuilles de radis. Greater cuckooflower. AQUA(f). 1240-1720 m. cc. V-VI.
- Cardamine resedifolia* L. -. Cardàmine alpina. Cardamine à feuilles de réséda. Mignonette-leaved bittercress. ROC(r,t,si). 1480-2780 m. cc. VI-VIII.
- Coincya monensis* (L.) Greuter & Burdet subsp. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. [*C. cheiranthos* (Vill.) Greuter & Burdet; *Hutera cheiranthos* (Vill.) Gómez-Campo] Brassicella. -. Moutarde giroflée. wallflower cabbage. ROC(t,si). 1280-2200 m. c. VI-VIII.
- Descurainia sophia* (L.) -. -. -. RUD(h,t). rrr. 1400 m. VI.
- Diplotaxis eruroides* (L.) DC. subsp. *eruroides* Ravenissa blanca. Rabaniza blanca. Roquette blanche. White wall rocket. ARV. 1200-1310 m. rr. IV-V.

- Diploaxis muralis* L.) DC. subsp. *muralis* -. -. -. RUD(t). 800-1250 m. rr. V-VI.
- Draba aizoides* L. -. -. -. PRAT(c,r,ca). 1900-1700 m. c. VI-VII.
- Draba dubia* Suter [*D. dubia* subsp. *laevipes* (DC.) Braun.-Blanq.] Draba dúbia. Draba de las cumbres. Drave des frimas. Austrian whitlowgrass. ROC(r). 2200-2700 m. c. V-VII.
- D. incana* L. Error.
- Draba nemorosa* L. -. -. -. RUD(t). 1600-2100 m. rr. V-VI.
- Draba siliquosa* M. Bieb. [*D. siliquosa* subsp. *carinthiaca* (Hoppe) O. Bolòs & Vigo] -. -. -. ROC(r,t). 2000-2300 m. rr. VII-VIII.
- Draba subnivalis* Braun-Blanq. [*D. tomentosa* subsp. *subnivalis* (Braun.-Blanq.) O. Bolòs & Vigo] -. -. -. ROC(r). 2100-2400 m. r. VII-VIII.
- Draba verna* (L.) DC. [*Erophila verna* (L.) DC.] Pàpoles de primavera. -. Drave de printemps. -. PRAT(r). 1240-1880 m. r. V.
- Eruca vesicaria* (L.) Cav. [*E. vesicaria* subsp. *sativa* (Mill.) Thell.] Enciam, Eruga, Ruca, Ruqueta. Eruca. Roquette cultivée. Garden rocket. ARV. 875 m. rrr. V-VII.
- Erucastrum nasturtiifolium* (Poir.) O.E. Schulz subsp. *nasturtiifolium* Ravenissa groga Oruga salvaje. Fausse roquette à feuilles de cresson. Watercress-leaved rocket. RUD. 1220-1450 m. rrr. VI-VII.
- Erysimum ochroleucum* (Schleich.) DC. subsp. *pyrenaicum* Nyman [*E. sylvestre* subsp. *pyrenaicum* (Nyman) O. Bolòs & Vigo; *E. pyrenaicum* Jordan]. Erísim nan. -. Vèlar des pyrénées. Decumbent treacle mustard. ROC(t). 1880-2780 m. c. VI-VIII.
- Erysimum ruscinonense* Jord. [*E. grandiflorum* Desf. subsp. *collisparsum* (Jord.) O. Bolòs & Vigo; *E. australe* Gay] Erísim de flor gran. Erísimo pirenaico. Vèlar de Provence. -. ROC(t)/PRAT(s). 1220-1650 m. cc. VI-VIII.
- Fourraea alpina* (L.) Greuter & Burdet [*Arabis pauciflora* (Grimm) Garcke, *Turritis brassica* Leers] -. -. Arabette pauciflore. -. HERB(v,c). 1280-1780 m. c. VI-VIII.
- Hornungia alpina* subsp. *auerswaldii* (Willk.) O. Appel [*Pritzelago alpina* subsp. *auerswaldii* (Willk.) Greuter & Burdet; *Hutchinsia alpina* (L.) R.Rb. in Aiton subsp. *alpina*] Hutquínsia alpina. -. Cresson de chamois. -. ROC(t). 2100-2800 m. c. VI-VII.
- Iberis amara* L. Matablat. Zarapico. Ibéris amer. Wild candytuft. ROC(t)/ARV. 1220-1540 m. c. VI-IX.
- Iberis sempervirens* L. Carraspic sempreverd. -. Carraspique perenne. Ibéris toujours vert. Evergreen candytuft. PRAT(s). 1400-2700 m. cc. VI-VII.
- Iberis spathulata* DC. subsp. *spathulata* Carraspic espatulat. -. Ibéris spatulé. -. ROC(t,ca). 2200-2700 m. r. VI-VIII.
- Kernera saxatilis* (L.) Sweet subsp. *saxatilis* -. -. -. ROC(r,ca). 1800 m. rrr. VII.
- Lepidium campestre* (L.) R. Br. Morritort de camp. Mostaza salvaje. Passerage des champs. Pepperwort. ARV/RUD(t). 1220-1670 m. rr. V-VI.
- Lepidium draba* L. subsp. *draba* [*Cardaria draba* (L.) Desv. subsp. *draba*] Capellans. Draba. Passerage drave. Hoary cress. RUD(t). 1220-1260 m. rrr. IV-V.
- Lepidium graminifolium* L. -. -. -. RUD(t). 1220 m. rrr. VII.
- Lepidium heterophyllum* Benth. subsp. *heterophyllum* -. -. Mastuerzo pirenaico. Passerage à feuilles variables. Smith's pepperwort. PRAT. 1550-2100 m. rrr. VI.
- Lunaria annua* L. subsp. *annua* . Setins. Hierba de la plata. Lunaire annuelle. Satin flower. RUD(h). 1200-1350 m. c. V.
- Lepidium villarsii* Gren. & Godr. subsp. *villarsii*. Error.
- Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K. Mey. [*Thlaspi perfoliatum* L.] -. Mostacilla brava. -. -. PRAT. 1500. rr. VI.
- Murbeckiella pinnatifida* (Lam.) Rothm. Braia pinnatifida. Cardámine pirenaica. Arabette pennatifide. Murbekiella. ROC(t). 1700-2720 m. c. VI-VIII.
- Nasturtium officinale* R. Br. [*Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek] Creixen. Berro de agua. Cresson de fontaine. Watercress. AQUA(cr). 1220-1320 m. rr. V-VII.

- Noccaea brachypetala*** (Jord.) F.K. Mey. [*Thlaspi brachypetalum* Jord.; *T. caerulescens* subsp. *brachypetalum* (Jord.) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot; *T. alpestre* subsp. *brachypetalum* (Jord.) Durand et Pitttier; *T. virgatum* Godr.] Traspic alpestre. -. Tabouret à pétales courts. Small-flowered Pennycress. PRAT/MAT. 1350 m. rrr. VI.
- Noccaea occitanica*** (Jord.) F.K. Mey. [*Thlaspi caerulescens* subsp. *occitanicum* (Jord.) M. Lainz; *T. alpestre* L. subsp. *alpestre* var. *tallonis* (Senn.) O. Bolòs et J. Vigo; *T. tallonis* Sennen] Citat a prop antigament, no retrobat.
- Pseudoturritis turrita*** (L.) Al-Shehbaz [*Arabis turrita* L.] Turrita. -. Arabette tourette. tower cress. HERB(v). 1240- 1860 m. cc. V-VII.
- Rapistrum rugosum*** (L.) All. -. -. -. ARV. 1240 m. rrr. VI.
- Raphanus raphanistrum*** L. subsp. *raphanistrum* -. -. -. ARV. 1240-1300 m. rrr. VI.
- Rorippa pyrenaica*** (All.) Rchb. -. -. -. RUD(t). 1230-1370 m. rr. VI.
- Rorippa sylvestris*** (L.) Besser Creixen silvestre. -. -. RUD(a,t). 1240 m. rrr. VII.
- Sinapis arvensis*** L. subsp. *arvensis* Ravenissa groga. Mostaza de los campos. Moutarde des champs. Charlock Mustard. ARV. 1240 m. rrr. VI-IX.
- Sisymbrella aspera*** (L.) Spach subsp. *aspera* [*Rorippa aspera* (L.) Maire subsp. *aspera*] -. -. -. ARV(h). 1300 m. rrr. VI.
- Sisymbrella aspera*** subsp. *praeterita* Heywood [*Rorippa aspera* (L.) Maire subsp. *praeterita* (Heywood) O. Bolòs & Vigo] -. -. -. RUD(t)(h) . 1250-1500 m. rrr. V-VII
- Sisymbrium austriacum*** Jacq. subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud Sisimbri austríac. Sisimbrio austríaco. Vélar à fleurs dorées. -. RUD. 1220-2100 m. c. VI-IX.
- Sisymbrium officinale*** (L.) Scop. Herba dels cantaires/Herba dels cantors. Erisimo. Herbe aux chantres. Hedge mustard. RUD(t). 1200-2000 m. cc.V-VIII.
- Thlaspi arvense*** L. ARV/RUD(t). 1220-1340 m. r. IV-VIII.
- Turritis glabra*** L. [*Arabis glabra* (L.) Bernh.] Àrabis glabra. -. Arabette glabre. Tower rockcress. HERB(v). 1200-1840 m. cc. V-VI.

Buxaceae

- Buxus sempervirens*** L. Boix. Boj. Buis. Common boxwood. BOSC/MAT). 360-1850 m. cc. III-IV.

Campanulaceae

- C. caespitosa*** Scop. Error.
- Campanula cochleariifolia*** Lam. Campànula nana. -. Campanule à feuilles de cochléaire. Fairy's thimble. ROC(r,t,ca). 1740-2700 m. r. VII-VIII.
- Campanula glomerata*** L. Campaneta. Campanula glomerata. Campanule agglomérée. Clustered bellflower. PRAT. 1240-2050 m. cc. VI-VIII.
- Campanula persicifolia*** L. Campaneta. Campanilla silvestre. Campanule à feuilles de pêcher. Bellflower. VOR(s). 1220-1580 m. cc. VI-VIII.
- Campanula rapunculoides*** L. -. -. -. HERB(v). rr. 1260-1420 m. VI.
- Campanula rotundifolia*** L. Campaneta blava/Campaneta de fulla rodona. -. Campanule à feuilles rondes. Spanish bellflower.
subsp. *hispanica* (Willk.) O. Bolòs & Vigo [*C. rotundifolia* subsp. *catalanica* (Podlech) O. Bolòs & Vigo] PRAT(ac). 1200-1500 m. ccc. VI-IX.
subsp. *rhomboidalis* (L.) Bonnier & Layens (Sub. *C. rhomboidalis* L.). Error.
subsp. *rotundifolia* PRAT/MAT/ROC(ac). 1350-2450 m. c. VII-IX.
- Campanula scheuchzeri*** Vill. [*C. ficarioides* Timb.-Lagr.; *C. scheuchzeri* subsp. *ficarioides* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo] Campaneta/Campaneta alpina. -. Campanule fausse ficaire. -. PRAT(ac). 1600-2700 m. ccc. VII-IX.
- Campanula trachelium*** L. Campaneta d'ortruga. Campanilla. Campanule gantelée. Bats-in-the-belfry. HERB(v)/BOSC(h). 1200-1880 m. cc. VII-IX.
- Jasione crispa*** (Pourr.) Samp. subsp. *crispa* Jasione nana. Yasione pirenaica. Botón azul rizado. Jasione ondulée. Jasione humble . PRAT(si). 1600-2680 m. c. VII-VIII.

- Jasione laevis* Lam. subsp. *laevis* Jasíone perenne. -. Jasione lisse. Smooth Sheepsbit. PRAT (ac). 1780-2660 m. r. VIII-IX.
- Jasione montana* L. Guaridora de muntanya. Té de monte. Jasione des montagnes. Sheep's bit scabious. PRAT(si). 1200-2000 m. cc. VI-VIII. MED.
- Phyteuma charmelii* Vill. Fiteuma de roca. -. Raiponce de Charmeil. -. ROC(r) (ca). 1880 m. rrr. VII.
- Phyteuma globulariifolium* Sternb. & Hoppe subsp. *pedemontanum* (Rich. Schulz) Greuter, Burdet & G. Long Fiteuma globularifòlia. -. Raiponce du Piémont. Rosette-leaved rampion. PRAT(ac)/ROC(ac). 2620-2800 m. I-IX. PRO.
- Phyteuma hemisphaericum* L. Fiteuma hemisfèrica. Fiteuma alpina. Raiponce hémisphérique. Globe-headed rampion. PRAT(ac),ROC(ac). 1700-2800 m. ccc. VI-IX
- Phyteuma nigrum* F.W.Schmidt (sub *Phyteuma halleri* All.). Error.
- Phyteuma orbiculare* L. Fiteuma orbicular. Fiteuma de prado. Raiponce orbiculaire. Round-headed rampion. PRAT(ca). 1250-2000 m. r. VI-VIII.
- Phyteuma spicatum* L. Fiteuma d'espiga. -. Raiponce en épi. Spiked Rampion. BOSC(h),HERB(v,m). 1300-2000 m. c. VI-VIII

Cannabaceae

- Humulus lupulus* L. Llúpol. Lúpulo. Houblon. Common hop. BOSC(br). 1220-1260 m. rrr. VII-VIII.

Caprifoliaceae

- Lonicera alpigena* L. Xuclamel alpi. -. Lonicéra des Alpes. Cherry woodbine. BOSC (ca). 1600-1880 m. rr. VI-VII.
- Lonicera nigra* L. Xuclamel negre. Madreselva negra. Chèvrefeuille noir. Black-fruited honeysuckle. BOSC(h). 1350-1820 m. ccc. V-VII.
- Lonicera pyrenaica* L. subsp. *pyrenaica* Xuclamel de roca. Madreselva pirenaica. Chèvrefeuille des pyrénées. Pyrenean honeysuckle. ROC(ca). 1320-2300 m. c. V-VII.
- Lonicera xylosteum* L. Xuclamel santjoaner. Madreselva. Chèvrefeuille des haies. Fly honeysuckle. BOSC.. 1200-1840 m. c. V-VII.

Caryophyllaceae

- Arenaria aggregata* (L.) Loisel. subsp. *aggregata* [*A. tetraquetra* L. subsp. *condensata* Arcang.] Arenària de coixinet. Arenaria aglomerada. Sabline capitée. Sandwort. PRAT(r,ca). 1800 m. rrr. VII.
- Arenaria grandiflora* L. subsp. *grandiflora* Arenària de flor gran. Hierba de la piedra. Sabline à grandes fleurs. Large-flowered Sandwort. PRAT(r,s). 1800-2780 m. cc. VI-VIII.
- Arenaria hispida* L. Error.
- Arenaria marschlinsii* W.D.J. Koch -. -. Sabline de Marschlins. -. ROC(t). 2420-2780 m. rrr. VI-VII. PRO.
- Arenaria serpyllifolia* L. Arenària. Arenaria común. Sabline des murs. Thime-leaved sandwort. PRAT(a). 1200-2060 m. cc. IV-VI.
- Atocion rupestre* (L.) Oxelman [*Silene rupestris* L.] Patacs petits. Silene rupestre. Silène des rochers. Rock champion. ROC(r,t)/PRAT(a)(si). 1420-2760 m. cc. VI-VIII.
- Cerastium alpinum* L. [*C. alpinum* subsp. *lanatum* (Lam.) Gremlí; *C. alpinum* subsp. *glabratum* (Hartm.) A. Love & D. Love] Cerasti alpi. Pamplinillas de los borreguiles. Céraiste des alpes. Alpine mouse ear. PRAT(s,r). 1800-2800 m. cc. VI-VIII.
- Cerastium arvense* L. -. Oreja de ratón. Céraiste des champs. Field chickweed. PRAT/MAT (ac). 1400-2200 m. cc. VI-VII.

- Cerastium cerastoides* (L.) Britton -. -. Céraiste à trois styles. -. AQUA(c,f). 2300-2650 m. r. VVII-VIII.
- Cerastium fontanum* subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet [*C. fontanum* subsp. *triviale* (E.H.L.Krause) Jalas] Cerasti de Font. -. -. -. PRAT(h)/AQUA(j). 1220-2000 m. cc. VI-VII.
- Cerastium glomeratum* Thuill. Pelovella. -. Céraiste aggloméré. Sticky mouse-ear. PRAT(a). 1240 m. rr. III-V.
- Cerastium pumilum* Curtis [*C. pumilum* subsp. *pallens* (F.W. Schultz) Schinz et Thell] Cerasti menut. -. Céraiste nain. -. PRAT(a). 1240 m. rrr. VI.
- Cerastium pyrenaicum* J. Gay Cerasti pirinenc. -. Céraiste des pyrénées. -. ROC(t). 2400-2700 m. r. VII-VIII.
- Cerastium semidecandrum* L. Cerasti semidecandre. -. Céraiste des sables. -. PRAT(a). 1220 m. rrr. V
- Cherleria laricifolia* (L.) Iamónico subsp. *diomedis* (Braun-Blanq.) A.J. Moore & Dillenb. [*Minuartia laricifolia* (L.) Schinz subsp. *diomedis* (Braun-Blanq.) Mattf.] *Minuartia laricifolia*. -. Alsine de Diomède. Larch-leaf sandwort. ROC(r)/PRAT(r). 1240-2230 m. c. VII-IX.
- Cherleria sedoides* L. [*Minuartia sedoides* (L.) Hiern] Herba de la penya. -. *Minuartia* faux orpin. Ciphel. PRAT(c,ac). 2050-2750 m. c. VII-VIII.
- Dianthus armeria* L. subsp. *armeria* Clavell de bosc. Clavelina de montaña. Oeillet arméria. Deptford pink. PRAT/HERB(v)(si). 1220-1320 m. rr. VII-VIII.
- Dianthus carthusianorum* L. . -. -. -. PRAT 1200-1500 m. r. VII.
- Dianthus deltoides* L. Clavell deltoide. Clavelina de prado. Oeillet couché. -. PRAT(ac,h). 1550-2500 m. cc. VI-VIII.
- Dianthus hyssopifolius* L. subsp. *hyssopifolius* [*D. monspessulanus* L.] Clavell/Clavell de pastor. Clavel de monte. Oeillet de montpellier. -. PRAT/HERB(v). 1200-2550 m. cc. AUS.
- Dianthus seguieri* Vill. subsp. *requienii* (Godr.) Bernal, M. Laínz & Muñoz-Garm. [*D. seguieri* subsp. *cadevallii* (Sennen & Pau) O. Bolòs & Vigo; *D. seguieri* subsp. *gautieri* (Sennen) Tutin] Clavell de bosc/Clavell de muntanya. -. Oeillet de seguier. Seguier's pink. PRAT. 1200-1800 m. cc. VII-VIII.
- Dianthus superbus* L. Error.
- Dianthus sylvestris* Wulfen. Error
- Herniaria alpina* Chaix *Herniaria alpina*. -. Herniaire des Alpes. -. ROC(t). 2500 m. rrr. VII.
- Herniaria glabra* L. Herba de les mil granes/Cent-en-grana. Hierba de la piedra. Herniaire glabre. Rupture wort. PRAT(a)/RUD(t). 1230-1480 m. r. V-IX.
- Holosteum umbellatum* L. Holosti. Estrellada. Holostée en ombelle. Umbellate chickweed. PRAT(a)/ARV. 1240-1280 m. rrr.
- Minuartia recurva* (All.) Schinz & Thell. *Minuartia recurvada*. *Minuartia arqueada*. *Minuartia* recourbée. Sickle leaved sandwort. PRAT(si). 1500-2680 m. cc. VI-VIII.
- Minuartia rostrata* (Pers.) Rchb. [*M. rubra* (Scop.) McNeill subsp. *rostrata* (Pers.) M. Laínz] -. -. *Minuartia* à rostre. -. ROC(r,m). 1340-2020 m. rrr. VIII.
- Moehringia ciliata* (Scop.) Dalla Torre Citada a prop.
- Moehringia muscosa* L. Herba prima. -. Sabline des mousses. -. ROC(r,m). 1200-1980 m. c. VI-VII.
- Moehringia trinervia* (L.) Clairv. Herba prima. *Arenaria trinervia*. Sabline à trois nervures. Three-nerved sandwort. BOSC(h). ROPC(r). 1240-1670 m. c. V-VII.
- Myosoton aquaticum* (L.) Moench Morró d'aigua. Cerastio acuático. Céraiste d'eau. Water starwort. AQUA(c)/BOSC(br). 1220 m. rrr. VII.
- Paronychia kapela* subsp. *serpyllifolia* (Chaix) Graebn. Sanguinària/Herba sanguinària. -. *Paronychia* à feuilles de serpolet. -. PRAT(s,r).ROC. 1240-2560 m. c.
- Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC. *Paroniquia poligonifolia*, Sanguinària. -. *Paronychia* à feuilles de renouée. -. ROC(t). 1940-2670 m. r. VII-VIII.
- Petrorhagia prolifera* (L.) P.W. Ball & Heywood Clavellet prolifère. Clavelina seca. Oeillet prolifère. Proliferous pink. PRAT(a). 1200-1600 m. c. V-IX.

- Rabelera holostea* (L.) M.T. Sharples & E. Tripp [*Stellaria holostea* L.] Rèvola. Estrellada. Stellaire holostée. Greater stitchwort. HER(v,c)/MAT(g). 1200-2000 m. ccc. IV-VI.
- Sabulina verna* (L.) Rchb. subsp. *verna* [*Minuartia verna* (L.) Hiern] Minuartia vernal. Minuarcia de primavera. Sabline de printemps. Spring sandwort. PRAT(ac,r). 2160-2770 m. c. VI-VIII.
- Sagina apetala* Ard. [*S. apetala* subsp. *ciliata* (Fr.) Hook. f.] Sagina apètala. -. Sagine apétale. -. RUD(t). 1240 m. rrr. VII.
- Sagina procumbens* L. Sagina procumbent. Sagina tendida. Sagine couchée. Procumbent pearlwort. RUD(t). 1220-2100 m. r. V-VII.
- Sagina saginoides* (L.) H. Karst. [*S. linnei* C.Presl] Sagina pirinenca. -. Sagine de Linné. -. AQUA(c,m,j,f,t). 2000-2500 m. rr. VI-VII
- Saponaria ocymoides* L. Falsa alfàbrega. Saponaria. Saponaire des rochers. Rock soapwort. ROC(r,t). 1240-1720 m. c. V-VII.
- Saponaria officinalis* L. Herba sabonera/Sabonera. Saponaria. Saponaire officinale. Buncing bett, Soapwort. BOSC(br). 1200-1560 m. c. VI-IX.
- Scleranthus annuus* L. Esclerant. Esclerant anual. Escleranto anual. Gnavelle annuelle. Annual knawel. PRAT(a). 1220-1540 m. c. IV-VI.
- Scleranthus perennis* L. Esclerant. -. Scléranthe vivace. -. PRAT(a). 1360-1820 m. c. VI-VII.
- Scleranthus polycarpus* L. [*S. annuus* subsp. *polycarpus* (L.) Bonnier & Layens] -. -. -. PRAT(a). 1300-1720 m. c. V-VII.
- Silene acaulis* (L.) Jacq. Silene acaule. Silene musgo. Silène acaule, Silène sans tiges. Moss campion. PRAT(a). 2000-2900 m. cc. VI-VIII.
- Silene borderei* Jord. Silene de bordère. -. Silène de bordère. -. PRAT/ROC. 2240-2300 m. rrr. VIII.
- Silene ciliata* Pourr. subsp. *ciliata* Herba ronyonera/Patacs. Silene ciliada. Silène cilié. -. PRAT(ac). 1460-2700 m. VII-VIII..
- Silene dioica* (L.) Clairv. Melandri vermell. Silene dioica. Compagnon rouge. Red campion. HERB(c,v)/RUD(h). 1200-2060 m. c. VI-VII.
- Silene flos-cuculi* (L.) Clairv. subsp. *flos-cuculi* [*Lychnis flos-cuculi* L. subsp. *flos-cuculi*] Flor de cucut. Flor de cucillo. Silène fleur de coucou. Cuckoo flower. PRAT(h). 1240 m. rrr. VI-VII.
- Silene gallica* L. Molinets. Carmentilla. Silène de France. Small-flowered Catchfly. PRAT(a). 1240-1380 m. rrr. V.
- Silene latifolia* Poir. [*S. alba* (Mill.) E. H. L. Krause subsp. *divaricata* (Reichb.) McNeill et Prentice] Colitxos. Cabaciñas. Compagnon blanc. White campion. RUD(h). 1200-2000 m.
- Silene nutans* L. subsp. *nutans* [*S. nutans* subsp. *brachypoda* (Rouy) Graebn. & P. Graebn.] Silene nutan. Silene colgante. Silène penché. Nottingham Catchfly. HERB(v). 1200-1980 m. ccc. VI-VIII.
- Silene saxifraga* L. Herba prima. -. Silène saxifrage. -. ROC(r,ca). 1475-2020 m. rr. VI-VII.
- Silene vulgaris* (Moench) Garcke subsp. *vulgaris* Pets o esclafidors/Colitxos. Collejas. Silène enflé. Bladder campion. HERB(v)/RUD(h)/ROC(t). 1200-2080 m. ccc. VI-VIII.
- Silene vulgaris* (Moench) Garcke subsp. *prostrata* (Gaudin) Schinz & Thell. Pets/Esclafidors/Colitxos. Collejas. Silène enflé. Bladder campion. ROC(t). 2600 m. rr. VIII.
- Spergula arvensis* L. Espèrgula de camp. -. Spèrgule des champs. -. ARV(si). 1230-1400 m. r. VII.
- Spergularia rubra* (L.) J. Presl & C. Presl Herba passarella. Arenaria roja. Spèrgulaire rouge. Sandwort. RUD(t). 1220-2040 m. c. V-VIII.
- Stellaria alsine* Grimm Rèvola de molleric. Stellaire alsine. -. AQUA(f,m). 1400- 2000 m. r. VI-VII.
- Stellaria graminea* L. Rèvola menuda. Estelaria. Stellaire à feuilles de graminée. Common starwort. PRAT(h)/AQUA(j). 1200-1960 m. ccc. VI-VII.
- Stellaria media* (L.) Vill. Morró. Yerba pajarera. Morgeline. Chickweed. RUD. 1200-2100 m. ccc. III-VIII.
- Stellaria neglecta* Weihe [*S. media* subsp. *major* Arcang.] -. -. Grande Stellaire. -. RUD/HERB(c). 1220-1780 m. rr. VI.

Stellaria nemorum subsp. *montana* (Pierrat) Berher [*S. nemorum* L. subsp. *glochidisperma* Murb.]
-. -. -. BOSC(h,br). 1260-1520 m. rrr. V-VII.

Viscaria alpina (L.) Don [*Lychnis alpina* L.] *Licnis alpina*. -. Silène de suède. -. PRAT(si). 2270
m. rrr. VII.

Celastraceae

Parnassia palustris L. subsp. *palustris* Fetgera blanca. Parnasia. Parnassie des marais. Grass
of Parnassus. AQUA(f,m)/PRAT(h). 1200-2700 m. cc. VII-IX.

Cistaceae

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr. ROC(ca). 1560 m. rrr. VI.

Helianthemum nummularium (L.) Mill. [*H. nummularium* subsp. *pyrenaicum* (Janch.) Hegi; *H.*
nummularium subsp. *tomentosum* auct.] Morenella/Helianthem nummular. Jarilla europea. Herbe
d'or. Rockrose. MED. PRAT. 1200-2700 m. ccc. V-VIII.

Helianthemum oelandicum subsp. *alpestre* (Jacq.) Ces. [*H. oelandicum* subsp. *italicum* sensu O.
Bolòs & Vigo; *H. oelandicum* var. *hirtum* sensu O. Bolòs & Vigo] -. -. -. PRAT(s)/ROC (ca). 1700-
2480 m. rr. VII-VIII.

Helianthemum oelandicum subsp. *italicum* (L.) Ces. Herba passerella. Jarilla. -. -. PRAT(s,r).
1220- 1980 m. c.V-VII.

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L. Corretjola. Campanilla europea. Liseron des champs. Field binweed.
1200-1680 m. c. V-VIII.

Convolvulus sepium L. [*Calystegia sepium* (L.) R. Br.] Corretjola gran. Correhuela mayor. -. -.
1200-1280 m. rrr. VI-VIII.

Cuscuta epithymum (L.) L. Cabells. Cabello de monte. Cuscuta. Great dodder. PRAT/MAT.
1220-1880 m. cc. VI-X.

Cuscuta europaea L. Cabells. Cabello de monte. Cuscuta. Great dodder. RUD(h). 1220-2020
m. c. VI-VIII.

Cornaceae

Cornus sanguinea L. Sanguinyol. Cornejo. Cornouiller sanguin. Dogwood. BOSC/MAT(b).
1200-1440 m. c. VI-VII.

Crassulaceae

Hylotelephium maximum (L.) Holub [*Sedum maximum* (L.) Suter; *S. telephium* L. subsp. *maximum*
(L.) Schinz] -. -. -. ROC(m,r)/HERB(v) (si). 1300-1660 m. r. VII-VIII.

Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba [*Sedum telephium* L.; *S. telephium* L. subsp. *fabaria* (Koch) Kirschl.]
Herba grassa/Bàlsam. -. Orpin à feuilles de fève. -. ROC(r)/HERB(v). 1600-1980 m. r. VII-IX.

Petrosedum montanum (E. P. Perrier & Songeon) Grulich [*Sedum montanum* E. P. Perrier &
Songeon subsp. *montanum*, *S. rupestre* subsp. *montanum* (E. P. Perrier & Songeon) Hegi & Em.
Schmid.] Ramiol Crespinell muntanyenc. Siempreviva de montaña. Orpin des montagnes. -.
ROC(m,t),PRAT(r). 1200-2100 m. r. VII-VIII.

Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich subsp. *sediforme* [*Sedum sediforme* (Jacq.) Pau] Crespinell
gros. Trigo pollo. Orpin de Nice. Pale stonecrop. ROC(m,t)/PRAT(a). 1200-1560 m. cc. VI-VIII.

Petrosedum reflexum (L.) Grulich [*Sedum rupestre* subsp. *reflexum* (L.) Hegi & Em. Schmid, *S.*
rupestre L.] Crespinell rupestre. Siempreviva menor. Orpin des rochers. Reflexed stonecrop.
ROC(m,t)/PRAT(a). 1200-2100 m. cc. VI-VIII.

- Sedum acre* L. subsp. **acre** ROC(m)/PRAT(r). 1200-2000 m. Crespineu groc. Siempreviva picante. Orpin âcre. Common stonecrop. PRAT(a)/ROC(m). 1200-1560 m. c. VI-VIII.
- Sedum album* L. Arròs de paret/Arròs. Pan de cuquiello. Orpin blanc. White stonecrop. ROC(m)PRAT(r). 1220-2060 m. cc. VI-VII.
- Sedum alpestre* Vill. Crespineu alpestre. Pampajarito alpino. Orpin alpestre. Alpine stonecrop. AQUA(c)/ROC(t,h). 2200-2600 m. r. VII-VIII.
- Sedum anglicum* Huds. [*S. anglicum* subsp. *pyrenaicum* Lange] Crespineu. Pampajarito pirenaico. Orpin d'angleterre. English stonecrop. ROC(t)/PRAT(a). 2000-2700 m. r. VII-VIII.
- Sedum annuum* L. Crespineu anual. Uva de moro. Orpin annuel. Annual stonecrop. PRAT(r). 1380-2100 m. c. VI-VII.
- Sedum atratum* L. Crespineu fosc. Pampajarito oscuro. Orpin noirâtre. Dark stonecrop. ROC(t)/PART(a) (ca). 2100-2780 m. c. VII-VIII.
- Sedum brevifolium* DC. Crespineu. Pampajarito rojo. Orpin à feuilles courtes. Hort-leaved stonecrop. ROC(m,r)/PRAT(a). 1200-2500 m. VI-VIII.
- Sedum candolleianum* G. López [*Mucizonia sedoides* (DC.) D.A. Webb] Crespineu de congestera. -. Orpin de candolle. -. AQUA(c). 2300-2800 m. r. VII-IX.
- Sedum dasyphyllum* L. - Arròs de paret. Pampajarito glauco. Orpin à feuilles épaisses. Corsican stonecrop. ROC(m). 1200-2100 m. c. VI-VIII.
- Sedum hirsutum* All. subsp. *hirsutum* Crespineu pelut. Pampajarito peloso. Orpin hirsute. Hairy stonecrop. ROC(r). 1200-2200 m. c. V-VII.
- Sedum villosum* L. Crespineu pilós. Pampajarito de humedal. Orpin velu. -. AQUA(f,m). 1600-1300 m. r. VII-VIII.
- Sempervivum arachnoideum* L. Matafoc teranyines. Siempreviva de telarañas. Joubarbe-araignée. Cobweb house-leek. ROC(m)/PRAT(a). 1200-2300 m. c. VII-IX.
- Sempervivum montanum* L. subsp. *montanum* Matafoc/Cebes. Siempreviva. Joubarbe des montagnes. Mountain hends and chicks. ROC(m)/PRAT(a). 1300-2800 m. c. VII-VIII.
- Sempervivum tectorum* L. subsp. *tectorum* Matafoc. Siempreviva de murs. Joubarbe des toits. Jupiter's beard. ROC(m). 1200-2560 m. r. VII-VIII.
- Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy subsp. *rupestris* Barretets de paret/Llombrígol de venus. Ombligo de venus. Ombilic de Vénus. Pennywort. ROC(m). cc. 1200-1500 m. c. VI-VII.

Cucurbitaceae

- Bryonia cretica* L. subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin [*B. dioica* Jacq.] Carabassina. Nueza, -. -. RUD(h)/MAT(b). 200-1540 . c. V-VIII.
- Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai Xíndria. Sandía. Melon d'eau. Watermelon. ARV/RUD/BOSC(br). 1240-1380 m. rr. VIII.

Dipsacaceae

- Scabiosa cinerea* Lam. [*S. columbaria* subsp. *cinerea* (Lam.) Font Quer; *S. pirenaica* auct., non All.] Error.
- Scabiosa columbaria* L. Escabiosa/Escapiosa. Escabiosa. Scabieuse colombarie. Small scabius. subsp. *affinis* (Gren. & Godr.) Nyman [*S. columbaria* subsp. *gramuntia* Bonnier & Layens, nom. illeg.] PRAT. 1200-1800 m. cc. VI-IX.
- subsp. *columbaria* PRAT. 1200-2200 m. r. VII-IX.
- Dipsacus fullonum* L. Escardot/Cardó. Cardencha. -. -. RUD(h). 1200-1560 m. c. VI-VIII.
- Dipsacus pilosus* L. -. Triquitracó. Cardère poilue. -. RUD(h)/BOSC(br). 100-1320 m. rrr. VII-VIII.
- Knautia collina* (Guérin) Jord. [*K. arvensis* subsp. *collina* (Duby) Schübl. & G. Martens; *K. arvensis* subsp. *meridionalis* (Briq.) O. Bolòs & Vigo] Escabiosa borda. Escabiosa. Scabieuse des champs. -. HERB(r). 1220 m. rrr. VII.
- Knautia subscaposa* Boiss. & Reut. [*K. arvensis* (L.) Coult. subsp. *subscaposa* (Boiss. & Reut.) Maire] Escabiosa. -. -. -. PRAT(h). 1200-18040 m. r. VI-IX.

Knautia lebrunii J. Prudhomme [*K. godetii* subsp. *lebrunii* (J. Prudhomme) O. Bolòs & Vigo; *K. dipsacifolia* subsp. *font-queri* Carrillo Ortuño & Ninot; *K. godetii* auct.] -. -. Knautie de godet. -. HERB(m). 1760-2040 m. rr. VI-IX.

Knautia nevadensis (Szabó) Szabó [*Knautia dipsacifolia* Kreutzer subsp. *arvernensis* (Briq.) O. Bolòs et Vigo; *K. arvernensis* (Briq.) Szabó subsp. *arvernensis*] Escabiosa. -. -. -. BOSC/HERB(v)/PRAT 1200-2000 m. cc. VI-IX.

var. ***nevadensis*** [*K. arvernensis* (Briq.) Szabo; *K. dipsacifolia* f. *angustata* (Rouy) O. Bolos & Vigo; *K. arvensis* var. *involuta* O. Bolos & Vigo, nom. illeg.] HERB(v)/PRAT 1280-1600 m. cc. VI-IX.

var. ***lanceolata*** (Pau) Devesa, Ortega Oliv. & J. Lopez [*K. catalaunica* Szabo; *K. dipsacifolia* subsp. *catalaunica* (Szabo) O. Bolos & Vigo] HERB(v). 1450 m. rrr. VII.

Succisa pratensis Moench - AQUA(j,m)/PRAT(h). 1200-2100 m. cc. Escabiosa/Escabiosa mossegada. Escabiosa mordida. Mors-du-diable. Devil's bit scabious. AQUA(j,m)/PRAT(h). 1220-2020 m. ccc. VII-IX.

Droseraceae

Drosera rotundifolia L. Citada del Costabona (Companyó), probablement fora del municipi.

Ericaceae

Calluna vulgaris (L.) Hull Brossa/Bruguerola. Brecina. Callune. Heather. MAT/PRAT (ac). 1200-2620 m. VIII-X. ccc.

Empetrum nigrum L. subsp. *hermaphroditum* (Hagerup) Böcher Èmpetrum. -. -. -. MAT. 2180-1270 m. VI. rrr.

Kalmia procumbens (L.) Galasso, Bansi & F. Conti [*Loiseleuria procumbens* (L.) Desv.] Herba pedrera. Azalea alpina. Azalée couchée. -. MAT. 2080-2600 m. r. VI-VII.

Rhododendron ferrugineum L. Neret. Rododendro. Rhododendron ferrugineux. Alpenrose. 1200-2750 m. cc. VI-VII.

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. Boixerola. Gayuba. Raisin-d'ours commun. Bearberry. MAT(n)/BOSC(per). 1400-2400 m. r. VI-VIII.

Vaccinium vitis-idaea L. subsp. *vitis-idaea* Citada però no retrobada. Existeix a prop.

Vaccinium myrtillus L. Nabiu. Arándano. Myrtille. -. MAT(n)/BOSC(per) (si). 1200-2800 m. cc. VI-VII.

Vaccinium uliginosum L. Nabiu uliginós. -. Myrtille des marais. Bog bilberry. MAT/BOSC/AQUA(c). 1800-2800 m. c. VI-VII.

Moneses uniflora (L.) A. Gray [*Pyrola uniflora* L.] Pírola uniflora. -. Pirole à une fleur. -. BOSC(per,ca). 1320-1780 m. r. VI-VII.

Pyrola minor L. Pírola petita. Peralito menor. Petite pirole. Small shinleaf. BOSC(per,h). 1420-2000 m. r. VI-VIII.

Pyrola chlorantha Sw. Pírola de flor verda. -. -. -. BOSC(per). 1340-1720 m. c. VI-VII.

Hypopitys hypophegea (Wallr.) G. Don [*Monotropa hypophegea* Wallr.; *M. hypopitys* var. *glabra* Roth] Xuclapins. -. -. -. BOSC(h). 1340 m. rr. VI.

Hypopitys monotropa Crantz [*Monotropa hypopitys* L.] BOSC(h). 1620-1780 m.r. VII.

Euforbiaceae

Mercurialis annua L. Melcoratge. Malcoraje. Mercuriale annuelle. -. ARV/RUD. 1200-1780 m. c. III-VI.

Mercurialis perennis L. Melcoratge de bosc. Berza perruna. Mercuriale vivace. -. 1220-1980 m. c. IV-VI.

Euphorbia prostrata Aiton [*Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small] -. -. -. RUD(t). 1220-1250 m. r. VI. AL/ESP.

Euphorbia lathyris L. Herba talpera. Tártago. Euphorbe épurge. Caper spurge. ARV. 1220-1260. rr. VI. AL/SUB.

- Euphorbia amygdaloides* L. subsp. *amygdaloides* Lleteresa de bosc. Lechetrezna del bosque. Euphorbe des bois. Wood spurge. BOSC/HERB(v). 1200-1600 m. c. V-VI.
Euphorbia cyparissias L. Lletera de fulla estreta. Lechetrezna común. Euphorbe petit-cyprès. -. PRAT. 1200-2200 m. cc. V-VI.
Euphorbia exigua L. subsp. *exigua* -. Lechetrezna romeral. -. -. PRAT(a)/ARV. rrr. VI.
Euphorbia helioscopia L. subsp. *helioscopia* Lleterola d'hort. Lechetrezna. Euphorbe réveille-matin, Sun spurge. ARV/RUD. 1200-2000 m. c. IV-IX.
Euphorbia nicaeensis All. subsp. *nicaeensis* Lleteresa. -. -. -. Prat(s). 1240-1580 m. c. VI-VII.
Euphorbia peplus L. RUD(t). 1240-1320 m. r. VI-IX.
Euphorbia serrata L. f. *phylloclada* (Lge. in Wk. et Lge.) O. Bolòs et Vigo PRAT(r). 1240 m. rrr. VI.
Euphorbia villosa Willd. Lleteresa pilosa. -. Euphorbe poilue. -. HERB(c). 1220-1240 m. rrr. VI.

Fabaceae

- Anthyllis montana* L. Antil-lis de muntanya. -. Anthyllide des montagnes. Mountain kidney vetch. ROC/PRAT. 1450-2225 m. r. V-VI.
Anthyllis vulneraria subsp. *sampaioana* (Rothm.) Vasc. [*A. vulneraria* subsp. *forondae* (Sennen) Cullen] Vulnerària. Vulneraria. Anthyllide vulnéraire. Common Kidneyvetch. PRAT(s) 1200-1920 m. c. VI-VII.
Anthyllis vulneraria subsp. *vulnerarioides* (All.) Arcang. Vulnerària alpina. Vulneraria. Anthyllide fausse vulnéraire. -. PRAT(ca). 1670-2660 m. c. VI-VII.
Astragalus alpinus L. -. -. -. PRAT(ca) 2000-2700 m. rr. VII-VIII.
Astragalus australis (L.) Lam. -. -. -. PRAT(ca). 1750-2600 m. r. VII-VIII.
Astragalus australis var. *gerardii* (Vill.) Coulot & Rabaute [*Phaca gerardii* Vill.]. Error.
Astragalus depressus L. Pla de Rus VR 1800 ruderal única localitta
Astragalus glycyphyllos L. Regalíssia borda. Regaliz borde. Astragale réglisse. Wild Liquorice. BOSC(h)/HERB(v). 1340-1400 m. rrr. V-VI.
Astragalus monspessulanus subsp. *gypsophyllus* Rouy [*A. monspessulanus* L. subsp. *chlorocyaneus* (Boiss. & Reut.) Rivas Goday & Borja] Herba de sant Llorenç. Astrágalo espigado. Astragale de montpellier. False vetch. PRAT(s)/ROC(r). 1240-1820 m. c. V-VI.
Astragalus monspessulanus L. subsp. *monspessulanus* Herba de sant Llorenç. Astrágalo espigado. Astragale de montpellier. False vetch. PRAT(s)/ROC(r). 1280 m. rrr. VII.
Astragalus monspessulanus L. subsp. *monspessulanus* var. *alpinus* Fouc. -. -. -. PRAT(ca). 1700-2400m. c. VI-VII.
Astragalus sempervirens Lam. [*A. sempervirens* subsp. *catalaunicus* (Braun.-Blanq.) M. Lainz] -. -. -. PRAT/ROC(ca). r. VI-VII.
Coronilla minima L. subsp. *minima* Coroneta de fulles menudes. -. Coronille naine. -. PRAT(s,ca). 1400-2020 m. r. VI.
Cytisus oromediterraneus (G. López & C.E. Jarvis) Rivas Mart., T.E. Díaz, Fern. Prieto, Loidi & Penas [*Genista balansae* (Boiss.) Rouy subsp. *europaea* (G. López et C. E. Jarvis) O. Bolòs et Vigo] Bàlec. Piorno. Gênet purgatif. Pyrenean broom. MAT(s). 1600-2400 m. cc. V-VII.
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. *scoparius* [*Sarothamnus scoparius* (L.) Wimm. subsp. *scoparius*] Ginesta/Ginestell. Retama de escobas. Genêt à balais. Broom. MAT(b,g). 1200-1600(1950) m. cc. IV-VII.
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. Lang [*Cytisus sessilifolius* Mill.]. Ginesta sessilifòlia. -. Cytise à feuilles sessiles. -. ROC(ca). 1700 m. rrr. VI.
Ervilia hirsuta (L.) Opiz [*Vicia hirsuta* (L.) Gray] HERB(v)/RUD(h). 1220-1980 m. cc. VI-VII.
Genista hispanica L. subsp. *hispanica* -. -. -. PRAT(s)/ROC (ca). 1500-1800 m. rr. V-VI.
Genista pilosa L. Ginestola pilosa. Ginestola. Genêt velu. Gold flash broom. PRAT/MAT/ROC(ac). 1220-2000 m. cc. V-VII.

- Genista sagittalis* L. [*Chamaespartium sagittale* (L.) P.E. Gibbs subsp. *sagittale*] Itjol/Gaiol, Abulaga. Genistrelle. Arrow-jointed broom. PRAT/MAT(ac). 1200-2260 m. c. V-VII.
- Genista scorpius* (L.) DC. Argelaga. -. -. PRAT(s,ca). 1400-1720 m. rr. IV-VI
- Hippocrepis emerus* (L.) Lassen subsp. *emerus* [*Coronilla emerus* L.] Coronil·la boscana. Aliagueto. Coronille des jardins. False senna. BOSC(s). 1220-1560 m. c. V-VI.
- Hippocrepis comosa* L. Desferracavalls. Herraduras. Hippocrépide chevelue. Horseshoe vetch. PRAT(s). 1220-2450 m. c. V-VI.
- Lathyrus aphaca* L. Gerdell. Arvejo. Gesse aphaca. Yellow vetchling. ARV. 1240-1280 m. rr. V-VI.
- Lathyrus latifolius* L. Pèsol bord. Albejana basta. Gesse à larges feuilles. Perennial sweet pea. HERB(v). 1240-1280 m. rr. VI-VII.
- Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler [*L. montanus* Bernh.] Guixó de muntanya. -. Gesse à feuilles de lin. -. BOSC/MAT/HERB(v)(ac). 1220-2080 m. cc. V-VIII.
- Lathyrus occidentalis* (Fisch. & C.A. Mey.) Fritsch [*L. laevigatus* (Waldst. et Kit.) Gren.] Guixó groc. -. -. BOSC(h)/HERB(v,m). 1340-1980 m. r. VI-VII.
- Lathyrus pratensis* L. Guixó de prat. Latiro de prado. Gesse des prés. Meadow pea. PRAT(h) AQUA. 1200- 2080 m. cc. VI-VIII.
- Lathyrus vernus* (L.) Bernh. Guixó vernal. -. -. BOSC(h)/HERB(v). 1430-1780 m. rr. V-VI.
- Lotus alpinus* (DC.) Ramond [*Lotus corniculatus* L. subsp. *alpinus* (DC.) Rothm.] Corona de rei. Cuernecillo alpino. Lotier des alpes. Alpine bird's-foot trefoil. PRAT. 1940-2750 m. cc. VI-VIII.
- Lotus corniculatus* L. Banya de cabra/Corona de rei. Corona de rey. Lotier corniculé. Bird's foot trefoil. PRAT. 1200-2100 m. ccc.
- Lotus pedunculatus* Cav. Lot d'aiguamoll. Cuernecillo de turbera. Lotier des des marais. Greater bird's- foot-trefoil. AQUA(j,m). 1320-1800 m. c. VI-VIII.
- Medicago arabica* (L.) Huds. [*M. maculata* Willd.] Herba de la taca. Mielga pintada. Luzerne tachetée. Spotted bur-clover. PRAT/ARV/RUD(t). 1230-1460 m. rr. V. AL/INV.
- Medicago lupulina* L. Fenarola menuda. Carretón. Luzerne lupuline. Black medick. PRAT(h). 1200- 2080 m. cc. V-VIII.
- Medicago minima* (L.) L. Melgó mínim. Carretilla menor. Luzerne naine. Bur medick. PRAT(a). 1230-1620 m. r. V-VI.
- Medicago sativa* L. subsp. *sativa* Userda/Alfals. Alfalfa. Luzerne cultivée. Alfalfa. RUD/ARV/HERB. 1200-1560 m. c. V-X. ESP.
- Medicago suffruticosa* DC. Melgó fruticós. -. Luzerne sous-ligneuse. -. PRAT. 1260-2450 m. c. V-VIII.
- Melilotus albus* Medik. Almegó blanc. Meliloto blanco. Mélilot blanc. White melilot. RUD(h). 1220-2000 m. c. VI-VII.
- Melilotus altissimus* Thuill. Melilot altíssim. -. Grand mélilot. -. RUD(h). 1200-1470 m. r. VI-VIII.
- Melilotus officinalis* (L.) Pall. Almegó oficial. Meliloto oficial. Mélilot officinal. Common melilot. RUD(h). c. VI-VIII.
- Onobrychis viciifolia* Scop. Trepadella. -. -. HERB(r). 1260 m. rrr. VI. AL/SUB.
- Ononis cristata* Mill. Gavó alpí. Garbancilla. Bugrane à crête. -. PRAT(r)/ROC(t) (ca). 1700-2300 m. rr. VII-IX.
- Ononis natrix* L. . -. -. PRAT(s,r)/ROC(t) 1450-2000 m. r. VI-VIX.
- Ononis pusilla* L. subsp. *pusilla* . -. -. PRAT(r,s). 1450-1620 m. rr. VII-VIII.
- Ononis rotundifolia* L. . -. -. ROC(c)/PRAT(r). 1700 m. rrr. VII.
- Ononis spinosa* L. Gavó espinós. Gatuña. Bugrane épineuse. Spiny rest harrow. PRAT. 1220-1720 m. c. VI-VII.
- Ononis striata* Gouan PRAT(r)/ROC(r). 1450-2100 m. r. VII-IX.
- Ornithopus perpusillus* L. . -. -. PRAT(r). 1430 m. rrr. VI.
- Oxytropis campestris* (L.) DC. subsp. *campestris* Oxítrop campestre. -. Oxytropis des alpes. Yellow oxytropis. PRAT (s,r,ca). 1600-2500 m. cc. VI-VIII.

- Oxytropis halleri*** Bunge subsp. ***halleri*** [*O. halleri* Bunge subsp. *halleri* var. *ochroleuca* Costa] Oxítrop de haller. Oxytropis azul. Oxytropis de haller. Purple Oxytropis. PRAT(s,r,ca). 1900-2800 m. c. VI-VIII.
- Oxytropis pilosa* (L.) DC. Error
- Robinia pseudoacacia* L. Escàcia. Falsa acacia. Robinier faux acacia. Black locust. BOSC/PRAT. 1200-1450 m. r. V-VI. AL/INV.
- Lotus maritimus*** L. [*Tetragonolobus maritimus* (L.) Rothm.] . - . - . AQUA(m,j). 1240-1650 m. r. V-VII.
- Trifolium alpinum*** L. Regalíssia/Regalíssia de muntanya. Regaliz de puerto. Trèfle alpin. Alpine clover. PRAT(h). 1650-2850 m. cc. VI-VIII.
- Trifolium arvense*** L. Peu de llebre. Pata de liebre. Trèfle pied-de-lièvre. Stone clover. PRAT(a). 1200-1560 m. c. VI.
- Trifolium aureum*** Pollich Trèvol daurat. Trèbol de prado. Trèfle doré. Hop clover. PRAT/HERB(v). 1240-1800 m. r. VI-VII.
- Trifolium badium*** Schreb. PRAT(h). 1980-2200 m. rrr. VII-VIII
- Trifolium campestre*** Schreb. Fenarola. Trèbol campesino. Trèfle des champs. Low hop clover. PRAT(s,a). 1200-1860 m. cc. V-VIII.
- Trifolium dubium*** Sibth. Trèvol menut. Trèbol amarillo. Petit Trèfle jaune. Lesser trefoil. PRAT(h). 1200-1560 m. c. V-VI.
- Trifolium incarnatum*** L. subsp. ***incarnatum*** trèfola, fenc, fe. . - . - . RUD(t). 1240 m. rrr. VI.
- Trifolium medium*** L. subsp. ***medium*** Trèvol mitjà. Trèbol de bosque. Trèfle flexueux. Zigzag clover. HERB(v). 1200-1800 m. c. VI-VII.
- Trifolium montanum*** L. Trèvol de muntanya. Trèbol de montaña. Trèfle des montagnes. Mountain clover. PRAT. 1230-2000 . c. VI-VIII.
- Trifolium ochroleucon*** Huds. Trèvol oroleuc. Trèbol pàlido. Trèfle jaune pâle. Sulphur clover. PRAT/HERB(v). c. V-VII.
- Trifolium pallescens*** Schreb. ROC(t). 2200-2300 m. rrr. VIII.
- Trifolium pratense*** L.
var. ***pratense*** Trèfola/Trèvol de prat. Trèbol de prado. Trèfle des prés. Broad-leaved clover. PRAT(h). 1200-2200 m. ccc. V-IX.
var. ***villosum*** DC. in Lam. et DC. [var. *alpinum* Hoppe in Sturm; var. *nivale* Koch] PRAT(h, ca). 1890-2400 m. r. VII-IX.
- Trifolium repens*** L. - Trefolet/Trevolet de prat. Trèbol blanco. Trèfle blanc. White clover. PRAT(h)/RUD(t). 1200-2400 m. ccc. V-X.
- Trifolium rubens*** L. HERB(v). . - . - . 1480 m. rrr. VII.
- Trifolium scabrum*** L. Trèvol escabre. Trèbol áspero. Trèfle scabre. Rough clover. PRAT(a). 1240 m. rrr. VI.
- Trifolium striatum*** L. subsp. ***brevioidens*** (Lange) Munoz Rodr. . - . - . PRAT(r). 1240-1560 m. r. VI-VII.
- Trifolium spadiceum*** L. . - . - . AQUA(m). 1770 m. rrr. VII.
- Trifolium thalii*** Vill. . - . - . PRAT(ca). 1920-2670 m. rr. VII-VIII.
- Vicia angustifolia*** L. [*V. sativa* subsp. *nigra* (L.) Ehrh.] Veça. Veza. Vesce commune. Common vetch. PRAT/ARV/RUD(h). 1240- 1780 m. c. V-VI.
- Vicia cracca*** L. [*V. cracca* subsp. *cracca*] - . - . - . HERB(c,v). 1350-1560 m. r. V-VII.
- Vicia dasycarpa*** Ten. [*V. villosa* Roth subsp. *varia* (Host.) Corb.] Garlanda pilosa. -. Vesce bigarrée. Hairy vetch. ARV/RUD(h). 1200-1680 m. c. V-VII.
- Vicia incana*** Gouan [*V. cracca* subsp. *incana* (Gouan) Rouy; *V. incana* subsp. *gerardii* Gaudin] Garlanda. Alverja. Vesce blanchâtre. Tufted vetch. HERB(v). 1460 m. rrr. VII.
- Vicia lathyroides*** L. . - . - . PRAT. 1220 m. rrr. VI.
- Vicia onobrychioides*** L. . - . - . HERB(v)/PRAT. 1260-1480 m. rr. VII.
- Vicia orobus*** DC. * - . - . *Orobe des landes*. -. HERB(m). 1250-1940 m. rrr. VI.
- Vicia pyrenaica*** Pourr. Arvellola pirinenca. Arveja de los Pirineo. Vesce des pyrénées. -. PRAT(s,ca). 1560-2460 m. cc. VI-VII.

Vicia pseudocracca Bertol. [*V. villosa* subsp. *pseudocracca* (Berol.) Rouy; *V. villosa* subsp. *ambigua* (Guss.) Kerguelen] . -. -. ARV. 1240. rrr. VII.

Vicia sativa L. . -. -. ARV/RUD.1410 m. rrr. VI.

Vicia sepium L. Veça de bosc. Arveja silvestre. Vesce des haies. Bush vetch. HERB(v). 1200-2040 m. cc. V-VII.

Vicia tenuifolia Roth [*V. cracca* subsp. *tenuifolia* (Roth) Gaudin] HERB(v,c). 1260-1620 m. cc. VII-VIII.

Vicia villosa Roth [*V. villosa* Roth subsp. *villosa*] ARV. 1220-1230 m. rrr VI-VII.

Fagaceae

Castanea sativa Mill. Castanyer. Castaño. Châtaignier. Sweet Chestnut. BOSC(h). 1270-1310 m. rrr. VI-VII.

Fagus sylvatica L. Faig. Haya. Hêtre. Beech. BOSC(h). 1240-1700 m. r. IV-V.

Quercus petraea (Matt.) Liebl. Roure de fulla gran. Roble albar. Chêne sessile. Sessile oak. BOSC(s). 1220-1800 m. cc. V-VI.

Quercus pubescens Willd. [*Q. humilis* Mill.] Roure martinenc. Roble común. Chêne pubescent. Downy oak. BOSC(s). 1450-1580 m. rr. IV-V.

Gencianaceae

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. *perfoliata* Centaura groga. Centaurea amarilla. Chlore perfoliée. Yellow-wort. PRAT(h)/AQUA(j). 1240-1600 m. rr. VI-VII.

Centaureum erythraea Rafn subsp. *erythraea* Herba de santa margarida. Centaura menor. Petite-centaurée commune. Common centaury. PRAT. 1540 m. rrr. VI.

Centaureum pulchellum (Sw.) Druce AQUA(j). 1240 m. rrr. VII.

Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok. [*Gentiana tenella* Rottb.] AQUA(c,ca). 1980-2740 m.rr. VII-IX.

Gentiana acaulis L. [*Gentiana acaulis* L. subsp. *acaulis*] Genciana/Genciana acaule. Genciana acaule. Gentiane acaule. Stemless gentian. PRAT(h). 1440-2400 m. cc. IV-VII.

Gentiana alpina Vill. Genciana alpina. -. Gentiane des Alpes. -. PRAT(ac). 1900-1760 m. c. VI-VIII.

Gentiana burseri Lapeyr. subsp. *burseri* Genciana de burser. Genciana amarilla. Gentiane de burser. -. MAT(n)/HERB(m). 1500-2400 m. c. VII-VIII. MED/ALI.

Gentiana cruciata L. Genciana cruciada. Genciana cruciada. Gentiane croisette. Cross gentian. PRAT(h)/HERB(v). 1500-1680 m. r. VII-VIII.

Gentiana lutea L. subsp. *lutea* Genciana/Genciana groga. Genciana amarilla. Gentiane jaune. Yellow gentian. PRAT(h). 1200-2280 m. cc. VI-VII. MED.

Gentiana ×marcailhouana Rouy [*G. lutea* × *G. burseri*] MAT(n). 2080 m. rrr. VII.

Gentiana nivalis L. Genciana nival. Genciana nival. Gentiane des neiges. Snow gentian. PRAT(ca). 1940-2400 m. rr. VII-X.

Gentiana pneumonanthe L. Gentiana d'aiguamoix. -. -. AQUA(m). 2000 m. EX RE. VII-X. PROT.

Gentiana pyrenaica L. Genciana pirinenca. Genciana pirenaica. Gentiane des pyrénées. Pyrenean gentian. PRAT(h). 1640-2400 m. cc. V-VIII.

Gentiana utriculosa L. Error.

Gentiana verna L. [*G. schleicheri* (Vacc.) Kunz; *G. terglouensis* subsp. *schleicheri* (Vacc.) Tutin] Pastorella. Genciana azul. Gentiane de printemps. Spring gentian. PRAT. 1200-2840 m. cc. IV-IX.

Gentianella campestris (L.) Börner subsp. *campestris* [*Gentiana campestris* L. subsp. *campestris*] Genciana/Genciana campestre. Gencianela alpina. Gentiane des champs. Field gentian. PRAT(h). 1200-2800 m. cc. VI-IX.

Gentianopsis ciliata (L.) Ma subsp. *ciliata* [*Gentiana ciliata* L. subsp. *ciliata*; *Gentianella ciliata* (L.) Borkh.] Genciana ciliada. Genciana ciliada. Gentiane ciliée. Fringed gentian. PRAT(h). 1300-1880 m. r. VIII-X.

Swertia perennis L. Esvertia. Genciana morada. Swertie vivace. Star svertia. AQUA(m). 1980-2350 m. r. VII-IX.

Geraniaceae

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Agulles de bruixa. Aguja de pastor. Bec-de-grue à feuilles de ciguë. Common storks bill. ARV/RUD(t)/PRAT(a). 1200-2100 m. c. III-VII.

Geranium columbinum L. Gerani de colom. Geranio pie de paloma. Pied-de-pigeon. Long-stalked crane's-bill. RUD(h)/ARV/PRAT. 1200-1750 m. c. V-VIII.

Geranium dissectum L. Gerani de fulles retallades. Geranio recortado. Gèranium découpé. Cut-leaf geranium. RUD(h). 1200-1500 m. r. V-IX.

Geranium molle L. Suassana blana. Geranio peloso. Gèranium à feuilles molles. Dove's-foot crane's-bill. RUD. 1200-1450 m. IV-VI.

Geranium nodosum L. Gerani nuós. Geranio nodoso. Gèranium à tige noueuse. Knotted cranesbill. BOSC(h). 1200-1380 m. rrr. VI-VII.

Geranium phaeum L. Gerani obscur. Geranio oscuro. Gèranium brun.. Dusky cranesbill. HERB(c)/BOSC(h). 1250 m. rrr. VI-VII.

Geranium pratense L. Gerani de prat. Geranio de prado. Gèranium des prés. Meadow geranium. PRAT(h)/HERB(m). 1550-1600 m. rrr. VI-VII.

Geranium pusillum L. RUD(t). 1240-1560 m. r. VII-IX.

Geranium pyrenaicum Burm. f. subsp. *pyrenaicum* Suassana pirinenca. Geranio pirenaico. Gèranium des pyrénées. Pyrenean cranesbill. RUD/HERB(v). 1200-2120 m. cc. V-IX.

Geranium robertianum L. Cicuta/Herba de Sant Robert. Geranio de San Roberto. Herbe à Robert. Herb Robert. ROC/HERB(v)(h). 1200-2000 m. cc. V-VIII.

Geranium rotundifolium L. Suassana rotundifòlia. Sausana. Gèranium à feuilles ronde. Round-leaved crane's-bill. RUD. 1200-1520 m. c. V-VII.

Geranium sanguineum L. Gerani sanguini. Geranio sanguíneo. Gèranium rouge sang. Blood-red crane's-bil. HERB(v). 1520-1700 m. rrr. VI.

Geranium sylvaticum L. subsp. *sylvaticum* Gerani de bosc. Geranio de bosque. Gèranium des forêt. Wood cranesbill. HERB(m,c,v)/PRAT(h). 1340-1980 m. c.

Gesneriaceae

Ramonda myconi (L.) Rchb. Orella d'ós. Oreja de oso. Ramondie des pyrénées. -. ROC(r). 1200-1800 m. rrr. VI.

Glossulariaceae

Ribes alpinum L. Cirerola. Grosellero de montaña. Groseillier des alpes. Alpine currant. MAT(n)/HERB(c,m). 1250-1880 m. c. V-VI.

Ribes petraeum Wulfen Grosella/Riber silvestre. Grosellero pirenaico. Groseillier des rochers. Rock red currant. BOSC/MAT(h). 1260-1540 m. rr. V-VI.

Hipericaceae

Hypericum humifusum L. Hipèric humifús. -. Millepertuis couché. -. AQUA(j). 1500 m. rrr.

Hypericum maculatum Crantz subsp. *maculatum* Hipèric maculat. Hipérico no perforado. Millepertuis taché. Imperforate St, John's-wort. HERB(m,v,c)/PRAT/MAT(g). 1200-2200 m. ccc. VI-VII.

Hypericum montanum L. Hipèric muntanyenc. -. Millepertuis des montagnes. -. HERB(v)/BOSC. 1240-1620 m. c. VI-VII.

Hypericum perforatum L. Flor de cop/ Herba de Sant Joan. Hipericón. Millepertuis perforé. Perforate St. John's wort. HERB(v)/PRAT(s). ccc. 1200-2000 m. VI-VIII.

Hypericum tetrapterum Fr. Hipèric tetràpter. - . - . AQUA(j,c). 1220-1660 m. c. VI-VII.

Juglandaceae

Juglans regia L. Noguer. Nogal. Noyer. Walnut. BOSC(h). 1240 m. rr. V. AL/ESP.

Labiatae

Ajuga genevensis L. Error.

Ajuga pyramidalis L. subsp. *pyramidalis* Bújula piramidalis. Búgula piramid. Bugle pyramidale. Pyramidal bubble. PRAT/MAT(n). 1560-2330 m. c. VII-VIII.

Ajuga reptans L. Búgula. Consuelda media. Bugle rampante. Bugleweed. BOSC(h). 1220-1780 m. r. IV-V.

Ballota nigra L. [*B. nigra* subsp. *foetida* (Vis.) Hayek] Malrubí nere. Manrubio bastardo. - . - . RUD(h). 1240- 1620 m. c. VI-VII.

Betonica officinalis L. [*Stachys officinalis* (L.) Trevisan] Betònica. Betónica. Bétoine officinal. Betony. MAT/BOSC/PRAT(ac). 1200-2000 m. VI-VII.

Clinopodium vulgare L. [*Satureja vulgaris* (L.) Fritsch; *Calamintha clinopodium* Benth.] Orenga borda. Clinopodio. Grand basilic. Cushion calaminth. HERB(v,s)/PRAT(s). 1200-1600 m. ccc. VII. VIII.

Clinopodium nepeta subsp. *sylvaticum* (Bromf.) Peruzzi & F. Conti [*Calamintha nepeta* subsp. *sylvatica* (Bromf.) R. Morales] - . - . - . HERB(v)/ROC(m). 1230-1250 m. rrr. VIII-XI.

Galeopsis angustifolia Hoffm. [*G. ladanum* subsp. *angustifolia* (Hoffm.) Celak.] Galeopsis de fulla estreta. - . Galéopsis à feuilles étroites. Red hemp-nettle. ROC(t). 1380-1680 m. rr. VI-VII.

Galeopsis ladanum L. subsp. *ladanum* Galeopsis vermella. - . - . Galéopsis intermédiaire. Red hemp nettle. ARV/ROC(t). 1220-1450 m. r. VI-VII.

Galeopsis pyrenaica Bartl. [*Galeopsis ladanum* L. subsp. *pyrenaica* (Bartl.) O. Bolòs] Galeopsis pirinenca. - . Galeopse des Pyrénées. Pyrenean hemp-nette. ROC(t). 1320-2680 m. cc. VIII-IX.

Galeopsis tetrahit L. subsp. *tetrahit* Tetrahit. Galeópside de bosque. Galéopsis tétrahit. Bristle-stem hemp nettle. RUD(h)/HERB(c). 1240-2040 m. c. VII-VIII.

Lamium album subsp. *album* Ortiga blanc/Ortiga morta blanca. Ortiga muerta blanca. Lamier blanc. White archangel. RUD(h). 1620-2120 m. r. VI-VIII.

Lamium amplexicaule L. Flor-rubí. Patuca de gallo. - . - . ARV. 1220-1430 m. c. IV-VI.

Lamium galeobdolon (L.) Crantz subsp. *montanum* (Pers.) Hayek [*L. galeobdolon* auct.] Ortiga morta groga. Ortiga muerta amarilla. Lamier jaune. Yellow archangel. BOSC(h,br). 1220- 1720 m. r. V-VI.

Lamium hybridum Vill. - . - . - . ARV. 1240 m. rrr. V.

Lamium maculatum L. Lami maculat. - . Lamier tacheté. Spotted dead-nette. HERB(c,v)/RUD(h). r. 1200-1850 m. V-VII.

Lamium purpureum L. - . - . - . ARV/HERB(h). 1240-1280 m. rr. VI.

Lycopus europaeus L. Malrubí d'aigua. Menta de lobo. Lycope. Gypsywort. AQUA(j,cr). 1220-1250 m. rrr. VII-VIII.

Marrubium vulgare L. - . - . - . RUD(h). 1480 m. rrr. VII.

Melissa officinalis L. - . - . - . BOSC(br). 1240 m. rrr. VI. AL/INV.

Melittis melissophyllum L. Melissot. Melisa bastarda. Mélitte à feuilles de mélisse. Bastard balm. HERB(v,s)/BOSC(s). 1240 m. rrr. VI.

Mentha aquatica L. Menta d'aigua. Menta acuática. Menthe aquatique. Water mint. AQUA(cr). 1240 m. rrr. VII.

Mentha arvensis L. Menta arvensis. Menta. - . - . AQUA(j,c). 1200-1480 m. rr. VII

Mentha longifolia (L.) Huds. Menta de llop/Menta boscana. Mastranzo silvestre. Menthe des bois. Downy mint. AQUA(j,c,m). 1220-2100 m. cc. VII-VIII.

Mentha spicata L. - . - . - . 1240 m. AQUA(h). rrr. VII.

- Mentha suaveolens* Ehrh - . - . - . AQUA(h,j). rrr. VII.
- Mentha ×rotundifolia* (L.) Huds. [*M. longifolia* × *M. suaveolens*] - . - . - . AQUA(h,j). rrr. VII.
- Nepeta cataria* L. RUD(h). 1250 m. rrr. VII. AL/SUB.
- Nepeta nepetella* L. ROC(t). 2500 m. rrr. VII.
- Nepeta latifolia* DC. [*N. nuda* subsp. *latifolia* (DC.) O. Bolòs & Vigo] Nepta violàcia. -. Népéta à feuilles larges. -. RUD(h). 1300-1780 m. rr. VII-VIII.
- Origanum vulgare* L. Orenga/Moradui. Orégano. Marjolaine sauvage. European oregano HERB(v,s),PRAT(s). 1200-1600 m. cc. VII-IX.
- Prunella grandiflora* (L.) Scholler [*P. grandiflora* (L.) Scholler subsp. *pyrenaica* (Gren. et Godr.) A. et O. Bolòs] Herba del traïdor/Prunel·la grandiflora. Consuelda mayor. Brunelle à grandes fleurs. Bigflower selfheal. MAT(g)/PRAT,HERB(v)(h). 1200-2275 m. cc. VI-IX.
- Prunella laciniata* (L.) L. Prunella blanca. Prunela blanca. Brunelle blanche. Cut leaved self-heal. PRAT(s). 1200-1620 m. c. VI-VIII.
- Prunella vulgaris* L. Prunel·la vulgar. Hierba de las heridas. Brunelle commune. Self-heal. PRAT(h),AQU(m,j). 1200-2180 m. cc.
- Prunella x coutinhoi* Rouy [*P. grandiflora* × *vulgaris*] PRAT(ac). 1480 m. rrr. VII
- Prunella ×bicolor* Beck [*P. grandiflora* × *P. laciniata*] PRAT(ac). 1460 m. rrr. VII.
- Prunella ×intermedia* Link [*P. laciniata* × *P. vulgaris*] PRAT. 1560 m. rrr. VII.
- Salvia glutinosa* L. Sàlvia de flor groga. -. Sauge glutineuse. Jupiter's distaff/Sticky sage. 1240-1480 m. rr. VIII-IX.
- Salvia pratensis* L. Sàlvia silvestre/Sàlvia de prat. Salvia de prado. Sauge des prés. Meadow clary. PRAT(s). 1220-1720 m. c. V-VII.
- Salvia verbenaca* L. Tàrrec. Gallocresta. Sauge verbénacée. Vervain. PRAT(s,r). 1230-1280 m. rrr. V.
- Satureja montana* L. subsp. *montana* ROC(r). 1450-1800 m. rr. VII-IX.
- Scutellaria alpina* L. subsp. *alpina* Escutel·lària alpina. Tercianera alpina. Scutellaire des alpes. -. ROC(t,ca). 1580-2580 m. r. VII-VIII.
- Sideritis hirsuta* L. Herba de la feridura. Sajareña. Crapaudine hirsute. -. PRAT/ROC (s). 1380 m. rrr. VII.
- Sideritis hyssopifolia* L. . Herba del bàlsam. Rabogato pirenaico. Crapaudine à feuilles d'hysope. -. 1420-2620 m. ccc. VI-VIII.
- Stachys alpina* L. Estaquis alpina. -. Épiaire des alpes. -. HERB(c,m). 1500-1980 m. rrr. VI-VII.
- Stachys palustris* L. Estaquis palustre. Ortiga hedionda. Épiaire des marais. Marsh woundwort. AQUA(j). 1220-1260 m. rr. VI-VII.
- Stachys recta* L. Herba de Sant Antoni. Hierba de la perlesia. Épiaire droite. Perennial yellow woundwort. PRAT(s). 1240-1680 m. c. VI-VIII.
- Stachys sylvatica* L. Ortiga pudent. Betónica mayor. Épiaire des bois. Hedge woundwort. HERB(c,v). c. 1200-1780 m. VI-VII.
- Teucrium botrys* L. - . - . - . ROC(c). 1340 m. rrr. VII.
- Teucrium chamaedrys* L. [*T. chamaedrys* subsp. *pinnatifidum* (Sennen) Rech. fil.; *T. chamaedrys* subsp. *germanicum* (F. Hermann) Rech. fil.] Camedris. Camedrio. Germandrée petit-chêne. Wild germander. ROC. 1220-1560 m. r. VI-VIII.
- Teucrium pyrenaicum* L. subsp. *guarensis* P. Monts. Angelins. Zamarrilla pirenaica. Germandrée des Pyrénées. Pyrenean germander. PRAT(s). 1220-1880 m. c. VI-VII.
- Teucrium scorodonia* L. Escorodònia. Camedrio de los bosques. Germandrée scorodoine. Wood sage. BOSC/MAT(g,ac). 1200-1700 m. cc. VI-VIII.
- Thymus drucei* Ronniger [*Th. praecox* Opiz subsp. *britannicus* (Ronniger) Holub] PRAT. 1770 m. rr. VII.
- Thymus nervosus* Willk. [*Th. serpyllum* subsp. *nervosus* (Benth.) Nyman] Farigoleta de pastor/ Serpoll. -. Thym à nervures saillantes. PRAT/ROC. 1820-2740 m. cc. VI-VIII.
- Thymus praecox* Opiz subsp. *polytrichus* (Borbas) Jalas [*Th. serpyllum* subsp. *polytrichus* (Borbas) Briq.] PRAT(h,ac). 1780-2440 m. c. VI-X.

Thymus pulegioides L. [*Th. chamaedrys* Fr.; *Th. serpyllum* L. subsp. *chamaedrys* (Fr.) Vollm.; *Th. froelichianus* Opiz; *Th. serpyllum* L. subsp. *carniolicus* (Borbás) P. Schmidt.] Farigoleta de pastor/Serpoll. Tomillo de prado. Serpolet petit-chêne. Larger wild thyme. PRAT. 1200-2200 m. ccc. VI-IX.

Thymus serpyllum subsp. *carolii* Sennen & Ronniger PRAT(r). 1240-1330 m. rr. VII.

Thymus vulgaris L. subsp. *vulgaris* Farigola. Tomillo. Thym commun. Common thyme. PRAT(s)/ROC. 1240-1800 m.

Ziziphora granatensis (Boiss. & Reut.) Melnikov subsp. *alpina* (L.) Bräuchler & Gutermann [*Clinopodium alpinum* (L.) Kuntze; *Acinos alpinus* (L.) Moench] Calament alpi. Albahaca silvestre. Calament des Alpes. Alpine calamint. ROC(t,ca). 1500-2300 m. c. VI-VII.

Ziziphora granatensis (Boiss. & Reut.) Melnikov subsp. *granatensis* [*Clinopodium alpinum* (L.) Kuntze subsp. *meridionale* (Nyman) Govaerts; *Satureja acinos* subsp. *meridionalis* (Nyman) O. Bolòs & Vigo] Calament alpi. -. Calament des Alpes. -. PRAT(s,a). 1240-1700 m. c. VI-VII.

Lentibulariaceae

Pinguicula grandiflora Lam. Viola d'aigua. Grasilla mayor. Grassette à grandes fleurs. Large-flowered butterwort. AQUA(m,f,ca). 1220-2100 m. c. VI-VII..

Pinguicula vulgaris L. Pingüícula. Grasilla. Grassette commune. Butterwort. AQUA(m,f,ca). 1400-2380 m. r. VII-VIII.

Linaceae

Linum alpinum Jacq. subsp. *alpinum* [*L. perenne* subsp. *alpinum* (Jacq.) Stoj. & Stefanov] PRAT(s,t). 1980-2200 m. rr. VII.

Linum bienne Mill. [*L. usitatissimum* subsp. *bienne* (Mill.) Stank.; *L. usitatissimum* subsp. *angustifolium* (Huds.) Thell.] Lli. Lino. Lin à feuilles étroites. Pale flax. PRAT(s). 1220-1480 m. r. V-VII.

Linum catharticum L. Llinet purgant. Lino purgante. Lin cathartique. Fairy flax. PRAT(h,ac)/AQUA(j). 1220-1880 m. ccc. VI-VII.

Linum narbonense L. subsp. *narbonense* Lli de Narbona. Lino. Lin de narbonne. Heavenly blue flax. PRAT(ca). 1700 m. rrr. VI.

Linum trigynum L. PRAT(s,r). 1340 m. rrr. VII.

Lythraceae

Lythrum salicaria L. Salicària. Salicaria. Salicaire commune. Purple loosestrife. AQUA(j). 1200-1280 m. rr. VI-VIII.

Malvaceae

Alcea rosea L. [*Althaea rosea* (L.) Cav.] Malva reial. Malva real. Passe-rose. Hollyhock. RUD. 1240 m. rrr. VII. ESC.

Althaea officinalis L. Malví. Malvavisco. Mauve blanche. Marsh mallow. RUD. 1260 m. rrr. VII. AL/SUB.

Malva alcea L. [*M. alcea* subsp. *fastigiata* (Cav.) O. Bolòs & Vigo] Alcea. -. -. RUD(h). 1260 m. rrr. VII.

Malva moschata L. Malva moscada. -. Mauve musquée. Musk-mallow. PRAT. 1340 m. rrr. VII.

Malva neglecta Wallr. Malva de fulla petita. Malva enana. Petite mauve. Dwarf mallow. RUD(t). 1200-2100 m. cc. VI-X.

Malva setigera K.F. Schimp. & Spenn. [*Althaea hirsuta* L.] ROC(m). 1380 m. rrr. VI.

Malva sylvestris L. Malva. Malva. Grande mauve, Common mallow. 1200-1700 m. cc. V-VIII.

Tilia platyphyllos Scop. Tell/Tell de fulla gran. Tilo común. Tilleul à grandes feuilles. Large leaved lime. BOS(h,br). 1200-1650 m. cc. VI-VII..

Tilia ×europaea L. [*T. ×vulgaris* Hayne; *T. cordata* × *T. platyphyllos*] RUD. 1240 m. rrr. VI.

Montiaceae

Montia fontana L. subsp. *fontana* [*M. fontana* subsp. *variabilis* Walters] Mòntia. Verdolaga de agua. Montie des fontaines. Blinks. AQUA(f). 1350-2000 m. c. VI-VII..

Nictaginaceae

Mirabilis jalapa L. Flor de nit. Dondiego de noche. Belle-de-nuit. Four o'clock flower. RUD. 1240 m. rrr. IX. AL/SUB.

Oleaceae

Fraxinus excelsior L. subsp. *excelsior* Freixe (de fulla gran). Fresno. Frêne commun. Ash. BOSC(h,br). 1200-1780 m. ccc.

Ligustrum vulgare L. Olivereta. Aligustre. Troène commun. Common privet. BOSC(s)/MAT(b). 1340 m. rrr. VI.

Onagraceae

Circaea lutetiana L. Herba de les encantades. Hierba de la bruja. Circée commune. -. BOSC(h,br). 1200-1460 m. rr. VI-VII.

Oenothera biennis L. [*O. suaveolens* Desf.; *O. biennis* subsp. *suaveolens* (Pers.) Rouy & Camus] Enotera groga. Enotera. Onagre bisannuelle. Common evening-primrose. RUD(h)/ROC(t)(h). 1220-1780 m. c. VII.VIII.

Oenothera rosea Aiton Onagra rosada. Yerba del golpe. Onagre rosée. Pink evening primrose. RUD(h). 1240-1280 m. r. VI.

Epilobium alsinifolium Vill. . Epilobi alsinifoli. Epilobio alpino. Épilobe à feuilles d'alsine. Chickweed willowherb. AQUA(f). 1400-2600 m. c. VII-VIII.

Epilobium anagallidifolium Lam. AQUA(f,c)/ROC(t,h). 2100-2580 m. r. VII-IX.

Epilobium angustifolium L. subsp. *angustifolium* Cameneri. Epilobio de hojas estrechas. Laurier de saint antoine. Willow herb. HERB(c,v). 1200-2400 m. c. VII-VIII.

Epilobium collinum C.C. Gmel. Epilobi roquer. -. Épilobe des collines. Hill willowherb. 1200-2620 m. c. VI-VIII.

Epilobium hirsutum L. Epilobi hirsut. Hierba de San Antonio. Épilobe hirsute. Great willow herb. AQUA(j,cr,b). 1200-1520 m. c. VI-VIII.

Epilobium montanum L. Epilobi muntanyenc. -. Épilobe des montagnes. -. HERB(c,v)/BOSC(h). 1240 1780 m. cc.VI-VII.

Epilobium obscurum Schreb. AQUA(f). 1820 m. rrr. VIII.

Epilobium palustre L. AQUA(j,m,f) .1320-1900 m. c. VII-VIII.

Epilobium parviflorum Schreb. Epilobi de flor petita. -. Épilobe à petites fleurs. -. AQUA(j,cr,b). 1240-1600 m. c. VII-VIII.

Epilobium roseum Schreb. subsp. *roseum* -. -. Épilobe rose au sens large. -. BOSC(br). 1220 m. rrr. VII.

Orobanchaceae

Bartsia alpina L. Bàrstia alpina. Bartsia alpina. Bartsie des Alpes. Alpine bartsia. AQU(m,f). 1820-2400 m. c. VI-VII.

Euphrasia alpina Lam. subsp. *alpina* [*E. alpina* subsp. *pulchra* (Sennen) O. Bolos & Vigo]. Eufràsia. Eufràsia alpina. Euphrase des Alpes. Alpine eyebright. PRAT(si). 2400 m. rrr.

Euphrasia hirtella Reut. Eufràsia. Eufràsia. Euphrase hérissée. -. PRAT(h). 1450-1710 m. c. VII-VIII.

Euphrasia minima DC. [*E. minima* subsp. *masclansii* O. Bolos & Vigo; *E. minima* subsp. *sicardii* (Sennen) O. Bolos & Vigo] -. -. Petite Euphrase. Dwarf Eyebright. PRAT(si)/AQUA(c). 1980-2650 m. r. VII-IX.

- Euphrasia nemorosa* (Pers.) Wallr. [*E. officinalis* L. var. *nemorosa* Pers.] -. Euphrase des bois. Common Eyebright. PRAT(h). 1430-1720 m. r. VII-VIII.
- Euphrasia pectinata* Ten. (*E. stricta* var. *pectinata* (Ten.) O. Bolòs & Vigo] Eufràsia. Eufrasia. Euphrase pectinée. -. PRAT(h). 1260-1550 m. r. VI-VIII.
- Euphrasia salisburgensis* Hoppe -. Euphrase de Salzbourg. -. PRAT(ca). 1230-2340 m. c. VII-IX.
- Euphrasia stricta* J.F. Lehm . -. Euphrase dressé. Drug Eyebright. PRAT. 1240-1820 m. c. VII-IX
- Lathraea squamaria* L. Esquamària. Escumaria. Clandestine écailleuse. Great toothwort. BOSC(h). 1340 m rrr. VI.
- Melampyrum pratense* L. subsp. *pratense* [*M. pratense* subsp. *alpestre* Ronniger, nom. illeg] Xuclador. Trigo de vaca. Mélampyre des prés. Cow-wheat. BOSC(ac). 1200-2140 m. cc.VI-VIII.
- Melampyrum sylvaticum* L. subsp. *sylvaticum*. Citat, probablement es tracta d'un error.
- Odontites cebennensis* Coste & Soulié [*O. lanceolatus* subsp. *olotensis* (Cadevall) O. Bolòs & Vigo] -. Euphrase d'olot. -. PRAT(ca). 1200.1480 m. r. VIII-IX.
- Odontites vernus* subsp. *serotinus* Corb. -. -. -. PRAT(s). 1260 m. rrr. VIII.
- Odontites vernus* (Bellardi) Dumort. subsp. *vernus* -. Euphrase rouge. -. PRAT(h)/AQUA(j). 1230-1480 m. c. VI-VIII.
- Orobanche amethystea* Thuill. Frare. -. Orobanche couleur d'améthyste. -. PRAT (*Eryngium*). 1340 m-1380 m. r. VI-VII.
- Orobanche caryophyllacea* Sm. -. Orobanche à odeur d'oeillet. Bedstraw Broomrape. PRAT/ROC(m) (*Rubiaceae*). 1250-1420 m. r.
- Orobanche crenata* Forssk. Frare de les faveres. Jopo. Orobanche crénelé. Bean Broomrape. ARV. 1240 m. rrr.VI.
- Orobanche gracilis* Sm. [*O. crinita* auct.] Frare grácil. -. Orobanche grêle. -. PRAT (*Fabaceae*). 1230-1880 m. cc. VI-VII.
- Orobanche haenseleri* Reut. -. -. -. BOSC(s) (*Helleborus foetidus*). 1450-1820 m. rrr. VI-VII.
- Orobanche hederæ* Duby -. -. -. BOSC/ROC(m). 1220-1430 m. r. VII.
- Orobanche minor* Sm. Frare. Rabo de lobo. Orobanche du trèfle. Common Broomrape. PRAT (*Trifolium*). 1240-1520 m. cc. VI-VII.
- Orobanche rapum-genistæ* Thuill. Frare de ginesta. Espàrrago de lobo. Orobanche du genêt. -. MAT(g,bg)/PRAT (*Cytisus*). 1220-1720 m. c. VI-VII.
- Orobanche reticulata* Wallr. Frare de cardassa. Jopo. Orobanche réticulée. -. RUD/PRAT (*Cirsium eriophorum*). 1620-1780 m. rrr. VII. AME.
- Pedicularis comosa* L. subsp. *comosa* Pedicularis comosa. Gallarito amarillo. Pédiculaire chevelue. Crested lousewort PRAT(s)/HERB(m). 1550-2300 m. c. VI-VII.
- Pedicularis foliosa* L. subsp. *foliosa* Pedicularis foliosa. Gallarito folioso. Pédiculaire feuillée. Leafy lousewort . HERB(m). 1560-2000 m. rr. VI-VII.
- Pedicularis pyrenaica* J. Gay Pedicularis pirinenca. Felguera de puerto. Pédiculaire des pyrénées. Pyrenean lousewort. PRAT(ac). 1660-2800 m. cc. VI-VIII.
- Pedicularis sylvatica* L. subsp. *sylvatica* Pedicularis selvàtica. Gallarito. Pédiculaire des bois. Lousewort. PRAT(h)/AQUA(m). 1300-1880 m. r. VI-VII.
- Pedicularis tuberosa* L. Error.
- Phelipanche purpurea* (Jacq.) Soják subsp. *purpurea* [*Orobanche purpurea* Jacq.] Frare. Dedal azul de viuda. Orobanche pourpre. -. PRAT(t). 1240 m. rrr. VI.
- Rhinanthus minor* L. Esquellada petita. -. Petit Rhinanth. Little Yellowrattle. PRAT(h). 1200-1880 m. c. VII-VIII.
- Rhinanthus pumilus* (Sterneck) Pau subsp. *pumilus* [*Rh. mediterraneus* (Sterneck) Sennen] Esquellada. Cascabelera. Rhinanth nain. -. PRAT(h). 1200-1880 m. cc. VI-VIII.

Oxalidaceae

- Oxalis acetosella* L. subsp. *acetosella* Pa de cucut de bosc. Acederilla. Pain de coucou. Cuckoo bread, Woodsorrel. BOSC(h,br). 1230-2000 m. c. V.

- Oxalis debilis* Kunth [*O. debilis* subsp. *corymbosa* (DC.) O. Bolos & Vigo] -. -. Oxalide chétive. Pink shamrock. ARV/RUD. 1260-1320 m. rr. VI. AL/ESP.
- Oxalis latifolia* Kunth Pa de cucut de fulla ampla. Aleluya. Oxalide à larges feuilles. Garden Pink-sorrel. RUD(t). 1240 m. rrr. VI. AL/ESP.
- Oxalis vallicola* (Rose) R. Kunth -. -. -. RUD(t). 1240-1360 m. rr. VI. AL/SUB.
- Oxalis corniculata* L. Agrella. Acederilla. Oxalide corniculée. Creeping oxalis, Creeping wood-sorrel, Procumbent yellow-sorrel. RUD/ROC(m). 1200-1420 m. c. VI-VII. AL/ESP.

Papaveraceae

- Chelidonium majus* L. Lletdeteresa/Herba de les orenetes.Celidonia. Grande chélideine. Greater celandine. RUD(h). 1200-1450 m. c. V-VII.
- Corydalis solida* (L.) Clairv. subsp. *solida* -. -. -. BOSC(h)/HERB(c). 1500-1900 m. rrr. IV-V.
- Fumaria officinalis* L. subsp. *officinalis* -. -. -. ARV/RUD/ROC(m). 1240-1310 m. rr. VI.
- Papaver alpinum* L. [*P. aurantiacum* Loisel., *P. rhaeticum* Leresche; *P. lapeyrousianum* Greuter & Burdet; *P. alpinum* subsp. *suaveolens* P. Fourn.] O. Bolòs & Vigo). Paramà alpí. -. -. -. ROC(t). 1920-2700 m. c. VI-VIII. PRO.
- Papaver rhoeas* L. Rosella. Amapola. Coquelicot. Common poppy. ARV/RUD. 1200-2000 m. c. VI-VIII. AL/ESP.
- Papaver somniferum* L. subsp. *setigerum* (DC.) Arcang. Cascall. -. -. -. RUD. 1235 m. rrr. VI. AL/SUB.
- Roemeria argemone* (L.) C. Morales, R. Mend. & Romero García [*Papaver argemone* L.] Citada a prop.

Plantaginaceae

- Antirrhinum majus* L. subsp. *majus* Gossos. Conejitos. Grand muflier. Snapdragon. ROC(r,m). 1200-1680 m.c. VI-VIII.
- Asarina procumbens* Mill. [*Antirrhinum asarina* L.) Asarina. Asarine couchée. Creeping snapdragon. ROC(r,si). 1220-2460 m. IV-IX.
- Misopates orontium* (L.) Raf. [*Antirrhinum orontium* L.) RUD(t). 1230 m. rrr. VI.
- Cymbalaria muralis* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. *muralis* Picardia. Palomilla de muro.Cymbalaire des murs. Ivy-leaved toadflax. ROC(m). 1230-1260 m. r. V-VIII. AL/ESP.
- Digitalis lutea* L. subsp. *lutea* Didalera gropa. Digital amarilla. Digitale jaune. Yellow foxglove. HER(v,c, m,h). 1200-1960 m. cc. VI-VIII.
- Erinus alpinus* L. Erinus. -. Érine des alpes. -. 1420-2200. rr. VI-VII.
- Globularia cordifolia* L. Lluqueta. Hierba negra. Globulaire à feuilles cordées. Matted globularia. ROC(r,ca). 1200-2200 m cc. V-VII.
- Globularia repens* Lam. [*G. cordifolia* subsp. *repens* (Lam.) Wettst.] Lluqueta de roca. Hierba negra. Globulaire naine. Thyme-leaved glove-daisy. ROC(r,ca). 1230-2650 m. cc. V-VIII.
- Globularia bisnagarica* L. [*G. punctata* Lapeyr.; *G. vulgaris* subsp. *willkommii* (Nyman) Wettst.] Barbes de vell, Senet de pobre. Globularia mayor. Globulaire commune. Common globularia. PRAT(s). 1520 m. rrr. V.
- Plantago argentea* Chaix Plantatge argentí. -. Plantain argenté. -. PRAT(s,ca). 1740-1800 m. rr. VI-VII.
- Plantago lanceolata* L. Plantatge/Plantage llarg/Plantatge estret/Plantatge de fulla estreta. Llantén de hojas estrechas. Plantain lancéolé. Ribwort plantain. RUD/PRAT(t). 1200-2150 m. cc. V-X.
- Plantago major* L. subsp. *major* Plantatge/Plantatge rodó/Plantatge gros. Llantén mayor. Plantain à grandes feuilles. Englishman's foot. RUD(t)/PRAT(t). ccc.1200-1880 m. VII-X.
- Plantago media* L. Plantatge/Plantatge mitjà. Llantén medio. Plantain blanc. Hoary plantain. PRAT(h). 1200-2100 m. cc. VI-VIII.

- Plantago monosperma* Pourr. subsp. *monosperma* Plantatge monosperm. Llantén pirenaico. Plantain à une graine. Buckhorn plantain. PRAT/ROC(t). 1720-2750 m. cc. VI-VIII.
- Plantago maritima* L. subsp. *serpentina* (All.) Arcang. Pedrenca serpentina. -. Plantain serpentant. -. ROC(h)/PRAT(h). 1560 m. rrr. VI.
- Plantago sempervirens* Crantz [*P. cynops* L.] Plantatge de ca. Zaragatona mayor. Plantain toujours vert. Evergreen plantain. PRAT(s). 1460-1980 m. rr. V-VIII.
- Plantago subulata* L. [*P. holosteuum* Scop., *P. subulata* subsp. *holosteuum* (Scop.) O. Bolòs & Vigo; *P. subulata*] Pedrenca de prat. -. Plantain à feuilles en alène. PRAT(a)/ROC(r). 1300-1780 m. r. VI-VII.
- Plantago ×mixta* Domin. [*P. major* × *P. media*] PRAT. 1320 m. rrr. VI.
- Linaria alpina* L. subsp. *alpina* Linària alpina. Linaria alpina. Linaire des Alpes. Alpine toadflax. ROC(t). 1880-2680 m. c. VI-VIII.
- Linaria repens* (L.) Mill. Linària estriada. Linaria blanca. Linaire rampante. Pale toadflax. ROC(t). 1550-2120 m. c. VI-VIII.
- Linaria supina* (L.) Chaz. subsp. *supina* Linària supina. Mosquitas doradas. Linaire couchée. Prostrate toadflax.
var. *supina* ROC(t)/ARV. 1340-1820 m. r. VI-VIII.
var. *pyrenaica* (DC.) Duby ROC(t)/ARV. 1820-2540 m. r. VI-VIII.
- Chaenorhinum minus* (L.) Lange subsp. *minus* -. -. -. ROC(t)/ARV. 1220-2080 m. c. VI-VIII.
- Veronica alpina* L. -. -. -. AQUA(c). 2000-2600 m. r. VII-VIII.
- Veronica anagallis-aquatica* L. subsp. *anagallis-aquatica* Herba de folls. Berula. Véronique mouron d'eau. Blue water speedwell. AQUA(cr). 1200-1520 m. rr. V-VIII.
- Veronica aphylla* L. Verònicaofil·la. -. Véronique à tige nue. Leafless-stemmed Speedwell. 1800-2340 m. PRAT/AQUA(c) (ca). rr. VII-VIII.
- Veronica arvensis* L. Verònica arvensis. -. -. -. ARV/PRAT(a). 1240-2080 m. cc. V-VIII.
- Veronica beccabunga* L. subsp. *beccabunga* Creixen de cavall. Verònica de agua. Véronique des ruisseaux. Brooklime. AQUA(cr). 1200-2280 m. cc. V-IX.
- Veronica bellidioides* L. Verònica bel·lidioide. -. Véronique fausse pâquerette. -. PRAT(s). 1940-2740 m. c. VI-VIII.
- Veronica chamaedrys* L. subsp. *chamaedrys* Verònica camedris. Verònica de bosque. Véronique petit-chêne. Germander speedwell. BOSC(h)/HERB(h,v,m). 1220-2080 m. cc. VI-VIII.
- Veronica fruticans* subsp. *cantabrica* M. Lainz ROC(t)/PRAT(r). 1500-2720 m. c. VII-IX.
- Veronica fruticans* Jacq. subsp. *fruticans* [*Veronica fruticulosa* L. subsp. *saxatilis* (Scop.) Arcang.] Verònica fruticulosa. Verònica de la rocas. Véronique des rochers. Rock speedwell. PRAT(s). 1550-2760 m. rr. VII-VIII.
- Veronica hederifolia* L. Herba de sínia. Veronica. Véronique à feuilles de lierre. Ivy-leaf Speedwell. ARV/RUD/ROC(m). 1200-1620 m. c. V-VII.
- Veronica montana* L. Verònica de muntanya. -. Véronique des montagnes. -. 1200-1600 m. rr. V-VI.
- Veronica nummularia* Gouan Verònica nummulària. -. Véronique nummulaire. Pyrenean Speedwell. ROC(t, ca). 2200-2700 m. r. VII-VIII.
- Veronica officinalis* L. Herba de Santa Caterina/Verònica ofical. Verònica macho. Véronique officinale. Common speedwell. BOSC/MAT/PRAT(ac). 1220-2120 mm. cc. VI-VIII.
- Veronica orsiniana* Ten. [*V. austriaca* subsp. *teucrium* sensu O. Bolòs & Vigo] Verònica austríaca. -. Véronique germandrée. -. PRAT(s). 1220-1920 m. cc. VI-VIII.
- Veronica persica* Poir. Blauet/Verònica pèrsica. Borroncillo. Véronique commune. Common field speedwell. ARV/RUD. 1220-1380 m. r. IV-VI. AL/ESP.
- Veronica polita* Fr. Verònica polida. Veronica polita. Véronique brillante. Grey Field-speedwell. ARV/RUD(t). 1220-1460 m. r. V-VII.
- Veronica praecox* All. Citada erròniament.
- Veronica ponae* Gouan Verònica de Pona. Verònica pirenaica. Véronique de gouan. Spiked Pyrenean speedwell. AQUA(f). 1680-2180 m. c. VI-VIII.

- Veronica serpyllifolia* L. subsp. *serpyllifolia* [*V. serpyllifolia* subsp. *humifusa* (Dicks.) Syme] Herba de l'ull/Herba del mal d'ull/Verónica serpil·lifòlia. Verónica de prado. Véronique à feuilles de serpolet. Thymeleaf speedwell. RUD(t). 1320-2080 m. c. VI-VII.
- Veronica spicata* L. subsp. *spicata* Verónica d'espiga. -. Véronique en épi. Spiked speedwell. PRAT(s). 1900-2380 m. rrr. VII-VIII. AME.
- Veronica triphyllos* L. Verónica trifil·la. -. Véronique digitée. -. Fingered speedwell. ARV. 1260 m. rrr. V.
- Veronica urticifolia* Jacq. Verónica latifòlia. -. Véronique à feuilles d'ortie. Nettle-leaved speedwell. BOSC(h)/ROC(h). 1220-1800 m. cc. VI-VIII.
- Veronica verna* L. -. Veronica verna. Véronique de printemps. Spring Speedwell. PRAT(r). 2020 m. rrr. VI.

Plumbaginaceae

- Armeria alpina* Willd. [*A. maritima* subsp. *alpina* (Willd.) P. Silva] Gasó alpí. Mermasangre. Arméria des Alpes. Alpine thrift. PRAT(ac). 2040-2700 m. c. VI-VIII.
- Armeria arenaria* (Pers.) Schult. subsp. *arenaria* [*A. alliacea* subsp. *bupleuroides* (Godr. & Gren.) O. Bolòs & Vigo; *A. alliacea* subsp. *plantaginea* (All.) O. Bolòs & Vigo] Gasó (al·liaci). Armeria arenaria. Arméria faux buplèvre. Plantain-leaved thrift. PRAT. 1280-2100 m. cc. VI-VIII.
- Armeria marginata* (Levier) Bianchini [*A. majellensis* var. *marginata* Levier]. Error.
- Armeria muelleri* Huet [*A. maritima* subsp. *muelleri* (A. Huet) O. Bolòs & Vigo] Gasó alpí. -. Arméria de Müller. -. PRAT(si). 2220-2700 m. c. VII-VIII.

Polygalaceae

- Polygala alpina* (DC.) Steud. PRAT(ca). 2000-2800 m. rr. VII.
- Polygala alpestris* Rchb. subsp. *alpestris* [*P. vulgaris* subsp. *alpestris* (Rchb.) Rouy & Foucaud] PRAT(h,ac). 1450-2170 m. c. VI-VIII.
- Polygala calcarea* F.W. Schultz Herba blava. Lechera amarga. Polygala du calcaire. Chalk milkwort. PRAT(ca). 1500-2120 m. c. V-XI.
- Polygala vulgaris* L. Polígala vulgar. -. Polygale commun. PRAT(ac). 1240-2100 m. cc. VI-VIII.

Poligonaceae

- Koenigia alpina* (All.) T.M.Schust. & Reveal [*Polygonum alpinum* L.] Presseguera alpina. Polígono alpino. Renouée des Alpes. Alpine knotweed. HERB(c,si). 1520-2460 m. c. VI-VIII.
- Oxyria digyna* (L.) Hill Oxíria. -. Oxyria à deux styles. -. ROC(t). 2020-2700 m. r. VII-VIII.
- Persicaria amphibia* (L.) Delarbre [*Polygonum amphibium* L.] -. -. -. AQUA(cr). 1260 m. rrr. VII.
- Persicaria bistorta* (L.) Samp. subsp. *bistorta* [*Polygonum bistorta* L. subsp. *bistorta*] Bistorta. Bistorta. Bistorte. Bistort. PRAT(h)/AQUA/HERB(m). 1300-2180 m. cc. VI-VIII.
- Persicaria hydropiper* (L.) Pebre d'aigua. Persicaria picante. Poivre d'eau. Water pepper. AQUA(j,cr). 1240-1480 m. Rr. VII-VIII.
- Persicaria lapathifolia* (L.) Delarbre [*Polygonum lapathifolium* L.] Presseguera borda. Renouée à feuilles d'oseille. Curlytop knotweed. AQUA. 1220-1280 m. rr. VII.
- Persicaria maculosa* Gray [*Polygonum persicaria* L.] Herba presseguera. Persicaria. Persicaire. Willow weed. RUD/ARV. 1220-1780 m. r. VI-VIII.
- Persicaria mitis* (Schrank) Holub [*Polygonum mite* Schrank] . -. -. -. AQUA(J,cr). 1360 m. rrr. VII.
- Persicaria orientalis* (L.) Spach [*Polygonum orientale* L.] . -. -. -. ARV. 1320 m. rrr. AL/SUB.
- Persicaria vivipara* (L.) Ronse Decr. [*Polygonum viviparum* L.] Bistorta vivípara. Bistorta vivípara. Renouée vivipare. Viviparous bistort. PRAT/HERB/MAT. 1700-2720 m. c. VI-VII.
- Polygonum aviculare* L. Passacamins. Centinodia. Renouée des oiseaux. Common knotgrass.. RUD(t). cc. VI-VIII.
- Fallopia baldschuanica* (Regel) Holub [*F. aubertii* (L. Henry) Holub; *Polygonum aubertii* L.] Vinya del Tibet. -. Renouée de chine. -. MAT(b). 1220-1240 m. rrr. VI. AL/INV.

- Fallopia convolvulus** (L.) A. Löve [*Polygonum convolvulus* L.] Fajol bord. -. -. -. ARV/RUD. 1220-1500 m. c. VI-VII.
- Fallopia dumetorum** (L.) Holub -. -. -. MAT(b). 1230-1490 m. rr. VI-VII.
- Fallopia japonica** (Houtt.) Ronse Decr. [*Reynoutria japonica* Houtt.] -. *Hierba nudosa japonesa*. *Renouée à feuilles pointues*. *Japanese knotweed*. AQUA(h). 1240 m. rrr. AL/INV ER.
- Rumex acetosa** L. subsp. **acetosa** Xiscoll/Agrella. Acedera. Grande oseille. Common sorrel. PRAT(h). 1240-2080 m. cc. V-VII.
- Rumex acetosella** L. subsp. **angiocarpus** (Murb.) Murb. Agrelleta. Acederilla. Petite oseille des Pyrénées. Sheep's sorrel. PRAT(a). 1240-2480 m. c. V-VII.
- Rumex arifolius** All. [*R. acetosa* subsp. *amplexicaulis* (Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo] Agrella. Ruibarbo bastardo. Rumex à feuilles amplexicaules. Mountain dock. HERB(m). 1780-2200 m. r. VI-VIII.
- Rumex conglomeratus** Paradella conglomerada. Romaza. Oseille agglomérée. Clustered dock. AQUA(j,cr)/RUD(h,h). 1240-1540 m. r. VI-VIII.
- Rumex crispus** L. Paradella cresp. Romaza rizada. Oseille crépue. Curled dock. RUD(h,p). 1200-2080 m. cc.
- Rumex longifolius** DC. -. -. -. RUD(h). 1780 m. rrr. VII.
- Rumex obtusifolius** L. Llengua de bou. Romaza de hoja grande. Patience sauvage. Broad leaved dock. RUD(h). 1220-2000 m. cc. VII-VIII.
- Rumex pulcher** L. subsp. **pulcher** Paradella mollerosa. Romaza menor. Oseille gracieuse. Fiddle dock. RUD(t). 1220-1350 m. rr. VII-VIII.
- Rumex scutatus** L. Badola/Agrella. Acedera romana. Oseille ronde. Shield dock. ROC(t). 1220-2050 m. cc. VI-VIII.
- Rumex xpratensis** Mert. et Koch [*R. obtusifolius* x *crispus*] RUD. 1240 m. rr. VII.

Portulacaceae

- Portulaca oleracea** L. Verdolaga. Verdolaga común. Pourpier. Green purslane. RUD/ARV 1230-1250 m. rr. VI.

Primulaceae

- Androsace argentea** (C.F.Gaertn.) Lapeyr. [*A. vandellii* auct., non Chiov.] Andròsace imbricada. -. -. -. ROC(r,si). 1700-2200 m. c. VI-VII.
- Androsace halleri** L. subsp. **nuria** Schönsw. & Schneew. [*A. halleri* auct., non L.] Andròsace càrnia. -. -. -. PRAT. 1980-2750 m. r. VI-VII.
- Androsace villosa** L. subsp. **villosa** Androsace pelosa. -. -. Rock jasmin. PRAT(r). 1600-2640 m. cc. V-VII.
- Androsace vitaliana** (L.) Lapeyr. subsp. **vitaliana** [*Vitaliana primuliflora* Bertol. subsp. *canescens* O. Schwarz] . -. -. ROC(t)/PRAT(r). 2080-2780 m. c. VII-VIII.
- Lysimachia arvensis** (L.) U. Manns & Anderb. [*Anagallis arvensis* L. subsp. *arvensis*] Morró (blau, vermell). Morrón. Mouron des champs. Common pimpernel. RUD. 1200-1540 m. c. V-X.
- Lysimachia foemina** (Mill.) U. Manns & Anderb. [*Anagallis foemina* Mill.; *A. arvensis* subsp. *foemina* (Mill.) Schinz & Thell.] -. -. -. RUD(t). 1240 m. rrr. VI.
- Primula hirsuta* All. (Sub *P. viscosa* Vill.). Error.
- Primula integrifolia** L. Prímula integrifòlia. Prímula alpina. Primevère à feuilles entières. Entire-leaved primrose. PRAT(si). 1740-2640 m. cc. V-VII.
- Primula intricata** Gren. & Godr. [*P. elatior* (L.) L. subsp. *intricata* (Gren. & Godr.) Widmer] Prímula gran. Primavera. Primevère intriquée. Oxlip. PRAT. 1220-2200 m. c. V-VI.
- Primula latifolia** Lapeyr. subsp. **latifolia** Prímula latifòlia. Primavera de hojas grandes. Primevère à larges feuilles. Viscid primrose. ROC(si). 1500-2700 m. cc. VI-VII.
- Primula veris** L. [*P. veris* L. subsp. *columnae* (Ten.) Maire et Petitm.] Prímula vera. Prímula común. Primevère de colonna. Cowslip. BOSC(s)/HERB(v,s). cc. V-VI.

Soldanella alpina L. subsp. *alpina* Soldanel·la alpina. Soldanela alpina. Soldanelle des alpes. -. AQU(c,m)/PRAT(h). 1520-2500 m. c. V-VII.

Rhamnaceae

Atadinus alpinus (L.) Raf. (*Rhamnus alpina* L.) Púdol. -. Nerprun des Alpes. -. ROC(r,t,ca).1400-2200 m. c. V-VI.

Atadinus pumilus (Turra) Hauenschild [*Rhamnus pumila* Turra] Púdol menut. -. Nerprun nain. -. 1600-2500 m. rr. V-VII.

Frangula alnus Mill. subsp. *alnus* Fràngula. Arraclán. Bourdaine. -. BOSC(h,br)/MAT(b). 1220-1400 m. rr. V-VI.

Ranunculaceae

Aconitum anthora L. Tora groga. Acónito amarillo. Aconit anthore. Yellow monkshood. HERB(m)/PRAT(h)(ca). 1620-1840 m. rr. VIII-IX.

Aconitum lycoctomum L. [*A. vulparia* subsp. *ranunculifolium* (Rchb.) M. Laínz; *A. pyrenaicum* subsp. *lamarckii* (Rchb.) O. Bolòs & Vigo] Tora pirinenca. Hierba lobuna. -. -. HERB(m,c). 1200-2500 m. c. VII-IX.

Aconitum napellus L. subsp. *vulgare* Rouy & Foucaud. Tora/Tora blava. Acónito azul. Aconit commun. -. HERB(m). 1380-2600 m. ccc. VII-IX.

Actaea spicata L. Herba de sant cristòfol. Yerba de San Cristóbal. -. -. BOSC(h). 1440-1720 m. rr. VI-VII.

Adonis aestivalis L. subsp. *aestivalis* Ull de perdiu. -. Adonis d'été. Pheasant's-eye. ARV. 1300 m. rrr. VI.

Adonis pyrenaica DC. Adonis pirinenc. -. Adonis des Pyrénées. -. ROC(r,t). 1800-2500 m. rr. VI-VII.

Anemone nemorosa L. Búixol. Anémone de los bosques. Anémone des bois. Wood anemone. BOSC(h,br). 1250-1580 m. r. IV-VI.

Anemone ranunculoides L. Buixol groc. Anémone fausse renoncule. -. BOSC(h,br). 1250-1400 m. rrr. IV-V.

Aquilegia alpina L. Error.

Aquilegia vulgaris L. Campana/Corniol. Aguileña. Ancolie commune. Columbine. BOSC(h)/HERB(v,m). 1200-2140 m. cc. V-VII.

Caltha palustris L. Calta. Calta. Caltha des marais. -. AQUA(f,m). 1220-2200 m. cc.V-VI.

Clematis vitalba L. Ridorta/Vidalba. Hierba de los pordioseros. Clématite des haies. Evergreen clematis. 1200-1500. c. VI-VII.

Clematis recta L. Herba bormera. Flámula de júpiter. Clématite dressée. -. HERB(v,h)/BOSC(br). 1225 m. rrr. VI-VII.

Delphinium montanum DC. [*D. elatum* subsp. *montanum* (DC.) Nyman; *D. elatum* auct.] Esperó de muntanya. -. Dauphinelle des montagnes. -. ROC(t)/HERB(m). 1640-2650 m. rr. PRO.

Delphinium verdunense Balb. (*D. peregrinum* subsp. *verdunense* (Balb.) Cout.) ARV/ROC(t). 1220-1280 m. rrr. VII.

Ficaria verna Huds. subsp. *verna* [*Ranunculus ficaria* L.] Gatassa. Celidonia menor. Ficaire. Lesser celandine. BOSC(h,br). 1220-1600 m. rr. IV-V.

Helleborus foetidus L. Marxívol. Heléboro común. Ellébore fétide. Bear's foot. BOSC(s). 1200-1880 m. cc. IV.

Helleborus viridis L. subsp. *occidentalis* (Reut.) Schiffn. El·lèbor verd. Eléboro verde. -. Green hellebore. BOSC(h,br). 1240- 2020 m. cc.III-IV.

Hepatica nobilis Schreb. [*Anemone hepatica* L.] Herba fetgera/Viola de llop. Hepática. Anémone hépatique. Kidneywort. BOSC. 1200-2000 m. cc. IV-VI.

- Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre subsp. *apiifolia* (Scop.) Nyman [*Anemone alpina* L. subsp. *apiifolia* (Scop.) O. Bolòs & Vigo] Herba del Vent. Pulsatila. -. -. PRAT/BOSC(si). 1620-2650 m. cc. VI-VII.
- Pulsatilla alpina* subsp. *font-queri* M. Laínz & P. Monts. [*Anemone alpina* subsp. *font-queri* (M. Laínz & P. Monts.) O. Bolòs & Vigo] PRAT/BOSC(ca). 1400-2150 m. c. V-VII.
- Pulsatilla vernalis* (L.) Mill. [*Anemone vernalis* L.] Anèmone vernal. -. -. -. PRAT(si). 1800-2720 m. c. V-VI.
- Ranunculus aconitifolius* L. [*R. aconitifolius* L. subsp. *aconitifolius*] Ranuncle aconitifoli. Ranúnculo con hojas de acónito. Renoncule à feuilles d'aconit. Aconite-leaved Buttercup. AQUA(h). 1680-2380 m. rrr. VII.
- Ranunculus acris* subsp. *despectus* M. Laínz Gata rabiosa/Botó d'or. Botón de oro de bosque. -. -. 1200-2080 m. cc. V-VII.
- Ranunculus amplexicaulis* L. Citat a prop.
- Ranunculus angustifolius* DC. [*R. pyrenaicus* subsp. *angustifolius* (DC.) Rouy & Foucaud]-. -. -. AQUA(m). 2000 m. rrr. VII.
- Ranunculus arvensis* L. Ranuncle arvense. -. Renoncule des champs. -. ARV. 1260-1280 m. r. VI-VII.
- Ranunculus bulbosus* L. subsp. *bulbosus* [*R. bulbosus* subsp. *bulbifer* (Jord.) J.B. Neves] Gata rabiosa/Ranuncle bulbós. Botón de oro peloso. Renoncule bulbeuse. Bulbous buttercup. 1200-2180 m. ccc. V-VIII.
- Ranunculus envalirensis* Grau [*R. auricomus* auct., p.p.] Ranuncle daurat. -. Renoncule à têtes d'or. -. PRAT/BOSC(h). 1600-2450 m. cc. V-VII.
- Ranunculus flammula* L. Mataanyells. -. Renoncule flammette. -. AQUA(f)/BOSC(br). 1320-1380 m. rrr. VIII.
- Ranunculus gramineus* L. Ranuncle de codina. -. Ranuncule à feuilles de graminée. -. 1720 m. rrr. VI.
- Ranunculus hederaceus* L. -. -. -. -. AQUA(f). 1480-1500 m. rrr. VI-IX.
- Ranunculus parnassifolius* L. subsp. *parnassifolius* Herba del mal gra. -. Renoncule à feuilles de parnassie. -. 1920-2780 m. c. VI-VII.
- Ranunculus pyrenaicus* L. Ranuncle pirinenc. -. Renoncule des pyrénées. -. PRAT(h,si). 2000-2640 m. cc. V-VII.
- Ranunculus platanifolius* L. [*R. aconitifolius* subsp. *platanifolius* (L.) Rikli] Ranuncle platanifoli. Ranúnculo hoja de plátanero. Renoncule à feuilles de platane. -. HERB(m). 1430-1890 m. r. VI-VII.
- Ranunculus repens* L. - Botó d'or (repent). Botón de oro reptante. Renoncule rampante. Renoncule bulbeuse. Bulbous buttercup. PRAT(t)/RUD(t). 1200- 2080 m. ccc. V-VII.
- Ranunculus ruscinoensis* Landolt [*R. montanus* subsp. *ruscinoensis* (Landolt) O. Bolòs & Font Quer]PRAT(h,ac). 1350-2200 m. cc VI-VII.
- Ranunculus tuberosus* Lapeyr. [*R. serpens* Schrank subsp. *nemorosus* (DC.) G. López] -. Botón de oro tuberoso. -. Renoncule des bois. -. BOSC(h). 1200-2100 m. cc. VI-VIII.
- Thalictrum alpinum* L. Talictr alpí. -. Pigamon des Alpes. -. AQUA(c,m). 1800-2600 m. r. VI-VII.
- Thalictrum aquilegifolium* L. Talictr aquilegifoli. Talictr de bosque. Colombine panachée. -. HERB(m)/PRAT(h). 1280-2040 m. r. VI-VII.
- Thalictrum minus* L. subsp. *saxatile* Ces. [*T. minus* L.] Gata rabiosa. Talictr de pedregal. -. -. HERB(v)/PRATS. 1200-2040 m. cc. VI-VIII.
- Thalictrum simplex* L. subsp. *simplex* [*T. flavum* subsp. *simplex* (L.) O. Bolòs & Vigo; *T. flavum* subsp. *costae* (Debeaux) Rouy & Foucaud; *T. flavum* subsp. *flavum* sensu O. Bolòs & Vigo] Ruibarbre de pobre. Ruibarbo de los pobres. Pigamon des rives. Common meadow rue. AQUA(j)/PRAT(h). 1470 m. rrr. VII.
- Thalictrum tuberosum* L. Error.
- Trollius europaeus* L. Cloclou o flor de Sant Pere/Rovell d'ou. Calderones. Trolle. -. PRAT(h)/HERB(m)/AQUA(f). 1220-2230 m. c. VI-VII.

Resedaceae

- Reseda glauca* L. -. -. -. ROC(t,ca). 1900-2200 m. c. VI-VII.
Reseda lutea L. subsp. *lutea* Gandaia. Gualdón. Réséda jaune. Wild mignonette. RUD(h). 1240-1480 m. r. VI-VIII.
Reseda luteola L. subsp. *luteola* Galda. Gualda. Réséda des teinturiers. Weld. RUD/ROC(t). 1230-1550 m. r. VI-VIII.
Reseda phyteuma L. subsp. *phyteuma* Pebrots de ruc. Gualdilla. Réséda raiponce. Corn mignonette. ARV. 1240-1260 m. rrr. V-VI.
Sesamoides interrupta (Boreau) G. López [*Sesamoides pygmaea* (Scheele) O. Kuntze] Astrocarp. -. -. -. ROC(t),PRAT(r). 2000-2660 m. r.

Rosaceae

- Agrimonia eupatoria* L. subsp. *eupatoria* Herba cuquera, herba del mal estrany/Agrimònia. -. Aigremoine eupatoire. Agrimony. HERB(v,c)/PRAT. 1200-1600 m. cc. VI-IX.
Agrimonia procera Wallr. -. -. -. HERB(v,h). 1240-1480 m. rr. VI-VII.
Alchemilla alpigena Hegi [*A. alpina* subsp. *asterophylla* sensu O. Bolòs & Vigo; *A. fontqueri* Rothm.; *A. plicatula* auct., p.p.] PRAT(ca). 1480-2400 m. r. VII.
Alchemilla alpina L. Peucrist o peu de rei/Alchemil·la alpina. Pie de león alpino. Alchémille des Alpes -. MAT(n),PRAT(si). 1800-2600 m. c. VI-VII.
Alchemilla borderei S.E. Fröhner [*A. pyrenaica* L.]. Error.
Alchemilla colorata Buser [*A. hybrida* subsp. *colorata* (Buser) Gams] PRAT(h,ac). 1520-2320 m. r. VII-VIII.
Alchemilla connivens Buser [*A. vulgaris* subsp. *connivens* (Buser) E.G. Camus] PRAT. 1480-2230 m. r. VI-VIII.
Alchemilla coriacea Buser [*A. vulgaris* subsp. *coriacea* (Buser) E.G. Camus] Pota de lleó. Pie de león coriáceo. -. -. AQUA(f). 1500-2100. c. VI-VII.
Alchemilla fissa Günther & Schummel [*A. fissa* subsp. *pyrenaica* (Dufour) O. Bolòs & Vigo; *A. pyrenaica* Rothm.]-. -. -. -. AQUA(c). 2150-2500 m. rr. VIII-IX.
Alchemilla flabellata Buser [*A. hybrida* subsp. *flabellata* (Buser) Gams] Pota de lleó. -. Alchémille en éventail. -. 1200-2500 m. cc. VI-VIII.
Alchemilla saxatilis Buser [*A. alpina* subsp. *saxatilis* (Buser) E.G. Camus; *A. alpina* auct.] Herba de plata. -. Alchémille des rochers. -. 1200-2700 m. cc. VI-VIII.
Alchemilla xanthochlora Rothm. [*A. vulgaris* subsp. *xanthochlora* (Rothm.) O. Bolòs & Vigo, *A. vulgaris* auct.] PRAT(h). 1250-2000 m. c. V-VIII.
Amelanchier ovalis Medik. ROC(r,ca). 1520 m. rrr. IV-VI.
Aphanes arvensis L. -. -. Alchémille des champs.-. PRAT(a)/ARV. 1020-1040 m. rr. V.
Aria edulis (Willd.) M. Roem. [*Sorbus aria* (L.) Crantz] Moixera. Mostajo. Alisier blanc. -. Boscos humits. 1200-2050 m. V-VI. cc.
Aruncus dioicus (Walter) Fernald-. -. -. -. HERB(v). 1500 m. rrr. AME.
Cotoneaster integerrimus Medik. Cornera. Cotonéaster commun. -. MAT(b,g)/PRAT. 1450-2080 m. c. VI.
Crataegus monogyna Jacq. Arç blanc. Majuelo. Aubépine à un style. Hawthorn. MAT(b)/BOSC. 200-1760 m. ccc. V-VI.
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. [*Potentilla fruticosa* L.] Potentil·la fruticosa. -. Potentille arbustive. -. 1780-2180 m. AQUA(f,m). r. VI-VIII.
Dryas octopetala L. subsp. *octopetala* Drias. -. Dryade à huit pétales. -. MAT(c,ca). 2000-2750 m. c. VI-VII.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Reina dels prats. Reina de los prados. Reine-des-prés. Meadow sweet. HERB(h,m). 1200-1680 m. cc. VII-VIII.
Filipendula vulgaris Moench Filipéndula. Filipéndula. Filipendule commune. -. PRAT(h). 1640 m. rrr. VII.

- Fragaria vesca* L. Maduixera. Fresa silvestre. Fraisier des bois. Wild strawberry. HERB(v,c). 1200-1840 m. cc. 1200-2000 m. ccc. V-VII.
- Geum montanum* L. Gèum muntanyenc. -. Benoîte des montagnes. -. PRAT(ac). 2000-2600 m. r. VII-VIII.
- Geum pyrenaicum* Mill. Error.
- Geum rivale* L. . Gèum de ribera. -. Benoîte des ruisseaux. -. 1780-1980 m. rr. VII-VIII.
- Geum urbanum* L. Herba de Sant Benet. Cariofilada común. Benoîte commune. Herb bennet. RUD(h,h)/BOSC(h,br). 1200-2000 m. ccc. V-VIII.
- Malus sylvestris* (L.) Mill. [*Pyrus malus* L.] Pomer. Manzano. Pommier des bois. Crab apple. MAT(b). 1200-1460 m. r. V-VI.
- Potentilla argentea* L. Agram de porc, Argentina, Maduixera borda, Potentil·la argentina. Cincoenrama recortada. Potentille argentée. -. PRAT(r). 12860-1850 m. r. V-VIII.
- Potentilla aurea* L. subsp. aurea. Error.
- Potentilla brauniana* Hoppe [*P. brauneana* Hoppe] - AQUA(c,ca). 2400 m. rrr.
- Potentilla crantzii* (Crantz) Fritsch Potentil·la estipular. Cincoenrama alpina. -. -. PRAT(s). 1600-2700 m. cc. VI-VIII.
- Potentilla erecta* (L.) Raeusch. Tormentil·la. Siete en rama. Potentille tormentille. Common tormentil. PRAT/MAT(ac). 1200-2000 m. ccc. V-VIII.
- Potentilla micrantha* DC. Fragassa de flor petita. -. Potentille à petites fleurs. -. MAT(g)/HERB(v). 1260-1880 m. c. V-VII.
- Potentilla nivalis* Lapeyr. subsp. *nivalis* Potentil·la nival. Cincoenrama nival. Potentille des neiges. -. ROC(r,t). 2220-2680 m. c. VII-IX.
- Potentilla pyrenaica* DC. -. -. -. PRAT(ac). 1700-2220 m. c. VII-VIII.
- Potentilla recta* L. Potentil·la recta. Cincoenrama erguida. Potentille dressée. Roughfruit cinquefoil. PRAT(s,r). 1240-1440 m. rr. VI-VII.
- Potentilla reptans* L. Gram negre. Cinco en rama. Potentille rampante. Creeping cinquefoil. RUD. 1200-2000 m. cc. VI-VIII.
- Potentilla sterilis* (L.) Garcke Fragassa de bosc. Cincoenrama fresal. Potentille stérile. -. BOSC(h). 1300-1400 m. r. IV-V.
- Potentilla verna* L. [*P. neumanniana* Rchb.] Flors de la fam. Cincoenrama verna. Potentille de Neumann. -. PRAT(s). 1200-2000 m. cc.
- Poterium sanguisorba* L. subsp. *sanguisorba* [*Sanguisorba minor* Scop. subsp. *minor*] Pimpinella. Pimpinela menor. Petite pimprenelle. -. PRAT. 1200-2000 m. ccc. VI-VIII.
- Prunus avium* (L.) L. Cirer/Cirerer. Cerezo. -. Wild cherry BOSC(h). 1200-1500 m. cc. IV-V.
- Prunus domestica* L. Pruner/Pruner. Ciruelo. Prunier. Common plum. MAT(b). 1240-1450 m. r. IV-V.
- Prunus spinosa* L. Aranyoner. Espino negro. Épine noire. Blackthorn. MAT(b). 1200-1500 m. cc. IV-V.
- Rosa agrestis* Savi -.-.-. MAT(b). 900-1600 m. c. VI-VII.
- Rosa andegavensis* Bastard [*R. canina* subsp. *andegavensis* (Bastard) Nyman] - MAT(b), 1290 m. rrr.
- Rosa canina* L. [*R. canina* L. subsp. *canina*] Roser de pastor/Roser caní. Rosal silvestre. Églantier des chiens. Dog rose MAT(b). 1200-188 m. c. VI-VIII.
- Rosa pendulina* L. [*R. alpina* L.] Roser alpi. Rosal alpino. Églantier des alpes. -. MAT(n)/BOSC(p)/HERB(m). 1500-2200 m. cc. VI-VII.
- Rosa rubiginosa* L. -.-.-. MAT(b). 1340-2000 m. cc. VI-VIII
- Rosa spinosissima* L. [*R. pimpinellifolia* L.] -. -. -. MAT(b). 1600-2100 m. rr. VII.
- Rosa stylosa* Desv. [*R. canina* subsp. *stylosa* (Desv.) Masclans] -. -. -. MAT(b). 1240-1520 m. r. VI-VII.
- Rosa villosa* L. [*R. villosa* subsp. *mollis* (Sm.) Hook. fil.; *R. mollis* Sm.] -.-.-. MAT(b). 1450 m. rrr. VII.
- Rosa vosagiaca* N.H.F. Desp. [*R. coriifolia* Fries subsp. *vosagiaca* (dsp) Keller; *Rosa dumalis* Bechst. subsp. *vosagiaca* (Desp.) P. Fourn.] -.-.-. MAT(b). 1380-1760 m. r. VII-VIII.

- Rubus caesius* L. - Romegueró. Zarzamora reptante. Ronce bleu. Dewberry. BOSC(br). 1200-1970 m. cc. V-VII.
- “*Rubus godronii* Lecoq. & Lamotte subsp. *amplistipulus* Sudre” -. -. -. MAT(b)/BOSC(h). 1220-1600 m. c. VI-VII.
- Rubus hirtus* Waldst. & Kit. [R. ser. *Glandulosi* sensu Bolòs & Vigo] Esbarzer glandulós. -. -. -. MAT(b)/BOSC(h). 1280-1480 m. rrr. VII-VIII.
- Rubus idaeus* L. - Jordonera/Gerdera. Frambueso. Framboisier. Raspberry. MAT(b)/HERB(c). 1200-2200 m. cc. V-VII.
- Rubus saxatilis* L. -. -. -. BOSC(ca). 1725. rrr. VII-VIII. AME.
- Rubus ulmifolius* Schott [R. *discolor* auct., non Weihe et Nees] - Romeguera/Esbarzer. Zarzamora. Ronce à feuilles d’orme. Bramble. MAT(b). 1200-1575 m. cc. VI-VIII.
- Sanguisorba officinalis* L. Pimpinella major. Sanguisorba mayor. Grande pimprenelle. -. PRAT(h). 1240-2100 m. c. VII-VIII.
- Sibbaldia procumbens* L. Sibaldia. -. Sibbaldie couchée. -. AQUA(c). 2100-2740 m. rr. VII-VIII.
- Sorbus aucuparia* L. subsp. *aucuparia* Moixera de guilla. -. Serbal de cazadores. Sorbier des oiseleurs. -. BOSC(p). 1280-2020 m. c. V-VII.

Rubiaceae

- Asperula cynanchica* L. subsp. *cynanchica* [incl. *A. cynanchica* subsp. *brachysiphon* (Lange) O. Bolos & Vigo] ROC(r)/PRAT(r). 1400-1800 m. r. VI-VII.
- Asperula cynanchica* subsp. *pyrenaica* (L.) Nyman ROC(r)/PRAT(r). 1700-2200 m. rrr. VII.
- Cruciata glabra* (L.) Ehrend. (*Galium verum* Scop.) Te de bosc. Crucuada glabra. Croisette glabre. -. PRAT/ROC/BOSC(h). 1200-2700 m. cc. V-VII.
- Cruciata laevipes* Opiz [*Galium cruciata* (L.) Scop.] Creuera. Cruzada. Croisette commune. Crosswort. RUD. 1220-2020 m. c. V-VI.
- Galium album* Mill. [*G. mollugo* subsp. *erectum* Syme] Espunyidera blanca. -. Caille-lait commun. -. PRAT(h). 1200-1480 m. r. VI-VIII.
- Galium aparine* L. Rèvola/Apegalós. Amor de hortelano. Gaillet accrochant. Goosegrass. ARV/RUD. 1200-2000 m. cc. V-VIII.
- Galium cometerhizon* Lapeyr. Espunyidella de pedrusca. -. Gaillet à racines chevelues. -. ROC(t). 2200-2870 m. c. VI-VIII.
- Galium estebanii* Sennen [*G. pumilum* Murray subsp. *pinetorum* (Ehrend.) Vigo; *G. pinetorum* Ehrend.] Espunyidella prima. -. -. -. PRAT/MAT/BOSC. 1200-1900 m. cc. VI-VIII.
- Galium lucidum* All. subsp. *lucidum* Espunyidella blanca. -. -. -. HERB(v)/PRAT(a). 1200-1760 m. c. VI-VIII.
- Galium marchandii* Roem. & Schult. [*G. pumilum* Murray subsp. *marchandii* (Roem. & Schult.) O. Bolos & Vigo] PRAT/BOSC/MAT/ROC(t). 1800-2680 m. c. VI-VIII.
- Galium maritimum* L. Espunyidella peluda. -. -. -. HERB(v). 1200-1810 m. cc. VI-VIII.
- Galium odoratum* (L.) Scop. [*Asperula odorata* L.] Espunyidella d’olor. -. Aspérule odorante. -. BOSC(h). 1700 m. rrr. VI.
- Galium palustre* L. Espunyidella palustre. Galio de río. Gaillet des marais. -. AQUA. 1340-1720 m. r. VI-VIII.
- Galium pyrenaicum* Gouan - Espunyidella pirinenca. -. Gaillet des pyrénées. -. PRAT, ROC(ca). 1750-2720 m. c. VI-VIII.
- Galium spurium* L. [*G. aparine* subsp. *spurium* (L.) Hartm.] -. -. -. ARV/RUD(h). 1450 m. rrr. VI.
- Galium uliginosum* L. -. -. -. PRAT/RUD(t) (h). 1450 m. rrr. VII.
- Galium verum* L. subsp. *verum* Espunyidella groga. Cuajaleche. Gaillet jaune. Lady’s bedstraw. PRAT(h). 1200-2290 m. cc. VI-IX.
- Sherardia arvensis* L. Rèvola borda. Azulilla. Shérardie des champs. -. PRAT(a)/ROC(m). 1200 m. rr. VI.

Salicaceae

- Salix herbacea* L. Salenca herbàcia. -. Saule herbacé. -. AQUA(c). 2100-2680 m. r. VI-VII.
Salix pyrenaica Gouan Salenca dels Pirineus. -. Saule des pyrénées. -. AQUA(c,f,t) (ca). 2040-2200 m. rrr. VI-VII.
Salix retusa L. Salenca retusa. -. Saule à feuilles rétuses. -. AQUA(c). 2000-1680 m. cc. VI-VII.
Salix atrocinerea Brot. (*S. cinerea* subsp. *oleifolia* Macgreith) Gatsaule/Gatell. Salguera. Saule roux-cendré. Grey willow. BOSC(br). 1260-1700 m. c. IV-V.
Salix caprea L. – Gatsaule/Gatsaule. Sauce cabruno. Saule des chèvres. Goat willow. BOSC(h)/HERB(c)/ROC(t). 1200-2000 m c.. III-IV.
Salix elaeagnos Scop. Sarga. Sargatillo. Saule à feuilles étroites. Elaeagnus Willow. BOSC(br)/AQUA. 1200-1600 m. r. IV-V.
Salix bicolor Willd. [*S. phylicifolia* L. subsp. *bicolor* (Willd.) O. Bolòs & Vigo] Salze bicolor. Saule bicolore. -. AQUA(t). 2080 m. rrr. FENO.
Salix purpurea L. Saulic. Sauce rubión. Saule pourpre. -. BOSC(br)/AQUA. 1220-1640 m. c. IV-V.
Salix reticulata L. Citat a prop.
Salix triandra L. Salze triandre. -. Osier brun. -. BOSC(br). 1480 m. rrr. IV.
Salix ×fragilis L. [*S. alba* × *S. euxina* I.V. Belyaeva; *S. × rubens* Schrank] Salze blanc. Sauce. Saule fragile. Crack willow. BOSC(br). 1220-1680 m. r. IV-V.
Salix ×quercifolia Sennen [*S. caprea* × *S. cinerea* var. *atrocinerea*] BOSC(br). 1480 m. rr. IV.
Salix lapponum L. [*S. lapponum* subsp. *ceretana* P. Monts.; *S. ceretana* (P. Monts.) Chmelar] Citat a prop.
Populus ×canadensis Moench [*P. deltoides* × *P. nigra*] Aure poll/Pollangre/Pollancre. Álamo negro. Peuplier noir. Black poplar. BOSC(br). 1260-1620 m. cc.
Populus nigra L. Pollancre. Álamo negro. Peuplier noir. Black poplar. BOSC(br). 1200-1550 m. r. III-IV.
Populus tremula L. subsp. *tremula* Trèmol/Trèmol. Álamo temblón. Peuplier tremble. Aspen poplar. BOSC(h)/HERB(c). 1240-1980 m. cc. IV-V.

Santalaceae

- Thesium alpinum* L. subsp. *alpinum* Tèsium alpí. Mimbrera roja. Thesium des alpes. -. PRAT(h)/ROC(r,h). 1530-2120 m. r. VI-VII
Thesium humifusum DC. [*T. divaricatum* Jan et Mert. et Koch in Röhling] Tèsium divaricat. Tesio común. Thesium couché. -. PRAT/ROC(s). 1400-1720 m. VI-VII.
Viscum album L. subsp. *album* Vesc. Muérdago. -. -. BOSC(h) sobre *Fraxinus excelsior*. 1340 m. rrr. VII.
Viscum album L. subsp. *austriacum* (Wiesb.) Vollm. Vesc. Muérdago. -. -. BOSC (*Pinus uncinata*). 1700 m. rrr. AME.

Sapindaceae

- Acer campestre* L. Auró blanc. Arce común. Érable champêtre. Hedge maple. BOSC(h). 1200-1560 m. c. IV-V.
Acer negundo L. Negund. Negund. Arce negundo. Érable negundo. -. BOSC(br). 1200-1420 m. rrr. IV-V.
Acer opalus Mill. subsp. *opalus* Blada. Acirón. Érable à feuilles d'obier. Italian mapple. BOSC(s). 1340-1600 m. rrr. IV-V.
Acer platanoides L. Erable. Arce real. -. -. BOSC(br). 1200-1440 m. rr. IV.
Acer pseudoplatanus L. Fal plàtan. Arce sicómoro. Érable sycomore. -. BOSC(br). 1220 m. rrr. V.

Saxifragaceae

- Chrysosplenium oppositifolium* L. Crisospleni. Hepática dorada. Dorine à feuilles opposées. Opposite-leaved golden-saxifrage. AQUA(c). 1200-1840 m. c. IV-V.

- Heuchera sanguinea* Engelm. -. -. -. ROC(r). 1240 m. rrr. VII. AL/SUB.
- Micranthes clusii* (Gouan) Fern. Prieto, V. Vázquez, Vallines & Cires [*Saxifraga clusii* Gouan] -. -. -. ROC(r,h). 2550 m. rrr. VIII. AME.
- Micranthes stellaris* (L.) Galasso, Banfi & Soldano subsp. *stellaris* [*Saxifraga stellaris* L.] Saxifraga estelada. -. Saxifrage d'engler. -. AQUA(f,m). 1600-2550 m. c. VI-VIII.
- Saxifraga aizoides* L. Saxifraga groga. Saxífraga amarilla. Saxifrage faux orpin. -. AQUA(f)/ROC(h). 1200-2760 m. c. VI-VIII.
- Saxifraga androsacea* L. -. -. -. AQUA(c,f). 2340-2650 m. rr. VII-VIII.
- Saxifraga aquatica* Lapeyr. Enciam de font. -. Saxifrage aquatique. -. AQUA(f). 1900-2400 m. c. V-VIII.
- Saxifraga aspera* L. -. -. -. ROC(r),PRAT(a) (ac). 2100-2200 m. rrr. VII-VIII.
- Saxifraga bryoides* L. Saxífraga brioiide. -. Saxifrage d'auvergne. -. ROC(r,t). 2100-1750 m. cc. VII-VIII.
- Saxifraga cuneifolia* L. Error.
- Saxifraga cotyledon* L. Error.
- Saxifraga exarata* Vill. Les cites es refereixen a *Saxifraga moschata* Wulfen.
- Saxifraga geranioides* L. Herba de les setsagnies/Saxífraga geranioides. -. Saxifrage faux géranium. -. ROC(t)/MAT(n)(si). 1900-2700 m. cc. VI-VIII.
- Saxifraga granulata* L. subsp. *granulata* Saxífraga granulosa. Saxífraga común. Saxifrage granulée. -. HERB(v). 1200-2200 m. cc. V-VII.
- Saxifraga media* Gouan Saxífraga mitjana. -. Saxifrage intermédiaire. -. ROC(r,ca). 1550-2650 m. r. VI-VII.
- Saxifraga moschata* Wulfen [*S. moschata* subsp. *fastigiata* (Luizet) P. Fourn.] Saxífraga moscada. -. Saxifrage musquée. -. ROC(r,t)/PRAT(r). 2000-2780 m. cc. VII-VIII.
- Saxifraga muscoides* All. (sub. *S. planifolia* Lap.). Error.
- Saxifraga oppositifolia* L. subsp. *oppositifolia* Saxífraga opositifòlia. Saxífraga ártica. Saxifrage à feuilles opposées. -. ROC(t,ca). 1840-2700 m. cc. V-VII.
- Saxifraga paniculata* Mill. subsp. *paniculata* Corona de rei/Saxifraga paniculada. -. Saxifrage paniculée. -. ROC(r,ca). 1200-2720 m. cc. VI-VIII.
- Saxifraga pentadactylis* Lapeyr. subsp. *pentadactylis* Saxífraga de cinc dits. -. -. -. ROC(si,r). 2600-2750 m. r. VII-VIII.
- Saxifraga petraea* L. Error.
- Saxifraga praetermissa* D.A. Webb -. -. -. -. ROC(t,h)/AQUA(c,f). 2200-2600 m. rr. VIII-IX.
- Saxifraga pubescens* Pourr. subsp. *pubescens* Saxífraga pubescent. -. Saxifrage pubescente. -. ROC(r,t,si). 1550-2770 m. cc. VI-VII.
- Saxifraga rotundifolia* L. Error.

Scrophulariaceae

- Buddleja davidii* Franch. Buddlèia. Lila de verano-. Buddlèia de david. -. ROC. 1200-1960 m. cc. VII-IX. AL/INV.
- Scrophularia alpestris* Benth. Escrofulària alpestre. Escrofularia alpina. Scrofulaire des alpes. BOSC(br,h)/HERB(m). 1200-2000 m. c. VI-VIII.
- Scrophularia auriculata* subsp. *valentina* (Rouy) Ortega Oliv., Serra, Herrero & Muñoz Garm. [*S. auriculata* subsp. *pseudoauriculata* (Sennen) O. Bolòs & Vigo] Escrofulària aquàtica. Escrofularia acuàtica. Scrofulaire aquatique. Water figwort. AQUA(j,cr). 1240-1280 m. rrr. VI. M. Marcer (*pers. comm.* 2020).
- Scrophularia crithmifolia* Boiss. [*S. canina* subsp. *crithmifolia* (Boiss.) O. Bolòs & Vigo] Escrofulària de ca. Escrofularia de muntanya. Scrofulaire à feuilles de criste marine. -. ROC(t).1240-1680 m. c. V-VII.
- Scrophularia nodosa* L. Escrofulària nodosa. Hierba de San Pedro. Scrofulaire noueuse. Figwort. BOSC(h)/HERB(v,c). 1200-1560 m. c. VII-IX.
- Verbascum boerhavii* L. -. -. -. -. RUD. 1250-2020 m. c. VI-VIII.
- Verbascum chaixii* Vill. Cua de guilla/Trepó. -. -. -. HERB(v)/MAT(g)/PRAT. 1340 m. rrr. VII.
- Verbascum lychnitis* L. Cua de guilla/Trepó candeler. Gordolobo hembra. Molène lychnite. -. HERB(v,c). 1200-2200 m. cc. VI-IX

Verbascum pulverulentum Vill. Cua de guilla/Trepó pulverulent. Gordolobo de montaña. Molène floconneuse. -. RUD(h). 1240-2000 m. r. VI-VIII.

Verbascum thapsus L. [*V. thapsus* subsp. *crassifolium* (Lam.) Murb; *V. thapsus* subsp. *montanum* (Schrad.) Bonnier & Layens] RUD(h). Cua de guilla/Trepó joanal. Gordolobo. Molène des montagnes. Aaron's rod. RUD(h). 1200-2180 m. c. VII-IX.

Verbascum ×regelianum Wirtg. [*V. lychnitis* × *V. pulverulentum*] HERB(v). 1280 m. rr. VII.

Verbascum ×thaspi L. [*V. ×spurium* W.D.J. Koch; *V. lychnitis* × *V. thapsus*] HERB(v). 1300 m. rr. VII.

Solanaceae

Atropa belladonna L. Belladona. Belladona. Belladone. Deadly nightshade. RUD(t). 1250 m. rrr. VII.

Datura stramonium L. Herba talpera. Estramonio. Datura officinal. Thorn apple. ARV/RUD. 1260 m. rrr.

Hyoscyamus niger L. Herba queixalera. Beleño negro. Jusquiame noire. Henbane. RUD(s). 1540 m. rrr. VI.

Solanum dulcamara L. Dolçamara. Dulcamara. Morelle douce-amère. Bittersweet. BOSC(br)/HERB(h,c). 1220-1420 m. rr. VI-VII.

Solanum lycopersicum L. Tomaquera. Tomatera. -. -. RUD. 1220 m. rrr. VI. AL/SUB.

Solanum nigrum L. Morella. Hierba mora. Morelle noire. Black nightshade. ARV/RUD(h). 1200.1600 m. rr. VI-IX.

Solanum tuberosum L. -. -. -. RUD. 1220 m. rrr. VI. AL/SUB.

Solanum villosum Mill. [*S. nigrum* subsp. *miniatum* Willd.] -. -. -. RUD. 1460 m. rrr. VIII.

Thymelaceae

Daphne cneorum L. subsp. *cneorum* Dafne pirinenc. -. -. -. PRAT(ca). 2300 m. rrr. VI.

Daphne laureola L. subsp. *laureola* Senet/Senet bord/Lloreret. Lauréola. Daphné lauréole. -. BOSC(s). 1200-1540 m. c. IV-V.

Daphne mezereum L. subsp. *mezereum* Senet/Tintorell. Lauréola hembra. Daphné bois-gentil. Dwarf laurel. Spurge daphne. BOSC(h)/HERB(m). 1400-2350 m. cc. V-VII.

Thymelaea dioica (Gouan) All. Bufalaga de roca. -. Passerine dioïque. -. ROC(r,ca). 1370-2100 m. r. V-VII.

Thymelaea tinctoria (Pourr.) Endl. subsp. *nivalis* (Ramond) Nyman Citada a prop.

Ulmaceae

Ulmus glabra Huds. Om/Oma. -. Orme de montagne. -. BOSC(h,br). 1200-1460 m. r. IV.

Ulmus minor Mill. Om/om. Olmo. Petit orme. English elm. BOSC(h,br). 1200-1480 m. rr. III-IV.

Urticaceae

Parietaria judaica L. [*P. officinalis* L. susp. *judaica* (L.) Béguinot] Blet de paret/Morella roquera. Parietaria. Pariétaire couchée. Pellitory of the wall. RUD/ROC(m). 1200-1460 m. rr.

Urtica dioica L. subsp. *dioica* Otriga/Ortiga gran. Ortiga mayor. Grande ortie. Stinging nettle. RUD(h). 1200-2200 m. ccc. VI-VIII.

Urtica urens L. Ortiga. -. -. -. ARV/RUD. 1240-1450 m. rr. VI.

Valerianaceae

Centranthus ruber (L.) DC. subsp. *ruber* Herba de Sant Jordi. Centrantho. -. -. ROC(m)/HERB(v). 1220-1560 m. c. VI. AL/SUB.

Valeriana apula Pourr. [*V. globulariifolia* Ramond ex DC. in Lam. et DC.] Valeriana globularifolia. -. Valériane à feuilles de globulaire. -. ROC(r, ca). 1780-2650 m. c. VI-VIII.

- Valeriana montana* L. Valeriana muntanyenca. -. Valériane des montagnes . -. ROC(t,r,ca). 1200-2010 m. c. VI-VII.
Valeriana officinalis L. Valeriana. Valeriana. Valériane officinale. Valerian. HERB(v,h). cc. V-VII.
Valeriana pyrenaica L. Valeriana pirinenca. -. -. Valériane des Pyrénées. -. HERB(m)/AQUA. 1270-1700 m. rr. VII-VIII.
Valeriana tripteris L. subsp. tripteris Valeriana trisecta. -. Valériane à trois folioles. -. ROC(r,t,si). 1340-2320 m. c. VI-VII.
Valerianella dentata (L.) Pollich [incl. *V. rimosa* Bast.] -. -. -. ROC(m). 1250 m. rrr. VI.

Verbenaceae

- Verbena officinalis* L. Berbena. Verbena. Verveine officinale. Vervain. RUD(t). 1220-2000 m. c. VI-IX.

Violaceae

- Viola alba* Besser subsp. *denhardtii* (Ten.) W. Becker Viola/Viola boscana. Violeta. Violette blanche. -. BOSC(s)/HERB(v). 1240-1550 m. c. IV.
Viola biflora L. subsp. *biflora* Viola groga. -. Violette jaune. -. HERB(m)/MAT(n). 1820-2400 m. c. VI-VII.
Viola canina L. [*V. canina* subsp. *montana* (L.) Hartm.; *V. canina* subsp. *silvensis* (Font Quer) O. Bolòs & Vigo] Viola/Viola canina. Violeta de roble. Violette des chiens . -. PRAT/MAT(ac). 1360-2020 m. c. V-VI.
Viola diversifolia (Ging.) W. Becker [*V. cenisia* L. subsp. *lapeyrousiana* Rouy & Foucaud] Pensament alpi. -. Pensée de Lapeyrouse. -. ROC(t). 2100-2760 m. r. VII-VIII.
Viola hirta L. Viola/Viola hirta. -. Violette hérissée. -. PRAT(s). 1260-1540 m. r. IV-V. MED
Viola mirabilis L. Viola de fulla gran. -. Violette admirable. -. BOSC(h). rrr. 1380 m. IV.
Viola palustris L. subsp. *palustris* Viola/Viola palustre. Violeta palustre. Violette des marais. -. AQUA(m,f). 1700-1880 m. rr. IV-V.
Viola pyrenaica DC. PRAT. 1300-1600 m. rrr. IV-V.
Viola reichenbachiana Jord. [*V. sylvestris* Lam., nom. illeg.] Viola/Viola silvestre. Violeta elevada. -. -. 1260-2100 m. cc. IV-VI.
Viola riviniana Rchb. [*V. sylvestris* Lam. subsp. *riviniana* (Rchb.) Tourlet] Viola/Viola silvestre. -. Violette de rivinus. -. 130-2120 m. cc. V-VI.
Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. *rupestris* Viola/Viola rupestre. Violeta de roca. -. -. PRAT(s). 1280-2020 m. r. V-VI.
Viola arvensis Murray [*V. tricolor* subsp. *arvensis* (Murray) Gaudin] Pensament de camp. Pensamiento. Pensée des champs. Heartsease. ARV/RUD. 1200-2450 m. c. IV-V.
Viola tricolor L. subsp. *subalpina* Gaudin Pensament subalpi. Pensamiento. Pensée subalpine. -. RUD/PRAT/MAT. 1460-2460 m. cc. V-VII.

Vitaceae

- Vitis rupestris* Scheele Vinya. -. -. -. ROC(m). 1260 m. rrr.

MONOCOTILEDÒNIES

Amaryllidaceae

- Allium schoenoprasum* L. All junciforme. Cebollino. Ciboulette. Chives. AQUA(f,m). 1600-2250 m. VI-VIII. c.
Allium oleraceum L. All de serp. Ajo de cigüena. Ail des jardins. Fied garlic. PRAT/ROC(m) (s). 1220-1620 m. rr. VII-VIII.

- Allium senescens* L. subsp. *montanum* (F.W. Schmidt) Holub [*A. lusitanicum* Lam.; *A. fallax* Schult. & Schult.f.; *Allium fallax* Don.] -. -. Ail. -. PRAT(r). 1560-1880 m. r. VII-IX.
- Allium sphaerocephalon* L. All vermell. Ajo de cabeza redonda. Ail à tête ronde. Round-headed leek. PRAT(s)/ROC. 1260-1980 m. r. VII-VIII.
- Allium ursinum* L. subsp. *ursinum* All de bruixa. Ajo de oso. Ail des ours. Ransoms. BOSC(h,br). 1320 m. rrr. VI.
- Allium victorialis* L. All victorial. Ajo victorial. Ail des cerfs. Pyrenean leek. HERB(m). 1600-2200 m. c. VI-VIII.
- Galanthus nivalis* L. Llàgrimes de Sant Josep/Lliri de neu. Campanilla de nieve. Perce-neige. Snowdrop. BOSC(r)/HERB(m). 1200-1760 m. r. I-V.
- Narcissus moschatus* subsp. *molerói* (Fern. Casas) Aedo [*N. moleroi* Fern. Casas] Narcís de muntanya. -. Jonquille de montagne. -. PRAT. 1430-2500 m. cc. V-VII.

Lemnaceae

- Lemna minor* L. Llentia d'aigua. Lenteja de agua. Petite lentille-d'eau. Common duckweed. AQUA. 1220-1260 m. rr. VI.

Asparagaceae

- Anthericum liliago* L. Lliri de Sant bru. Antérico. Anthéricum à fleurs de lis. -. 1240-2000 m. c. VI-VIII.
- Aphyllanthes monspeliensis* L. Jonça. Junquillo. Aphyllanthe de Montpellier. Blue aphyllanthes. 1300-1600 m. c. IV-VI.
- Convallaria majalis* L. Muguet. Muguet. Muguet. Lily of the valley. HERB(m). 1600-1700 m. rrr. VI. AM.
- Dipcadi serotinum* (L.) Medik. subsp. *serotinum* Marcet. Jacinto bastardo. Dipcadi. Dipcadi. PRAT(a)/ROC. 1280-1770 m. rr. VI-VII.
- Loncomelos pyrenaicum* (L.) J. Holub subsp. *pyrenaicum* [*Ornithogalum pyrenaicum* L. subsp. *pyrenaicum*] Ornitògal pirinenc. -. Ornithogale des Pyrénées -. PRAT(r)/ROC8r). 1780-1900 m. rrr. VII.
- Maianthemum bifolium* (L.) F.W. Schmidt Maiàntem. -. Maiànthème à deux feuilles. -. BOSC/HERB(c). 1500 m. rrr. VI-VII. PRO.
- Muscari latifolium* J. Kirk. -. -. -. PRAT(t). 1240 m. rrr. IV. AL/SUB.
- Muscari neglectum* Ten. Calabruixa petita. Penitentes. Muscari à grappe. Grape hyacinth. PRAT/RUD. 1200-1780 m. r. V-VI.
- Ornithogalum divergens* Boreau Llet d'ocell. Leche de gallina. Ornithogale en ombelle. Star of bethlehem. RUD/PRAT. 1200-1420 m. r. VI-VII.
- Paradisea liliastrum* (L.) Bertol. Lliri blanc/Paradísia. -. Lis des Alpes. -. PRAT(s,h). 1220-2080 m. r. VI-VIII.
- Polygonatum multiflorum* (L.) All. Segell de ram. -. Sceau-de-Salomon multiflore. Common Solomon's seal. 1380 m. rrr. VI.
- Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce Segell de Salomó. Lágrimas de David. Sceau-de-Salomon odorant. Scented Solomon's seal. BOSC/HERB(m). 1240-1980 m. r. VI-VII.
- Polygonatum verticillatum* (L.) All. Segell verticil-lat. Sello de Salomón verticilado. Sceau-de-Salomon verticillé. Whorled Solomon's seal. BOSC(h)/HERB(cl). 1430-2100 m. c. VI-VII.
- Puschkinia scilloides* Adams . -. Escila de rayas. -. -. RUD. 1320 m. rrr. VI. AL/SUB. M. Marcer (pers. comm. 2020).
- Scilla lilio-hyacinthus* L. Joliu. -. Scille lis-jacinthe. -. BOSC(br). 1340 m. rrr. VI.
- Streptopus amplexifolius* (L.) DC. Strèptopus. -. Sceau-de-Salomon nouveau. -. HERB(m). 1960-2080 m. rrr.

Asphodelaceae

Asphodelus albus Mill. subsp. *subalpinus* Nyman [*A. albus* subsp. *delphinensis* (Gren. & Godr.) Z. Díaz & Valdés; *A. albus* auct., non Mill.]. Citat, probablement fora de l'àmbit, cal comprovació.

Asphodelus macrocarpus Parl. subsp. *macrocarpus* [*A. albus* subsp. *villarsii* (Billot) I.B.K. Richardson & Smythies] Albó de muntanya. Asphodèle de villars. -. PRAT,MAT(s). 1500-2050 m. r.

Hemerocallis fulva (L.) L. Assutzena rossa. Lirio de día. Lis rouge. Orange day-lily. ROC(m)/PRAT(s). 1240 m. rrr. AL/SUB.

Cyperaceae

Carex appropinquata Schumach. Error.

Carex atrata L. subsp. *atrata* Càrex negre. -. Laîche noirâtre. Black alpine sedge. PRAT/AQUA(c)/MAT(c)/HERB(m). 2040-2300 m. rr. VII.

Carex capillaris L. -. -. -. PRAT(ca)/AQUA(m). 1820-2100 m. rrr. VII.

Carex caryophyllea Latourr. Càrex vernal. -. Laîche de printemps. -. PRAT. 1240-2580 m. ccc. V-VII.

Carex curvula All.

subsp. *curvula* Càrex corbat. -. Laîche courbée. Alpine sedge. PRAT(h). 2200-2780 m. c. VII-VIII.

subsp. *rosae* Gilomen -. -. Carex courbé à feuilles épaisses. -. PRAT. 2000-2670 m. rr. VII-VIII.

Carex digitata L. Càrex digitat. Cárice digitada. Laîche digitée. Finger sedge. BOSC(h). 1220-1600 m. r. V-VI.

Carex dioica L. Error.

Carex distans L. Càrex distant. Cárice distante menor. Laîche à épis distants. Distant sedge. AQUA(j)/PRAT(h). 1340 m-1780 m. rr. V-VI.

Carex disticha Huds. -. -. Laîche distique. B rown sedge. AQUA(j,m). 1440-1880 m. rr. VII-VIII.

Carex divulsa Stokes [*C. muricata* subsp. *divulsa* (Stokes) Celak] Càrex muricat. Cárice de espiga laxa. Laîche écartée. Grey sedge. RUD(t)/PRAT. 1280-1380 m. rr. VI.

Carex echinata Murray Càrex estel·lat. Cárice estrellada. Laîche étoilée. Star sedge. AQUA(m,j,si). 1420-2220 m. r. VI-VII.

Carex ericetorum Pollich -. -. Laîche des bruyères. Rare spring sedge. PRAT(h,ac). 1880-2600 m. cc. VI-VIII.

Carex flacca Schreb. subsp. *flacca* Càrex glauc. -. Laîche glauque. Blue sedge. PRAT(h)/AQUA(j,cr). 1200-2000 m. ccc. V-VI.

Carex flava L. [*C. flava* subsp. *alpina* (Kneuck.) O. Bolòs, Masalles & Vigo] Càrex groc. Cárice amarillenta. Laîche glauque. Yellow sedge. AQUA(m,j). 1800-2460 m. c. VI-VIII.

Carex frigida All. Càrex frigid. -. Laîche des lieux froids. -. AQUA(m,f). 1550-2080 m. r. VI-VII.

Carex hallerana Asso Càrex d'haller. Càrex hallerià. Cárice de monte. Laîche de Haller. -. PRAT/ROC(s,ca). 1480-1880 m. rr. V-VI.

Carex hirta L. Càrex hirsut. Cárice pelosa. Laîche hérissée. Hairy sedge. AQUA(j)/RUD(t,h). 1380-1880 m. rr. VI-VII.

Carex humilis Leyss. Càrex humil. -. Laiche basse. Dwarf Sedge. PRAT(s)/ROC(r). 1600-2000 m. rr. IV-V.

Carex lepidocarpa Tausch [*C. flava* subsp. *lepidocarpa* (Tausch) Lange] -. Cárice amarillenta esférica. Laîche à beaux fruits. -. AQUA(m,j,ca)/PRAT(h). 1680-1900 m. rr. V-VI.

Carex leporina L. [*C. ovalis* Gooden.] Càrex oval. Cárice ovalada. Laîche des lièvres. Oval sedge. PRAT(h)/AQUA(m,f). 1250-2230 m. c. V-VII.

Carex mairei Coss. & Germ. [*C. mairii* Coss. et Germ.] -. -. Laiche de Maire. AQUA(j,m). rrr. 1300 m. VI.

Carex myosuroides Vill. [*Kobresia myosuroides* (Vill.) Fiori] Elina. -. Cobrésia queue-de-souris. Bellardi's Bog-sedge. PRAT(r,ca). 1860-2780 m. r. VII-VIII.

- Carex nigra* (L.) Reichard Càrex fosc. Cárice negra densa. Laîche brune. Black sedge. AQUA(m,f,ac). 1480-2400 m. c. VI-VII.
- Carex ornithopoda* Willd. [*C. ornithopoda* subsp. *ornithopodoides* (Hausm.) Nyman] -. -. Carex pied-d'oiseau. Bird's-foot Sedge. PRAT(r,ca). 1420-2340 m. rr. VI-VII.
- Carex pairae* F.W. Schultz [*C. muricata* subsp. *pairae* (F.W. Schultz) Celak.; *C. muricata* auct., non L.] Càrex muricat. -. -. RUD(t). 1380 m. rrr. VI.
- Carex pallescens* L. -. -. Laîche pâle. Pale sedge. PRAT(h)/HERB(m). 1510-1880 m. rr. VII.
- Carex panicea* L. -. Cárice negra laxa. Laîche bleuâtre. -. AQUA(j,m,ca). 1700-1900 m. r. VI-VII.
- Carex paniculata* L. subsp. *paniculata* [*C. vaginata* auct. iber., non Tausch] Càrex paniculat. Cárice paniculada. Laîche paniculée. Greater tussock-sedge. AQUA(m,j,f,ca). 1400-1780 m. r. V-VII.
- Carex parviflora* Host [*C. atrata* subsp. *nigra* (Gaudin) Hartm.] -. -. Laiche à petites fleurs. -. AQUA/PRAT (ca). Estatge alpi, rr. 2250-2800 m. VII-VIII.
- Carex pyrenaica* Wahlenb. Càrex pirinenc. -. Laîche des Pyrénées. Pyrenean sedge. AQUA(c,si). 2100-2500 m. rr. VII-VIII.
- Carex remota* L. Càrex remot. Cárice remota. Laîche à épis espacés. Remote sedge. BOSC(br)/AQUA(j). 1220-1260 m. rr. VI.
- Carex rupestris* All. -. -. -. ROC(ca) 2400 m. rrr. VII.
- Carex sempervirens* Vill. subsp. *pseudotristis* (Domin) Pawl. Citat a prop.
- Carex sempervirens* Vill. subsp. *sempervirens* Citat a prop.
- Carex sylvatica* Huds. subsp. *sylvatica* Càrex selvàtic. Cárice de bosque. Laiche des bois. Wood-sedge. BOSC(h). 1380-1500 m. rr. VI.
- Carex umbrosa* Host subsp. *huetiana* (Boiss.) Sóo Càrex ombrós. Cárice umbrosa. Laîche de Huet. Shady sedge. AQUA(m)/PRAT(h). 1640- 2600 m. cc. VI-VIII.
- Carex umbrosa* Host subsp. *umbrosa* Càrex ombrós. Cárice umbrosa. Laîche de Huet. Shady sedge. PRAT(h). 1550-1780 m. rrr. VI-VII.
- Cyperus eragrostis* Lam. Serrana d'Amèrica. Juncia americana. Souchet robuste. Nutgrass. AQUA(j)/HERB(h)/RUD(h). 1220-1340 m. r. VIII. AL/INV.
- Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult. subsp. *palustris* Jonquet. Junco palustre. Souchet des marais. Common spike-rush. AQUA(cr). 1680 m. rrr.
- Eriophorum angustifolium* Honck. Cotonera angustifòlia. Algodonera de hoja estrecha. Linaigrette à feuilles étroites. Common cottongrass. AQUA(m). 1450-2000 m. rrr. VI.
- Isolepis setacea* (L.) R. Br. [*Scirpus setaceus* L.] -. -. -. AQUA(j). 975-1525 m. rrr. VII.
- Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják [*Scirpus holoschoenus* L.; *Holoschoenus vulgaris* Link] Jonc boval. Junco. Scirpe-jonc. Round-headed club-rush. AQUA(j). 1200-1550 m. rr. VII.
- Trichophorum alpinum* (L.) Pers. [*Eriophorum alpinum* L.]. Error.
- Trichophorum cespitosum* (L.) Hartm. [*Scirpus cespitosus* L.] Tricòfor. -. Scirpe cespiteux. Tufted bulrush. AQUA(m,j,ac). 2080-2250 m. rrr. VI.

Dioscoreaceae

- Dioscorea communis* (L.) Caddick & Wilkin [*Tamus communis* L.] Gatmaimó. Brionia negra. Herbe aux femmes battues. Black bryony. MAT(b)/BOSC(h). 1220-1480. rr. V.

Iridaceae

- Crocus nudiflorus* Sm. Safrà bord. Azafrán de montaña. Crocus d'automne. Leafless crocus. PRAT(h). 1500-2230 m. cc. IV-XI.
- Crocus vernus* (L.) Hill [*C. vernus* subsp. *albiflorus* (Schult.) Ces.] Safrà de muntanya. -. Crocus à fleurs blanches. Purple crocus. PRAT(h). 1400-2300 m. c. III-IV.
- Iris germanica* L. Lliri blau. -. -. -. ROC(m). 1300-1450 m. rrr. VI.
- Xiphion latifolium* Mill. [*Iris latifolia* (Mill.) Voss.] Lliri blau. Lirio de hoja ancha. Iris des Pyrénées. English iris. PRAT. rr. 1600-1900 m. VII-VIII.

Juncaceae

- Juncus acutiflorus* Hoffm. Jonc acutiflor. Junco de cáliz agudo. Jonc à tépales aigus. Sharp-flowered rush. AQUA(j). 1320-1880 m. VII-VIII.
- Juncus alpino-articulatus* Chaix subsp. *alpino-articulatus* [*J. alpinus* Vill. subsp. *alpinus*] Jonc alpi. Junco alpino. Jonc alpin. Northern green rush. AQUA(m,j). 1600-2200 m. c. VII-VIII.
- Juncus articulatus* L. subsp. *articulatus* Jonc articul. Junco articulado. Jonc articulé. Jointed rush. AQUA(j,m). 1220-2000 m. cc. VII-VIII.
- Juncus balticus* Willd. subsp. *pyrenaicus* (Jeanb. & Timb.-Lagr.) P. Fourn. [*J. pyrenaicus* Jeanb. & Timb.-Lagr.] Jonc pirinenc. -. Jonc des Pyrénées. -. AQUA(m). 2080-2200 m. rrr. VII-VIII. PRO.
- Juncus bufonius* L. Jonc de galàpet. -. Jonc des crapauds. Toad rush. AQUA(j). 1340 m-2000 m. rr. V.
- Juncus bulbosus* L. subsp. *bulbosus* -. -. -. AQUA(j)/HERB(m). 1400-1780 m. rrr. VII.
- Juncus conglomeratus* L. Jonc conglomerat. Junco aglomerado. Jonc aggloméré. Compact rush. AQUA(j)/PRAT(h). 1400-1900 m. c. VII-VIII.
- Juncus effusus* L. Jonc d'estores. Junco de esteras. Jonc diffus. Soft rush. AQUA(j). 1240-1970 m. ccc. VII-VIII.
- Juncus inflexus* L. subsp. *inflexus* Jonquina. Junco glauco. Jonc glauque. Hard rush. AQUA(j)/RUD(t). 1200-1820 m. c. VI-VII.
- Juncus tenuis* Willd. Jonc tènue. -. -. Slender rush. RUD(t). 1240-1780 m. r. VI-VII. AL/INV.
- Juncus triglumis* L. subsp. *triglumis* Jonc tribracteat. -. Jonc à trois glumes. Three-flowered rush. AQUA(m,j). 2020 m. rrr. VI. PRO.
- Juncus ×diffusus* Hoppe [*J. effusus* × *J. inflexus*] -. -. -. AQUA(j), 1700 m. rrr. Cita antiga.
- Luzula campestris* (L.) DC. Lúzula campestre. Lúzula de prado. Luzule des champs. Field wood-rush. PRAT/MAT(ac). ccc. 1240-2300 m. V-VII.
- Luzula desvauxii* Kunth [*L. glabrata* (Hoppe) Desv. subsp. *desvauxii* (Kunth) Buchenau] Lúzula glabra. -. Luzule de Desvaux. -. HERB(m)/AQUA(f). 1800-2500 m. c. VI-VII.
- Luzula lutea* (All.) DC. Lúzula groga. -. Luzule jaune. Yellow wood-rush. PRAT(ac). 2000-2700 m. cc. VI-VIII.
- Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej. subsp. *multiflora* Lúzula multiflora. -. Luzule multiflore. Common Woodrush. PRAT. 1700 m. rrr.
- Luzula nivea* (L.) DC. Lúzula nívea. -. Luzule blanc de neige. Snowy wood-rush. BOSC/HERB(m) (ac). 1420-1940 m. cc. VI-VII.
- Luzula pediformis* (Chaix) DC. [*L. nutans* (Vill.) Duval-Jouve] Lúzula nutant. Lúzula colgante. Luzule penchée. -. PRAT(ac). 2000-2650 m. c. VI-VIII.
- Luzula spicata* (L.) DC. [*L. spicata* subsp. *monsignatica* P. Monts.] Lúzula d'espiga, Lúzula espigada. Lúzula espigada. Luzule d'Espagne. Spiked wood-rush. PRAT(ac). 1980-2680 m. cc. VI-VII.
- Luzula sylvatica* (Huds.) Gaudin subsp. *sylvatica* Lúzula selvàtica. -. Grande luzule. Greater wood-rush. BOSC(h)/HERB(m). 1480 m. rrr. VI.
- Oreojuncus trifidus* (L.) Záveská, Drábková & Kirschner [*Juncus trifidus* L.] Herba prima de Rojà/ Jonc trifid. -. Jonc trifide. Highland rush/Three-leaved rush. PRAT(ac). 1700-2700 m. ccc. VII-VIII.

Juncaginaceae

- Triglochin palustris* L. -. Cinta de agua. Troscart des marais. Marsh arrowgrasses. AQUA(m). 1820 m. rrr. VI.

Liliaceae

- Erythronium dens-canis* L. Dent de ca, Diente de perro. Dent-de-chien. -. PRAT- 1680-1900 m. rrr. IV.
- Fritillaria pyrenaica* L. Fritil·lària. -. Fritillaire des pyrénées. -. 1800 m. rrr. VI.
- Gagea liotardii* (Sternb.) Schult. & Schult. fil. [*G. fragifera* (Vill.) E. Bayer & G. López; *G. fistulosa* Duby] -. -. Gagée de Liotard. -. Citacions antigues. rrr.
- Gagea lutea* (L.) Ker Gawl. Gagea groga. -. Gagée jaune. -. 1760 m. rrr. VI.

- Lilium candidum* L. Lliri de Sant Antoni. Lirio de Sant Antonio. Lis blanc. Madonna lily. RUD/ROC(m). 1240-1300 m. rrr. AL/SUB.
- Gagea liotardii* (Sternb.) Schult. & Schult. fil. [*G. fragifera* (Vill.) E. Bayer & G. López] -. -. Gagée de Liotard . -. PRAT/RUD. 2200 m. rrr. VI.
- Lilium martagon* L. Consolta vermella/Marcòlic. Martagón. Lis martagon. Martagon lily. BOSC(h)/HERB(cl,v). 1200-2400 m. cc. VII-VIII.
- Lilium pyrenaicum* Gouan Consolta/Consolta groga/Marcòlic groc. -. Lis des Pyrénées. Pyrenean lily. PRAT/HERB(m)/MAT(bg). 1500-2140 m. r. VI-VII.

Melanthiaceae

- Paris quadrifolia* L. Raïm de guineu. Uva de zorra. Parisette à quatre feuilles. Herb Paris. BOSC(h,per). 1700-1820 m. rr. V-VI.
- Veratrum album* L. Baladre. -. Vérate blanc. -. BOSC(h)/HERB(m,c)/RUD(h). 1200-2300 m. c. VII-VIII.

Orchidaceae

- Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce Curraiaà groc. -. -. PRAT. 1680 m. rrr. VI.
- Coeloglossum viride* (L.) Hartm. Orquis verde. -. Orchis vert. -. PRAT(h). 1500-2000 m. r. VI-VII.
- Corallorhiza trifida* Châtel. Orquídia d'arrel de corall. -. Racine-de-corail. -. BOSC(h). 1680-1820 m. rrr. VI.
- Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó subsp. *fuchsii* [*Orchis maculata* L. subsp. *meyeri* (Rchb.) O. Bolòs & Vigo] Orquis de Meyer. Orquis manchada común. -. -. PRAT/HERB(v). 1240-1780 m. ccc. VI-VIII.
- Dactylorhiza maculata* (L.) Soó subsp. *maculata* [*Orchis maculata* L.] Orquis maculat. Orquis manchada de turbera. -. -. AQUA(m)/PRAT(h). 1420-2200 m. c. VI-VIII.
- Dactylorhiza majalis* (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. subsp. *majalis* [*Orchis majalis* Rchb.] Orquis magenc. -. Dactylorhize de mai. -. AQUA(m,j)/PRAT(h). 1440-2100 m. cc. VI-VIII.
- Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó [*Orchis sambucina* L.; *O. latifolia* L.] Orquis sambucí. -. -. PRAT. 1460-2100 m. r. V-VII.
- Orchis mascula* L. Orquídia mascle. -. Orchis mâle. -. PRAT. 1300-2000 m. c. V-VI.
- Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Schultes subsp. *atrorubens* Epipactis vermella. Epipáctide común. Épipactis rouge sombre. -. ROC(t). 1200-1800 m. r. VI-VIII.
- Epipactis bugacensis* Robatsch [*E. rhodanensis* Gévaudan & Robatsch] Epipactis del Roine. -. Epipáctide verde. -. BOSC(br)/AQUA(m). 1200-1580 m. rr. VI-VIII.
- Epipactis distans* Arv.-Touv. Epipactis de fulles distants. Epipáctide distante. -. -. HERB(v,c). 1580-1700 m. VII.
- Epipactis helleborine* (L.) Crantz Epipactis de fulla gran. Epipáctide mayor. Épipactis à larges feuilles. -. BOSC/HERB(v,c)/PRAT. 1240-1750 m. c. VII-VIII.
- Epipactis kleinii* M.B. Crespo, M.R. Lowe & Piera Epipactis de Klein. Epipáctide menor. Epipactis à petites fleurs. -. HERB(v,c). 1340 m. rrr. VII-VIII.
- Epipactis muelleri* Godfery [*E. helleborine* subsp. *muelleri* (Godfery) O. Bolòs, Masalles & Vigo] Epipactis de Müller. -. -. PRAT. 1380 m. rrr. VII.
- Epipactis phyllanthes* G.E. Sm. [*E. fageticola* (C.E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers) -. Epipáctide de hayedo. -. -. BOSC(h). 1200-1300 m. rrr. VII-VIII.
- Goodyera repens* (L.) R. Br. Godiera. Gudiera. Goodyère rampante. -. HERB(v)/BOSC(p). 1220-1260 m. rrr. VII.
- Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. Caputxina olorosa. -. Gymnadénie moucheron. -. PRAT. 1230-2100 m. cc. VI-VIII.
- Neotinea ustulata* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (*Orchis ustulata* L.) Orquis socarrat. Orquis tostada. Orchis brûlé. -. PRAT. 1450-2000 m. c. VI-VII.

- Neottia cordata* (L.) Rich. [*Listera cordata* (L.) R. Br.] Listera cordifolia. -. Listère à feuilles cordées. -. BOSC(p)/MAT(n). 1600 m. rrr. VI-VII.
- Neottia nidus-avis* (L.) Rich. Magraneta borda.-. Néottie nid-d'oiseau. -. BOSC(h). 1240-1800 m. c.
- Neottia ovata* (L.) Bluff & Fingerh. [*Listera ovata* (L.) R. Br.] Listera ovada. Hierba de dos hojas. Grande listère. Common twayblade. HERB(v)/BOSC/PRAT(h). 1340-1820 m. c. VI-VII.
- Nigritella austriaca* (Teppner & E. Klein) P. Delforge subsp. *iberica* (Teppner & E. Klein) L. Sáez [*Gymnadenia austriaca* (Teppner & E. Klein) P. Delforge subsp. *iberica* (Teppner & E. Klein) L. Sáez & P. Aymerich] Nigritel-la d'Àustria. -. -. -. PRAT(h). 1440-2040 m. c. VII-VIII.
- Nigritella gabasiana* Teppner & Klein [*Gymnadenia gabasiana* (Teppner & E. Klein) Teppner & E. Klein; *N. nigra* (L.) Rchb. subsp. *gabasiana* (Teppner & E. Klein) O. Bolòs, Masalles & Vigo] Nigritel-la de Gabas. Nigritela. -. -. PRAT(h). 1450-2000 m. c. VII-VIII.
- Orchis mascula* L. Orquis masclè. -. -. -. PRAT. 1680 m. rrr. VI.
- Platanthera bifolia* (L.) Rich. Platantera de dues fulles. -. -. -. PRAT/HERB(c,v). 1240-1900 m. c. VI-VII
- Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb. Platantera de muntanya. -. -. -. BOSC/PRAT/HERB(c,v). 1400-2100 m. c. V-VIII.
- Pseudorchis albida* (L.) Á. Löve & D. Löve subsp. *albida* Orquis blanc. -. -. -. PRAT/HERB(c). 1960-2100 m. rrr. VII-VIII.
- Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich. -. -. -. -. AQUA(j)/PRAT(h). 1600 m. rrr.

Poaceae

- Achnatherum calamagrostis* (L.) P. Beauv. [*Stipa calamagrostis* (L.) Wahlenb.] Acnàter. -. Calamagrostide argentée. -. ROC(t). 1280-1480 m. rr. VI-VII.
- Agropyron cristatum* (L.) Gaertn. var. *pectiniforme* (Roem. & Schult.) H.L. Yang [*Agropyron cristatum* (L.) Gaertn. subsp. *pectinatum* (M. Bieb.) Tzvelev] Agropir pectinat. -. Chiendent pectiné. -. RUD(t). 1240 m. rrr. VI. AL/SUB.
- Agrostis canina* L. subsp. *canina* Agrostis canina. Agróstide de montaña. Agrostide canine. -. AQUA(m,f,si). 1800-2200 m. rr. VII-VIII.
- Agrostis capillaris* L. subsp. *capillaris* [*A. tenuis* Sibth.] Agrostis tènue. Agróstide tenue. Agrostide commune. Common bent. PRAT/MAT(ac). 1200-2000 m. ccc. VII-VIII.
- Agrostis rupestris* All. [*A. rupestris* subsp. *pyrenaica* (Pourr.) Dostal] Agrostis rupestre. -. -. -. AQUA(m,f,si). 1940-2770 m. cc. VI-VIII.
- Agrostis schraderiana* Bech. [*A. agrostiflora* (Beck) Rauschert; *Calamagrostis agrostiflora* G. Beck] -. -. -. -. HERB(m). 1680-1980 m. rr. VII-VIII.
- Agrostis stolonifera* L. [*A. alba* auct., non L.] Agrostis estolonífera. Agróstide común. Agrostide blanche. Creeping bentgrass. AQUA(cr)/RUD(t,h). 1220- 2000 m. c. VII-VIII.
- Aira caryophyllea* L. Nebulosa. -. Canche caryophyllée. -. PRAT(a,ac). 1410 m. rrr. VI.
- Alpagrostis alpina* (Scop.) P.M. Peterson, Romasch., Soreng & Sylvester [*Agrostis alpina* Scop.] -. Agróstide alpina. -. -. PRAT(ca). 1920-2500 m. rr. VII-VIII.
- Alpagrostis schleicheri* (Jord. & Verl.) P.M. Peterson, Romasch., Soreng & Sylvester [*Agrostis schleicheri* Jord. & Verl.; *A. alpina* subsp. *schleicheri* (Jord. & Verl.) Nyman] -. Agróstide jurásica. -. -. ROC(r,ca). 1700-2120 m. rr. VII-VIII.
- Anisantha madritensis* (L.) Nevski [*Bromus madritensis* L.] Bromus madrileny. -. Brome de Madrid. Compact brome. RUD(t). 1250 m. rrr. VI.
- Anisantha sterilis* (L.) Nevski [*Bromus sterilis* L.] Margall llarg. Bromo gigante. Brome stérile. -. RUD(t). 1200- 2000 m. cc. VI-VII.
- Anisantha tectorum* (L.) Nevski [*Bromus tectorum* L.] RUD(t). 1350 m. rrr. V-VII.
- Anthoxanthum odoratum* L. Gram d'olor. Grama de olor. Flouve odorante. Sweet vernal grass. PRAT(ac). 1200-2100 m. cc.

- Arrhenatherum elatius* (L.) J. Presl & C. Presl subsp. *elatius* Fromental. Avena descollada. Fromental élevé. Tall oatgrass. PRAT/HERB(v,r) (h). 1200-1820 m. ccc. VI-VII.
- Avena barbata* Link subsp. *barbata* Civada borda. Avena morisca. Avoine barbue. Slender wild oat. ARV/RUD. 1240 m. rrr. VI.
- Avenella flexuosa* (L.) Drejer [*Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.] Pèl de boc, Descàmpsia flexuosa. -. Canche flexueuse. -. BOSC/MAT/PRAT (ac). 1260-2400 m. cc. VI-VII.
- Avenula pubescens* (Huds.) Dumort. subsp. *pubescens* [*Avena pubescens* Hudson; *Helictotrichon pubescens* (Hudson) Pilger] Avenula pubescent. Avénula pelosa. -. -. PRAT(h). 1230-1980 m. c. VI-VII.
- Bellardiochloa variegata* (Lam.) Kerguélen [*B. violacea* (Bellardi) Chiov.; *Poa violacea* Bellardi] Bel-lardiocloa. -. Pâturin violacé. -. PRAT(ac). 1740-2700 m. cc. VII-VIII.
- Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng [*Dichanthium ischaemum* (L.) Roberty; *Andropogon ischaemum* L.] Albellatge fasciculat. -. Digitale glabre. Wavy hair-grass. PRAT(s). 1200-1490 m. c. VII-IX.
- Brachypodium distachyon* (L.) P. Beauv. Fenàs anual. -. Brachypode à deux épis. -. PRAT(r). 1240 m. rrr. VI.
- Brachypodium phoenicoides* (L.) Roem. et Schultes Fenàs de marge. Lastón. Brachypode de Phénicie. False brome. -. PRAT/HERB(s). 1220-1720 m. cc. VI-VIII.
- Brachypodium sylvaticum* (Hudson) P Beauv. subsp. *sylvaticum* Fenàs de bosc. Lastón de bosque. Brachypode des bois, Brachypode des forêts. Slender false brome. BOSC(h). 1200-1680 m. ccc. VI-VIII.
- Briza media* L. Belluguets/Bellugadís (mitjà). Tembladera mediana. Brize moyenne. Quaking grass. PRAT(h). 1200-2200 m. cc.
- Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr. subsp. *erecta* [*Bromus erectus* Huds. subsp. *erectus*] Bromus erecte. Bromo erecto. Brome des prés. Erect brome. PRAT. 1200-1780 m. cc. VI-VII.
- Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub subsp. *inermis* [*Bromus inermis* Leyss. subsp. *inermis*] Bromus inerme. -. Brome inerme. -. RUD. 1240 m. rrr. VII. AL/INV.
- Bromopsis ramosa* (Huds.) Holub [*Bromus ramosus* Huds.] Bromus ramós. Bromo laxo. Brome en grappe. Hairy brome. BOSC/HERB(c,v). 1240-1450 m. rr. VII.
- Bromus commutatus* Schrad. Bromus pratense. -. Brome variable. Meadow Brome. PRAT/HERB(r). 1280 m. rrr. VI.
- Bromus hordeaceus* L. [*B. mollis* L.] subsp. *hordeaceus* Bromus hordeaci. Bromo suave menor. Brome mou. Soft brome. PRAT(h)/RUD. 1220-1700 m. c. VI-VII.
- Bromus racemosus* L. subsp. *racemosus* -. -. Brome en grappe. Smooth brome. PRAT(h). 1240-1260 m. rr. VI.
- Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth -. Calamagróstide arundinácea. Calamagrostide à feuilles de roseau. -. HERB(m)/BOSC (ac,h). 1320-2230 m. r. VII-VIII.
- Catapodium rigidum* (L.) F.T. Hubbard subsp. *rigidum* [*Desmazeria rigida* (L.) Tutin subsp. *rigida*] Escleropoa. Gramilla de puño. Pâturin rigide. Ferngrass. PRAT(s,r)/RUD(t). 1220-1560 m. r. V-VII.
- Ceratochloa cathartica* (Vahl) Herter [*Bromus catharticus* Vahl] Bromus catàrtic. -. Brome cathartique. Grazing brome. RUD(t). 1220-1450 m. c. VI-VIII. AL/INV.
- Cynodon dactylon* (L.) Pers. Gram. Grama. Chiendent pied-de-poule. Bermuda grass. RUD(t). 1200-1450 m. c. VII-IX.
- Cynosurus cristatus* L. -. Cola de perro fina. Crételle/Crételle des prés/Crételle à crêtes. Crested dog's-tail. PRAT(h,t). 1220-1920 m. ccc. VI-VII.
- Cynosurus echinatus* L. Cinosur equinat. Cola de perro común. Crételle épineuse. -. RUD(t)/PRAT(a,s). 1240-1500 m. r. V-VII.
- Dactylis glomerata* L. Dàctil. Dáctilo. Dactyle/Dactyle aggloméré/Dactyle pelotonné. Cock's-foot. PRAT/HERB(v,r). 1200-2010 m. ccc. VI-IX.
- Danthonia decumbens* (L.) DC [*Sieglingia decumbens* (L.) Bernh.] Dantònia. Dantonía. Danthonie retombante. Heath grass. PRAT/MAT(ac). 1240-1680 m. c. VI-VII.
- Deschampsia cespitosa* subsp. *media* (Gouan) K. Richt. [*D. media* (Gouan) Roem. & Schult.] -. -. Canche moyenne. Tufted hair grass. AQUA(f,m,j)/PRAT(h). 1370- 2120 m. r.VII-VIII.

- Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. [*Panicum sanguinale* L.] Forcadella. Digitaria. Digitale commune. Crabgrass. RUD/ARV. 1220-1560 m. r. VII-IX. AL/ESP.
- Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv. Pota de gall. Pata de gallo. Panic des marais. Barnyard millet. ARV/RUD. 1240 m. rrr. VII. AL/ESP.
- Eleusine indica* (L.) Gaertn. -. -. -. RUD(t). 1230 m. rrr. X.
- Elymus caninus* (L.) L. [*Agropyron caninum* (L.) P. Beauv.] Agropir caní. -. Chiendent des chiens. Bearded wheatgrass. HERB(c). 1300-1600 m. r. VI-VII.
- Elymus repens* (L.) Gould subsp. *repens* [*Agropyrum repens* (L.) P. Beauv.] Xarpolla. Agropiro común. Chiendent rampant. Couch grass. RUD(t)/HERB(h). 1240-1320 m. r. VII-VIII.
- Eragrostis barrelieri* Daveau Eragrostis. -. Éragrostide de Barrelier. Love-grass. RUD(t). 1250 m. rrr. VI.
- Eragrostis minor* Host. Eragrostis menuda. -. Éragrostide faux pâturin. Small love-grass. RUD(t). 1240-1450 m. rr. VIII.
- Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. subsp. *pilosa*
- Festuca airoides* Lam. [*F. supina* Schur] Festuca supina. -. Fétuque fausse canche. -. PRAT. 1920-2900 m. cc. VII-VIII.
- Festuca airoides* subsp. *molinieri* (Litard) O. Bolos, Vigo, Masales, & Ninot [*F. ovina* L. subsp. *molinieri* (Litard.) O. Bolos & Vigo; *F. ovina* var. *molinieri* Litardiere; *F. niphobia* (St.-Yves) Kerguelen] Citada a prop, caldria comprovar la seva presència.
- Festuca alpina* Suter [*F. ovina* subsp. *alpina* (Suter) Hack.; *F. alpina* subsp. *riverae* Chas, Kerguelen & Plonka] -. -. -. ROC(ca). 2200-2350 m. rrr. VII.
- Festuca aragonensis* (Willk.) Fuente & Ortunez [*F. indigesta* subsp. *aragonensis* (Willk.) Kerguelen; *F. ovina* var. *aragonensis* (Willk.) O. Bolos & Vigo, *F. indigesta* var. *aragonensis* Willk.] PRAT(r). PRAT(r). 2050 m. r. VIII.
- Festuca borderei* (Hack.) Hack. [*F. ovina* subsp. *borderei* Hack.] -. -. -. PRAT(r). 2800 m. rrr. VII.
- Festuca eskia* Ramond ex DC. in Lam. et DC. Gesp. Festuca pirenaica. Fétuque eskia -. PRAT(s). 1700-2700 m. ccc. VII-VIII.
- Festuca gautieri* (Hackel) K. Richter [*F. scoparia* A. Kerner ex Nyman] Ussona. Festuca erizo. Fétuque de Gautier. -. PRAT(s). 1200-2700 m. ccc. VII-VIII.
- Festuca gigantea* (L.) Vill. Festuca gegantina. Festuca gigante. Fétuque géante. -. BOSC(r). 1240 m. rrr. VII.
- Festuca glacialis* (Miégev. ex Hack.) K. Richter Festuca glacial. -. Fétuque des glaciers. -. ROC(t). 2000-2800 m. c. VIII.
- Festuca halleri* All. [*F. ovina* subsp. *halleri* (All.) Bonnier & Layens]. Citada a prop, comprovar.
- Festuca heterophylla* Lam. subsp. *heterophylla* [*F. rubra* subsp. *heterophylla* (Lam.) Hack.] Festuca heterofil·la. Festuca atlántica. Fétuque à feuilles variables. -. BOSC(h). 1460-1600 m. rr. VII.
- Festuca lambinonii* Kerguelen [*F. arvernensis* subsp. *costei* auct., non *F. costei* (St.-Yves) Markgr.-Dann; *F. hervieri* Patzke var. *costei* (St. Yves) Auquier] Festuca arvenica. -. Fétuque de coste. -. PRAT(s,r)/ROC(r,t). 1450-2000 m. c. VII.
- Festuca liviensis* (Verg.) Markgr.-Dann. [*F. ovina* subsp. *liviensis* (Verg.) O. Bolos, Masalles & Vigo] Festuca duriúscula. -. -. -. PRAT(s). 1230-2200 m. cc. VI-VII.
- Festuca marginata* (Hack.) K. Richter subsp. *marginata* [*F. timbalii* (Hack.) Kerguelen; *F. hervieri* (St.-Yves) Patzke] -. -. -. PRAT/MAT (s)/ROC. 1420-2100 m. c. VII-VIII.
- Festuca nevadensis* (Hack.) Markgr.-Dannenb. (*F. rubra* subsp. *nevadensis* Hackel) PRAT(s,r). 1400-2500 m. Ribes
- Festuca nigrescens* Lam. [*F. rubra* subsp. *commutata* (Gaudin) Markgr.-Dann.; *F. microphylla* (St.-Yves) Patzke] Festuca rogenca. Festuca oscura. Fétuque noirâtre. -. PRAT(h). 1220-2200 m. cc. VI-VII.
- Festuca pratensis* Hudson (*F. elatior* L. subsp. *pratensis* (Hudson) Hackel) Festuca pratense. Festuca de prado. Fétuque des prés. -. PRAT(h). 1240-1480 m. c. VI-VII.
- Festuca rivularis* Boiss. [*F. rubra* subsp. *rivularis* (Boiss.) O. Bolos, Masalles & Vigo] -. Festuca granadina. -. -. PRAT(h)/AQUA(m,f). 1600-1980 m. rr. VIII.
- Festuca rubra* L. subsp. *rubra*. Pèl de guilla. Festuca rojiza. Fétuque rouge. PRAT(h)/AIGUA(m). 1400-2100 m. rr. VII.

- Festuca rubra* subsp. *juncea* (Hack.) K. Richt. -. -. -. PRAT(r). 2200-2420 m. rr. VII-VIII.
- Festuca yvesii* Sen. et Pau [*F. durissima* (Hack.) Kerg., *F. duriuscula* L. subsp. *durissima* (Hack.) K. Richter, *F. ovina* L. var. *duriuscula* (L.) Koch subvar. *durissima* Hack., *F. ovina* L. subsp. *indigesta* (Boiss.) Hack. var. *durissima* (Hack.) St. Yves] *Festuca durissima*. -. Fétuque très dure. -. PRAT(s,c). 1700-2700 m. c. VII.
- Festuca varia* Haenke Citada a prop.
- Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv. Citada a prop.
- Glyceria notata* Chevall. [*G. plicata* (Fr.) Fr.; *G. fluitans* subsp. *plicata* (Fr.) St.-Lag.] Glicèria. -. Glycèrie plissée. Plicate sweet-grass. AQUA(cr). 1220-1810 m. c. VI-VII.
- Helictochloa pratensis* subsp. *amethystea* (Braun-Blanq.) Romero Zarco [*Avena pratensis* subsp. *amethystea* Braun-Blanq.; *Helictochloa pratensis* subsp. *requienii* (Mutel) H. Scholz; *Avenula pratensis* subsp. *requienii* (Mutel) Romero Zarco] Citada a prop.
- Helictochloa pratensis* subsp. *iberica* (St.-Yves) Romero Zarco [*Avenula pratensis* subsp. *iberica* (St.-Yves) O. Bolos & Vigo; *A. mirandana* (Sennen) Holub] *Avena*. -. Avoine ibérique. -. PRAT(s). 1200-1700 m. r. VI-VII.
- Helictochloa pratensis* (L.) Romero Zarco subsp. *pratensis* [*Avenula pratensis* (L.) Dumort. subsp. *pratensis*; *Avenula pratensis* (L.) Dumort.; *Avenochloa pratensis* (L.) Holub] *Avènula pratense*. *Avènula de prado*. Avoine des prés. -. 1240-2100 m. c. VII-VIII.
- Helictochloa versicolor* (Vill.) Romero Zarco subsp. *versicolor* [*Avenula versicolor* (Vill.) M. Lainz subsp. *versicolor*] *Avènula bigarrada*. -. Avoine bigarrée. -. PRAT/MAT(c) (ac). 2100-2680 m. r. VII-VIII.
- Helictotrichon sedenense* (DC.) Holub subsp. *sedenense* [*Avena sedenensis* Clarion ex DC., *A. montana* Vill.] *Avena montana*. -. Avoine des montagnes. PRAT(s,r)/ROC(t). 1780-2720 m. cc. V-VII.
- Holcus lanatus* L. Herba molla. Heno velloso. Houlque laineuse/Houque laineuse. Common velvet grass. PRAT(h)/HERB(h)/AQUA(m,j). 1200-2000 m. ccc. VI-VII.
- Holcus mollis* L. *Holcus* fi. Heno blanco. Houlque molle. Creeping Soft-grass. BOSC/HERB(v) (ac). 1250-1560 m. rr. VI-VII.
- Hordelymus europaeus* (L.) Harz Citat amb dubtes.
- Hordeum murinum* L. subsp. *murinum* Ordi de Sant Joan. Cebada de ratón. Orge des rats. False barley. RUD(t). 1200-1680 m. cc. VI-VIII.
- K. macrantha* (Ledeb.) Schult. Les cites corresponen a *K. pyramidata* (Quintanar & Castroviejo, 2013).
- Koeleria pyramidata* (Lam.) P. Beauv. subsp. *pyramidata* [incl. *K. macrantha* (Ledeb.) Schult.] -. *Koeleria ramosa*. *Koelerie pyramidale*. Prairie June grass. PRAT. 1260-2340 m. cc. VI-VIII.
- Koeleria splendens* C. Presl Les cites corresponen a *K. pyramidata* (Quintanar & Castroviejo, 2013).
- Koeleria vallesiana* (Honck.) Gaudin Gram de gos. *Koeleria* común. *Koelerie du Valais*. -. PRAT(r,s)/ROC(r). 1200-2500 m. ccc.
- Lolium multiflorum* Lam. [*L. multiflorum* subsp. *italicum* Schinz & R. Keller] Raigràs italià. -. -. -. ARV/RUD(t). 1240-1280 m. rr. VI
- Lolium perenne* L. Margall. Ballico. Ivraie vivace. Perennial ryegrass. RUD(t). 1200-2000 m. ccc. VI-VII.
- Lolium rigidum* Gaudin subsp. *rigidum* Margall dret. Ballico. Ivraie raide. Annual ryegrass. ARV/RUD(t). 1250 m. rr. VI.
- Lolium temulentum* L. [*L. temulentum* subsp. *arvense* (With.) Tzvelev] ARV. 1460 m. rrr. VII.
- Melica ciliata* L. subsp. *ciliata* Serrell de muntanya. Mélica pelosa. Mélique ciliée. -. PRAT(s,r)/ROC(t). 1200-1500 m. rr. VI-VII.
- Melica uniflora* Retz Mélica uniflora. Mélica de bosque. Mélique à une fleur. Wood melick. BOSC(h). 1320-1510 m. rr. VI-VII.
- Micropyrum tenellum* (L.) Link -. -. Petit nard délicat. -. PRAT/ROC(t,r,ac). 1900 m. rrr. VI.
- Molinia caerulea* (L.) Moench Alba roja. *Molinia*. *Molinie bleue*. Purple moor-grass. PRAT/AQUA(m,j,h). 1200-2000 m. ccc. VI-IX.
- Nardus stricta* L. Pèl caní. Cervuno. Nard raide. Matgrass. PRAT/AQUA(f,m). 1550-2640 m. cc. VI-VII.

- Oreochloa elegans*** Sennen [*O. blanka* Deyl; *O. disticha* subsp. *blanka* (Deyl) P. Kupfer] Oreòcloa. -. Oréochloa élégant. -. PRAT(r)/ROC. 2480-2780 m. rr. VII-VIII.
- Panicum miliaceum* L. subsp. *miliaceum* Mill. Mijo. Mil d'inde. Common Millet. ARV/RUD. 1250-1290 m- rrr. VIII. AL/SUB.
- Patzkea paniculata*** (L.) G.H. Loos
subsp. ***paniculata*** [*Festuca paniculata* (L.) Schinz et Thell. subsp. *paniculata*; *F. spadicea* L.] Sudorn. Festuca paniculada. Fétuque paniculée. -. PRAT(s). 1600-2400 m. c. VI-VII.
subsp. ***spadicea*** (L.) G.H. Loos [*Festuca paniculata* subsp. *spadicea* (L.) Litard.; *F. consobrina* Timb.-Lagr., *F. paniculata* var. *fallax* (Loret et Barr.) Litard.] Sudorn. -. Fétuque châtain. PRAT(r,ca). 1475- 1975 m. rrr. VII.
- Phalaris arundinacea*** L. Fàlaris. Garzota de arroyos. Baldingère faux roseau. Reed canary grass. AQUA(b,h). 1220-1370 m. c. VI-VII.
- Phleum alpinum*** L. subsp. ***alpinum*** [*P. commutatum* Gaud.] Flèum alpi. Fleo alpino. Fléole des Alpes. Alpine cat's-tail. AQUA(m)/PRAT(h). 1620-2600 m. c. VI-VIII.
- Phleum alpinum*** L. subsp. ***rhaeticum*** C.J. Humphries [*P. alpinum* auct. non L.] . -. -. -. PRAT(h). 2200-2400 m. rrr. VII.
- Phleum phleoides*** (L.) Karsten Cua de rata. Fleo alargado. Fléole de Boehmer. Boehmer's cat's-tail. PRAT. 1200-1800 m. c. VI-VIII.
- Phleum pratense*** L. subsp. ***pratense*** Flèum de prat. Fleo de Prado. Fléole des prés/Fléole bulbeuse. Timothy. PRAT(h). 1200-1800 m. cc. VI-VIII.
- Poa alpina*** L. Poa alpina. Poa alpina. Pâturin des Alpes. Alpine meadow-grass. PRAT(h). 1300-2600 m. cc. VI-VIII.
- Poa annua*** L. subsp. ***annua*** Pèl de bou. Espiguilla. Pâturin annuel. Annual bluegrass. RUD. 1200-1670 m. ccc. V-VII.
- Poa cenisia*** All. [*P. cenisia* subsp. *sardoa* Schmid; *P. fontqueri* Braun-Blanq.; *P. distichophylla* Gaud.] -. Poa cenisia. Pâturin du mont Cenis. -. ROC(t). 2000-2800 m. c. VII-VIII.
- Poa chaixii*** Vill. -. Poa de montaña. Pâturin de chaix. -. PRAT(ac). 1700-2500 m. r. VII-VIII.
- Poa compressa*** L. -. -. -. -. PRAT(s,a). 1230-1620 m. r. VI-VII.
- Poa laxa*** Haenke subsp. ***laxa*** Poa laxa. -. -. -. ROC(t,r,ac). 2400-2700 m. VII-VIII.
- Poa nemoralis*** L. [*P. debilis* Thuill.] Espigueta de bosc. -. Pâturin des bois. Wood bluegrass.
var. ***nemoralis*** BOSC(h). 1200-1800. ccc. VI-VII.
var. ***firmula*** Gaudin. BOSC(h). 1240 m. rrr. VI.
var. ***glauantha*** (Gaudin) Reichenb. et Reichehn. F. RO(r,m). 1280 i 2450 m. c. VII-VIII.
- Poa pratensis*** L. subsp. ***pratensis*** [*P. pratensis* var. *angustifolia* (L.) Sm.; *P. angustifolia* L.; *P. pratensis* subsp. *angustifolia* (L.) Dumort.] -. Poa de Prado. Pâturin des prés. Kentucky bluegrass. PRAT/RUD(t). 1200-2120 m. ccc. V-VIII.
- Poa supina*** Schrader [*P. annua* subsp. *varia* Gaudin; *P. annua* subsp. *supina* (Schrader) Link] Poa supina. -. -. -. RUD(t). 1600-2100 m. c. VI-VIII.
- Poa trivialis*** L. subsp. ***trivialis*** -. Poa común. Pâturin commun. Rough meadow-grass. PRAT(h)/AQUA(j)/RUD(h). 1200- 2100 m. ccc. VI-VIII.
- ×***Schedololium loliaceum*** (Huds.) Holub [*Schedonorus pratensis* × *Lolium perenne*; *Festuca* × *loliacea* Huds.; ×*Festulolium loliaceum* (Huds.) P. Fourm.; *Festulolium* × *ascendens* Asch. & Graebn.] RUD(t). 1250 m. rrr. VII.
- Schedonorus arundinaceus*** (Schreb.) Dumort. subsp. ***arundinaceus*** [*Festuca arundinacea* Schreb.; *F. elatior* L. subsp. *arundinacea* (Schreb.) Hackel] Festuca arundinàcia. Festuca carrizo. Fétuque faux roseau. -. PRAT(t)/RUD(t). 1220-2020 m. ccc. VI-VIII.
- Sesleria caerulea*** (L.) Ard. [*S. albicans* Schult.; *S. coerulea* (L.) Ard. subsp. *calcareae* (Eelak) Hegi; *S. calcarea* (Pers.) Opiz; *S. varia* (Jacq.) Wettst.] Sèsleria. -. Sèslerie bleue. Blue moor grass. PRAT/BOSC(r) (ca). 1250-2200 m. cc. V-VII.
- Setaria viridis*** (L.) P. Beauv. Serreig verd. Almorejo. Sétaire verte. Green bristle grass. ARV/RUD. 1200-1980 m. c. VII-IX. AL/ESP.
- Sporobolus indicus*** (L.) R. Br. [*S. poiiretti* (Roem. et Schultes) Hitchc.] Cua de rata. Sporobolo. Sporobole tenace. -. RUD(t). 1240-1360 m. rr. VIII-IX. AL/SUB.

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. subsp. *flavescens* [*Trisetaria flavescens* (L.) Maire] Fromental petit. Trisetaria dorada. Avoine dorée. Smut grass. PRAT(h). 1230-1810 m. c. VI-VII.
Vulpia ciliata Dumort. subsp. *ciliata* -. - . Vulpie ciliée. Bearded fescue. PRAT(r). 1240 m. rrr. VI.
Vulpia myuros L.) C.C. Gmel. Cua de guilla, pèl de boc. Vulpia fina. Vulpie queue-de-rat. Annual fescue.
subsp. *myuros* [*V. megalura* (Nutt.) Rydb.] PRAT(a). 1240-1360 m. r. VI-VIII. rr.
subsp. *sciuroides* (Roth) Rouy [incl. *V. bromoides* (L.) Gray; *V. muralis* (Kunth) Nees] PRAT(a). 1220 m. rrr. VI.

Sparganiaceae

Sparganium erectum subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz. & Thell. Bova borda. Espadaña erizo. Rubanier dressé. Branched Bur-reed. AQUA(cr). 1230 m. rrr.VII.
Typha latifolia L. Balca de fulla ampla. Enea. Massette à larges feuilles. Broad-leaved cat-tail. AQUA(cr). 1230 m. rrr. VI.

Tofieldiaceae

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. Tofièldia. -. Tofieldie calyculée. -. AQUA(m,j). 1630-1980 m. rr. VI-VII.

AGRAÏMENTS

En Miquel Àngel Marcer ha aportat informació inèdita d'alguns tàxons d'aquesta llista.

BILIOGRAFIA

- BOLÒS, O. & J. VIGO 1984.** Flora dels Països Catalans. Vol. 1. Ed. Barcino. Barcelona.
BOLÒS, O. & J. VIGO 1990. Flora dels Països Catalans. Vol. 2. Ed. Barcino. Barcelona.
BOLÒS, O. & J. VIGO 1996. Flora dels Països Catalans. Vol. 3. Ed. Barcino. Barcelona.
BOLÒS, O. & J. VIGO 2001. Flora dels Països Catalans. Vol. 4. Ed. Barcino. Barcelona.
BOLÒS, O.; VIGO, J.; MASALLES, R.M. & NINOT, J.M. 2005. Flora Manual dels Països Catalans. Ed. 3. Edicions 62. Barcelona.
BRAUN-BLANQUET, J. 1945. Notes critiques sur la Flore des Pyrénées Orientales. *Com. SIGMA*, 87: 219-236.
BRAUN-BLANQUET, J. 1948. La végétation alpine des Pyrénées orientales. Mon. Estac. Est. Pir. & Inst. Esp. Edaf. Ecol. Fisiol. *Veg.* 9. Barcelona.
BUBANI, P. 1987-1902. Flora pyrenaea per ordines naturales gtadatim digesta.
CANALS, J.; GONZÀLEZ-PRAT, F. & HERNÁNDEZ, J. 2016. Orquídiés del Ripollès. Institució Catalana d'Història Natural.
CASANOVAS I POCH, L. 1991. Estudi sobre l'estructura i l'ecologia de les molleres pirinenques.; Tesi Doctoral. Inèdit.
CADEVALL, J. I COL-LABORADORS, 1913-1937. Flora de Catalunya, 6 vols. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.
COMPANYÓ, L. 1864. Histoire Naturelle du département des Pyréné~ Orientales. T. II. Règne végétal.
COSTA, A.C. 1864. Introducción a la flora de Cataluña. Imprenta del diario de Barcelona. Barcelona.
COSTA, A.C. 1877. Suplemento al Catálogo razonado de plantas fanerógamas de Cataluña. Imprenta Barcelonesa. Barcelona.
DEVESA, J.A.; CATALAN, P.; MULLER, J.; CEBOLLA, C. & E. ORTUNEZ 2013. Checklist de *Festuca* L. (*Poaceae*) en la Península Iberica. *Lagascalia* 33: 183-274.

- FOGGI, B., G. PAROLO, P. SMARDA, A. COPPI, L. LASTRUCCI, D. LAKUSIC, R. EASTWOOD & G. ROSSI 2012.** Revision of the *Festuca alpina* group (*Festuca* section *Festuca*, *Poaceae*) in Europe. *Bot. J. Linn. Soc.* 170: 618–639.
- FONT, X. 2021.** Mòdul Flora i Vegetació. Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya i Universitat de Barcelona. <http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html>
- GAUTIER, G. 1897.** Catalogue raisonné de la flore des Pyrénées-Orientales. Publication de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. Perpignan.
- GUARDIOLA BUFÍ, M. 2019.** *Herniaria alpina* (*Caryophyllaceae*) in the Iberian Peninsula. *Anales Jard. Bot. Madrid* 76.
- GUARDIOLA, M., M. ALABAU, X. OLIVER, J. CARRERAS & L. SÁEZ 2018.** Distribució i ecologia d'*Arenaria maschlinii* (*Caryophyllaceae*) als Pirineus. *Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.* 82: 167–170.
- LEWIN, J.M. 2017.** Contribution à la connaissance des orobanches du département des Pyrénées-Orientales; *Mycologie et Botanique*. Bulletin n° 32
- LEWIN, J.M. 2018.** Compléments à la connaissance de la flore des Pyrénées-Orientales (suite 2). *Mycol. Bot. Bull. Soc. Mycol. Bot. Catalogne Nord* 33: 46–52.
- LEWIN, J.M. 2020.** Nouvelles contributions à la flore des Pyrénées-Orientales - Observations 2019-2020. *Mycol. Bot. Bull. Soc. Mycol. Bot. Catalogne Nord* 35: 39–52.
- LEWIN, J.M. & J. M. TISON 2016.** Redécouverte de *Hieracium compositum* Lapeyr. *Mycol. Bot. Bull. Soc. Mycol. Bot. Catalogne Nord* 31: 59–62.
- MATEO, G. 2005.** Aportaciones al conocimiento del género *Hieracium* L. en España, X. Novedades para el Pirineo Catalán. *Fl. Montiberica* 31: 62–69.
- MATEO, G. 2006A.** Aportaciones al conocimiento del género *Pilosella* en España, VII. *Fl. Montiberica* 32: 51–71.
- MATEO, G. 2006B.** Revisión sintética del género *Hieracium* L. en España, I. Secciones *Amplexicaulia* y *Lanata*. *Fl. Montiberica* 34: 10–24.
- MATEO, G. 2007A.** Revisión sintética del género *Hieracium* L. en España, III. Secciones *Oreadea* y *Hieracium*. *Fl. Montiberica* 35: 60–76.
- MATEO, G. 2007B.** Revisión sintética del género *Hieracium* L. en España, IV. Sect. *Prenanthoidea*, *Glutinosa*, *Barbarta*, *Intybacea*, *Italica* y *Eriophora*. *Fl. Montiberica* 37: 47–62.
- MATEO, G. 2008.** Revisión sintética del género *Hieracium* L. en España, V. Sect. *Cerinthoidea*. *Fl. Montiberica* 38: 25–71.
- MATEO, G. & F. EGIDO 2017A.** Novedades sobre el género *Pilosella* Hill en España, IV. *Fl. Montiberica* 66: 145–153.
- MATEO, G. & F. EJIDO 2017.** Estudio monográfico sobre los géneros *Hieracium* y *Pilosella* en España. Con referencias a Portugal y los Pirineos franceses. *Fl. Montiberica Monogr.* 20: 1–422.
- NÈGRE, R., BAUDIERE, A. & SERVE, L. 1982.** Approche analytique sur les groupements à *Festuca paniculata* est-pyrénéens. *Doc. Phytosoc.* 6: 443–475.
- NÈGRE, R. & SERVE, L. 1979.** Prospection dans les groupements à *Festuca eskia* en Pyrénées Orientales.; *Doc. Phytosoc.*, IV: 731-756.
- OLIVER 2021.** Catàleg d'hàbitats de la Garrotxa i del Ripollès, 2021. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural. Inèdit.
- OLIVER 2021.** Programa de Seguiment i de Conservació de la Flora amenaçada de la Garrotxa i del Ripollès, 2021. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural. Inèdit.
- OLIVER 2021.** Programa de Seguiment i de Conservació dels hàbitats de la Garrotxa i del Ripollès, 2021. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural. Inèdit.
- OLIVER 2013; 2017; 2021.** Llista vermella de la flora vascular del Ripollès, 2013, 2017, 2021. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural. Inèdit.

- SÁEZ, L. 1997.** Atlas pteridològic de Catalunya i Andorra. *Acta Bot. Barcinon.* 44: 39-167.
- SÁEZ, L. 2000.** El complex d'*Asplenium trichomanes* L. (*Aspleniaceae*) al nord-est de la península Ibèrica. *Orsis* 15: 27-43.
- SÁEZ, L., AYMERICH, P. & C. BLANCHÉ 2010.** Llibre Vermell de les plantes vasculares endèmiques i amenaçades de Catalunya. Argania Editio. Barcelona.
- SÁEZ, L. & MATEO, G. 2016.** The genus *Hieracium* (*Asteraceae*) in Catalonia (northeastern Iberian Peninsula, Spain). *Fl. Montiberica* 65: 88-121.
- SÁEZ, L. & AYMERICH, P. 2021.** An annotated Checklist of the Vascular Plants of Catalonia (northeastern Iberian Peninsula). <https://bibdigital.rjb.csic.es/>.
- SUSPLUGAS, J. 1942.** Le sol et la végétation dans le haut Vallespir. *Com. SIGMA*, 80.
- TELA BOTANICA, 2021.** <https://www.tela-botanica.org/>.
- THOUVENOT, L. 1999.** Catalogue des types de stations forestières du Vallespir. Tome 1: Caractères écologiques régionaux et relevés types.; DDAF. Pyrénées-Orientales,
- VAYREDA, E. 1879.** Plantas notables por su utilidad o rareza que crecen espontáneamente en Cataluña. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 8: 345-462.
- VAYREDA, E. 1880.** Plantas notables por su utilidad o rareza que crecen espontáneamente en Cataluña. Segunda parte. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 9: 53-130.
- VAYREDA, E. 1882.** Nuevos apuntes para la flora catalana. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 11: 41-151.
- VAYREDA, E. 1902.** Plantas de Cataluña. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 30: 491-582.
- VAYREDA, E. 1882.** *Catalech de la flora de la Vall de Núria*. Kessinger Publishing.
- VIGO, J. 1983.** Flora de la vall de Ribes. I. Generalitats. Catàleg florístic. *Acta Bot. Barcinon.* 35: 1-793.