
Catàleg sintètic de flora vascular de Setcases (El Ripollès, Catalunya)

Catàlegs vius

Delegació de la Garrotxa
de la
Institució Catalana
d'Història Natural

2023

Catàleg sintètic de flora vascular del municipi de Setcases (El Ripollès, Catalunya), 2023

XAVIER OLIVER

xevioliver@gmail.com

Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural

Rebut: 19.11.2023

Acceptat: 30.12.2023

RESUM

Es presenta la llista de plantes vasculars del municipi de Setcases (El Ripollès, Catalunya) (nord-est de la península Ibèrica) en base a les referències publicades existents i el treball de camp dels últims 40 anys de l'autor. La llista consta de 1366 tàxons dels quals 1273 són autòctons, 22 híbrids, i 69 al·lòctons. D'aquests al·lòctons, 19 són invasors del medi natural, 35 són tàxons espontanis naturalitzats en ambients condicionats per l'acció humana i 15 accidentals, amb poblacions poc viables.

Es comenta per a cada tàxon els sinònims habituals, els noms comuns en català, castellà, francès i anglès. Els ambients on normalment es troben, el desnivell altitudinal, la seva raretat i fenologia.

La flora vascular detectada al municipi representa el 39,45% de la flora vascular detectada a Catalunya, el 37,38% dels tàxons controlats als Pirineus i el 64,24 la flora de la comarca del Ripollès.

Paraules clau: Setcases, Catalunya, flora vascular, catàleg.

ABSTRACT

The list of vascular plants of the municipality of Setcases (El Ripollès, Catalonia) is presented (northeast of the Iberian Peninsula) based on existing published references and the author's fieldwork of the last 40 years. The list consists of 1366 taxa of which 1272 are autochthonous, 22 hybrid, and 69 allochthonous. Of these allochthons, 19 are invaders of the natural environment, 35 are spontaneous taxa naturalized in environments conditioned by human action and 15 accidental, with populations that are not very viable. The environments where they are normally found, the altitudinal difference, their rarity and phenology.

The vascular flora detected in the municipality represents 39,45% of the vascular flora detected in Catalonia, 37.38% of the taxa monitored in the Pyrenees and 64.24% of the flora of the Ripollès region.

Keywords: Setcases, Catalonia, vascular flora, checklist.

INTRODUCCIÓ

Setcases és un municipi de la comarca del Ripollès, província de Girona, de 49,1 km² de superfície amb 181 habitants (IDESCAT, 2006) i que limita al nord amb França, i en ple Pirineu oriental.

El municipi presenta un relleu muntanyós amb un desnivell important des dels 1200 fins als 2881 m (Pic de Bastiments) amb nombrosos cims de més de 2500 m, i on podem diferenciar tres estatges altitudinals amb un clima i una vegetació ben diferenciada:

- Estatge montà, entre 1.200 i 1.600(1.800) m, amb una vegetació medioeuropea amb un domini dels boscos caducifolis (rouredes de roure de fulla gran, fagedes, freixenedes, bedollars i boscos de ribera), prats montans i conreus.
- Estatge subalpí, entre 1.600 (1.800) i 2.300 m, amb una vegetació similar a la taigà del nord d'Europa i als estatges subalpins de les muntanyes alpines del continent, amb boscos de pi roig, de pi negre, i d'avets, matollars de neret, ginebró i bàlec, i prats.
- Estatge alpí, per sobre dels 2.200 (2.400) m, amb una vegetació només formada per prats, tarteres i rocams, amb plantes molt especialitzades en les condicions climàtiques existents, relacionades sovint amb plantes dels estatges alpins de les serralades europees i la tundra àrtica.




Figura 1. Àmbit de territori objecte del catàleg (municipi de Setcases).

METODOLOGIA

El llistat comentat de la flora vascular de Setcases s'ha elaborat a partir de les referències publicades i de la feina de camp realitzada per l'autor en els últims 40 anys.

Les referències més utilitzades són per una banda obres sintètiques (Cadevall, 1913-1937; Bolòs & Vigo, 1984-2001; Bolòs et al., 2005; Sáez & Aymerich, 2021 i Font, 2021) i per altra articles de diferents autors que han estudiat la zona (Companyó, 1864; Gautier, 1989; Bubani, 1897-1902 Vayreda, 1880-1931; Sennen 1913-34; Susplugas, 1942; Braum-Blanquet, 1945-1948, Vigo, 1983), i finalment articles de citacions puntuals o revisions taxonòmiques.

En general, en totes aquestes obres, la majoria realitzades ja fa anys, les citacions són poc precises, de manera que és difícil determinar la ubicació concreta per retrobar la localitat i en molts casos fins i tot no es pot saber si la citació és a dins de l'àmbit de l'estudi. Un exemple són les citacions del Costabona realitzades per Companyó i Vayreda. No es consideren espècies presents aquelles que han estat citades però la localitat o referència utilitzada no assegura que sigui dins de l'àmbit d'estudi. En els casos d'espècies que no han aparegut en els nostres treballs les hem fet constar com a espècies citades a prop.

També s'indiquen tàxons citats però que actualment es té dubtes de la seva correcta determinació, així com tàxons citats al territori que clarament han estat indicats per error.

El treball de camp correspon a diversos projectes de recerca desenvolupats a l'àmbit del catàleg, entre ells l'elaboració del catàleg de flora vascular de la comarca del Ripollès (Oliver, 2021), de les llistes vermelles de la flora vascular del Ripollès (Oliver 2013, 2017, 2021), del catàleg d'hàbitats de la Garrotxa i del Ripollès (Oliver, 2021), i dels programes de seguiments d'espècies amenaçades, i d'hàbitats (Oliver, 2021).

RESULTATS

El catàleg consta de 1365 tàxons amb presència al municipi, dels quals 1273 són autòctons - 22 corresponen a híbrids -.

68 tàxons al·lòctons, dels quals 15 tàxons es consideren accidentals, amb poblacions poc viables, 34 tàxons subespontanis que mantenen poblacions en llocs amb una pressió antròpica important, i 19 espontanis, invasors del hàbitats seminaturals i naturals del municipi.

En el catàleg no només es citen els tàxons presents a l'àmbit del municipi de Setcases, en total s'esmenten 1456 tàxons, alguns d'ells amb dubtes de determinació o de localització a dins de l'àmbit de l'estudi (18), altres considerats com a errors (76).

19 tàxons són espècies protegides, i 6 espècies considerades amenaçades (Aymerich & Sáez, 2021): 5 En Perill (EN) i 3 Vulnerables (VU), i 8 Quasi Amenaçades (NT). De tàxons desapareguts a l'espai n'hi ha 4.




Figura 2. Proporció de tàxons autòctons, híbrids i tàxons al·lòctons en el catàleg,




Figura 3. Proporció de tàxons al·lòctons subespontanis accidentals, al·lòctons espontanis que només colonitzen ambients molt pertorbats per l'acció antròpica, i al·lòctons espontanis invasors d'ambients naturals.

EL CATALEG

Els tàxons s'han ordenat en grans grups:

Al Parc Natural han desaparegut (EX-RE) 4 tàxons: *Lycopodium alpinum*, *Gentiana pneumonanthe*, *Dryopteris mindshelkensis*, i *D. remota*.

- Els Pteridòfits.
- Les Gimnospermes.
- Les Angiospermes:
 - * Les dicotiledònies.
 - * Les monocotiledònies.

Dins de cada grup, per facilitar la consulta i cerca, les famílies s'han ordenat alfabèticament, i els tàxons també:

- Autòctons en negreta.
- Al·lòctons amb poblacions naturalitzades viables (espontànies), al·lòctons adventicis (subespontanis, aquells escapats però amb poblacions no viables) sense negreta.
- Citats a l'espai protegit però no confirmats, a prop dels límits o citats erròniament, en lletra més petita i en gris.

De cada tàxon del cataleg es detalla:

1. NOM CIENTÍFIC, en general se segueix Sáez & Aymerich, 2019.
2. SINÒNIMS utilitzats normalment o en referències utilitzades [entre claudàtors].
3. Els HÀBITATS principals de cada tàxon:
 - BOSC boscos: (cad) caducifolis, (per) perennifolis, (h) humits, (s) secs, (br) boscos de ribera.
 - MAT matollars: (b) bardisses, (n) de neret, (g) de gòdua, (bg) de bàlec i ginebró.
 - HERB herbassars: (h) humits, (s) secs, (m) megafòrbies, vorades (v).
 - AQUA aquàtiques: (j) jonqueres, (f) fontinals (rierols), (cr) creixenars, (m) mulleres, (c) congestes, (b) basses, (t) torrents.
 - PRAT: prats (h) humits i de dall, (s) prats secs, (a) anuals, sòls primis, sobre roques amb poc sòl.
 - ROC: ambients rupícoles (m) murs, (r) rocams, (t) tarteres i (c) codolars.
 - RUD: ambients ruderals (h) humits, (s) secs, (t) trepitjats.
 - ARV: arvenses (camps, conreus i horts).
 Els hàbitats, poden anar acompañats a més de (si) substrats silicis, (ca) substrats calcaris, i (ac) substrats àcids, (r) substrats rocallosos.
4. ALTITUD, amb l'interval altitudinal on s'ha detectat.
5. ABUNDÀNCIA, entre rrr (raríssim amb molt poques localitats) fins a ccc (molt abundant per tot arreu).
6. FENOLOGIA, interval de mesos on s'ha detectat floració (I-XII).
7. Altres comentaris d'interès:
 - Grau d'amenaça UICN a Catalunya (Aymerich & Saez 2021): amenaçada AME/ i NT Quasi amenaçada, VU Vulnerable, EN En Perill, CR en Perill Crític, i extingida al Parc Natural EX-RE.
 - Protegida (Generalitat de Catalunya 2023): PROT.
 - Al·lòctona AL/: subespontània amb exemplars escapats puntualment AC, espontània d'ambients antropitzats ESP i espontània invasora d'ambients naturals i seminaturals INV. En alguns casos s'indica ER, quan s'han eliminat els exemplars detectats.
 - No retrobat NO RETR. quan no s'ha retrobat des de fa dècades.
 - Tàxons citats no considerats: error ERROR, dubte per localització imprecisa DUBT. LOC, dubte de determinació DUBT.DET.

Divisió PTERIDOFITA

Classe Equisetatae

Equisetaceae

- Equisetum arvense* L. Cua de cavall. Cola de caballo. Prêle des champs. Common horsetail. AQU/ARV. 1200-1680 m. rr. III-V.
- Equisetum hyemale* L. Cua de cavall. Rabo de raposo. Prêle d'hiver. Dutch rush. BOSC(br)/AQU(h). 1230 m. rrr. VI.
- Equisetum palustre* L. Cua de cavall. Cola de caballo. Prêle des marais. Marsh horsetail. BOSC(br)/AQU. 1250-1350 m. rrr. V-VI.
- Equisetum ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum* Cua de cavall. Cola de caballo. Prêle rameuse. Branched horsetail. ROC(m). 1300 m. rrr. IV-V.
- Equisetum telmateia* Ehrh. Cua de cavall. Cola de caballo. Grande Prêl. Great Horsetail. HERB(h). 1220-1350 m. rrr. V.
- Equisetum xmoorei* Newman BOSC(br). 1230-1550 m rrr. VI.

Classe Filicates

Lycopodiaceae

- Huperzia selago* (L.) Schrank & C.F.P. Mart. [*Lycopodium selago* L.] - - . Lycopode sélagine. Northern firmoss. BOSC/MAT(ac). 1500-2600 m. rr. VII-IX.

Selaginellaceae

- Selaginella selaginoides* (L.) Schrank & C.F.P. Mart. Licopodi comú. Licopódio selago. Sélaginelle spinuleuse. Lesser clubmoss. AQU(m,f). 1450-2350 m. rr. VI-IX.

Classe Lycopodiatae

Aspleniaceae

- Asplenium adiantum-nigrum* L. [A. *adiantum-nigrum* subsp. *adiantum-nigrum*] Falzia negra. Culantrillo negro. Falzia negra. Doradille noire/Capillaire noir. Black spleenwort BOSC/ROC. 1200-2240 m. c. VI-VIII.
- Asplenium fontanum* (L.) Bernh. subsp. *fontanum* Falguereta de cingle. Culantrillo blanco menor. Asplénium des fontaines. - . ROC(h). 1100-1500 m. rr. V-XI. 1200-1500 m. cc.
- Asplenium quadrivalens* (D.E.Meyer) Landolt [A. *trichomanes* L. subsp. *quadrivalens* D.E. Meyer] Falzia roja. Culantrillo menor. Capillaire des murailles. Maidenhair spleenwort. ROC. 1200-1900 m. c. V-XI.
- Asplenium ruta-muraria* L. subsp. *ruta-muraria* Falzia blanca. Culantrillo blanco. Rue des murailles. Wallrue. ROC. 1200-1500 m. cc. IV-XI.
- Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. Falzia prima. Culantrillo del norte. Doradille du nord. Forked spleenwort. ROC. 1200-2500 m. cc. IV-IX.
- Asplenium trichomanes* L. Falzia roja. Culantrillo menor. Capillaire des murailles. Maidenhair spleenwort. ROC. 1200-2000 m. c. V-XI.
- Asplenium viride* Huds. [A. *trichomanes-ramosum* L.] Falzia verda. Culantrillo verde. Asplénium vert. Brightgreen spleenwort. ROC. 1200-2640 m. r. VII-IX.
- Asplenium ×alternifolium* Wulfen [A. *septentrionale* × A. *trichomanes*] ROC(m). 1200-1450 m. rrr. VI-VII.

Athyriaceae

Athyrium distentifolium Opiz BOSC(t)/ROC(t,h) 2100-2160 m. rrr.

Athyrium filix-femina (L.) Roth Falguera femella. Helecho hembra. Fougère femelle. Lady fern. BOSC/HERB(h). 1200-2500 m. cc. V-IX.

Blechnaceae

Struthiopteris spicant (L.) F.W. Weiss subsp. *spicant* [*Blechnum spicant* (L.) Roth subsp. *spicant*] Blècnum. Lonchite. Blechne. Deer fern. ROC(r,t). 1420-2180 m. r. VII-IX.

Cystopteridaceae

Cystopteris alpina (Lam.) Desv. [*Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. subsp. *alpina* (Lam.) Hartman] -. Helecho frágil. Capillaire blanc. -. ROC(r). 2530-2680 m. rrr. VII-VIII. AME/NT.

Cystopteris fragilis (L.) Schott subsp. *fragilis* (Fomin) O. Bolòs et J. Vigo Falguera fràgil. Helecho frágil. Capillaire blanc. -. ROC(r,m,t). 1200-2800 m. cc. VII-X.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman Gimnocarpi silicícola. Gimnocarpio glabro. Polypode dryoptère. -. BOSC(h), MAT(n)(si). 1540-2450 m. c. VII-X.

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman Gimnocarpi calcícola. Gimnocarpio glanduloso. Polypode de robert. -. ROC(t)(ca). 1600-2280 m. c. VII-IX.

Dennstaedtiaceae

Pteridium aquilinum (L.) Kunhn subsp. *aquilinum* Falguera, falguera comuna. Helecho común. Grande fougère. Bracken. BOSC/MAT/PRAT(h)(ac). 1200-1880 m. cc. VI-IX.

Dryopteridaceae

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. *affinis* [*D. pseudomas* (Wollaston) Holub & Pouzar] Falguera mascle. BOSC(h). 1220 m. rrr.

Dryopteris borreri (Newman) Oberh. & Tavel [*D. affinis* subsp. *borreri* (Newman) Fraser-Jenk.] Falguera mascle. Helecho macho. Fougère mâle. Male fern. BOSC(h). 1240-1450 m. rrr. V-X.

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs- Fougère-mâle des Chartreux. Spinulose Woodfern. BOSC. rrr. AME/NT.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray Falguera austriaca. -. Fougère dilatée. -. BOSC(h). 1400-2200 m. r. V-IX.

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy [*D. carthusiana* (Villar) H.P. Fuchs subsp. *assimilis* (Walker) O. Bolòs et al.; *Polystichum spinulosum* DC.] Drioptéride pálida. Dryoptéris élargi. -. BOSC(h). 1400-1525 m. rr. VII-IX.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott [*D. filix-mas* subsp. *filix-mas*] Falguera mascle. Helecho macho. Fougère mâle. Male fern. BOSC/HER(h,m). 1220-2000 m. cc. VI-IX.

Dryopteris mindshelkensis N. Pavl. [*D. submontana* (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk.; *D. villarii* subsp. *submontana* Fraser-Jenk. & Jermy] -Fougère-mâle submontagnarde. Limestone Wood-fern. BOS(ca). rrr. PROT. AME/VU. DUBT/LOC. EX-RE(s. XIX)?

Dryopteris oreades Fomin [*D. filix-mas* (L.) Schott subsp. *oreades* (Fomin) O. Bolòs et Vigo]. -. Helecho macho caucásico. -. -. ROC(t,r). 1720-2400 m. c. VIII-X.

Polystichum aculeatum (L.) Roth Falguera vera. Polístico comú. Polystic à aiguillons. Hard shield fern. ROC. 1340-1800 m. rr. VII-IX.

Polystichum lonchitis (L.) Roth Polístic pirinenc. Polístico de montaña. Polystic en fer de lance. -. ROC(t,r). 1500-2540 m. r. VIII-IX.

Polypodiaceae

Polypodium vulgare L. (*P. vulgare* subsp. *vulgare*) Polipodi. Polipodio. Polypode commun. Common polypodi. ROC(r,m)/BOSC(h). 1200-2450 m. c. VII-X.

Pteridaceae

Cryptogramma crispa (L.) R. Br. -. Alosuro. Cryptogramme crispée. -. ROC(t,si). 1780-2800 m. c. VII-VIII.

Thelypteridaceae

Phegopteris connectilis (Michaux) Watt [*Thelypteris phegopteris* (L.) Slosson; *Polypodium phegopteris* L.] -. -. Fougère-à-moustache Petite. Beech Fern. BOSC(h). rrr. VII-VIII.

Woodsiaceae

Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray -. -. Woodsie dels Alpes. -. ROC(r). 2050-2760 m. rr. VII-VIII. PROT. AME/NT..

Classe Psilotopsida

Ophioglossaceae

Ophioglossum vulgatum L. Llagues de crist. Lengua de serpiente. Ophioglosse commun. Adder's tongue. 1260 m. rrr. VI.

Botrychium lunaria (L.) Swartz Herba de les llunetes/Llunària. Lunaria. Botryche lunaire. Common moonwort. PRAT(h). 1320-2650 m. c. VI-IX.

Botrychium matricariifolium (Retz.) Koch -. -. Botryche à feuilles de camomille. Chamomile grape-fern. BOSC(h)(si). 1500 m. rrr. VI. PROT. AME/EN.

DIVISIÓ SPERMATOPHYTA

CLASSE GYMNOispermae

Cupressaceae

Juniperus communis L. subsp. *communis* (Suter) Celak. Ginebre. Enebro. Genévrier commun. Common juniper. BOSC/MAT/PRAT. 1200-1800 m. cc. VI-VIII.

Juniperus communis L. subsp. *nana* Syme [*J. communis* subsp. *alpina* (Suter) Celak] Ginebró. Enebro rastrero. Genévrier nain. -. BOSC/MAT/PRAT. 1600-2780 m. cc. VII-VIII.

Pinaceae

Abies alba Mill. Avet. Abeto. Sapin. Silver fir. BOSC(h). 1320-2000 m. c. V.

Larix ×marschlinsii Coaz BOSC. 1560 m. rrr. AL/AC.

Picea abies (L.) H. Karst. Pícea. Pícea. Norway spruce. 1400-1700 m. rr. AL/AC.

Pinus sylvestris L. Pi roig. Pino albar. Pin sylvestre. Scots pine. BOSC. 1200-1720 m. cc. V-VI.

Pinus uncinata DC. [*Pinus mugo* Turra subsp. *uncinata* (Ramond ex DC. in Lam. et DC.) Domin] Pi negre. Pino negro. Pin à crochets. Mountain pine. BOSC. 1400-2600 m. ccc. V-VI.

Pinus ×rhaetica Brügger [*P. sylvestris* x *P. uncinata*] 1450-1680 m. c.

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco Avet de Douglas. Abeto de Douglas. Douglas de Menzies. Douglas Fir. 1320-1480 m. rrr. AL/AC.

CLASSE ANGIOSPERMAE**SUBCLASSE DICOTILEDÒNIES*****Amarantaceae***

Amaranthus deflexus L. Amarant deflex. Bledo rastrero. Amarante couchée. Largefruit amaranth. RUD(t). 1200-1240 m. rr. VIII. AL/ESP.

Amaranthus hybridus L. Amarant. Amaranto. Amarante hybride. Green amaranth. ARV,RUD. 1200 m. rrr. VIII-IX. AL/ESP.

Amaranthus retroflexus L. Amarant. Amaranto. Amarante réfléchie. Common amaranth. RUD. 1200-1840 m. r. VIII-IX. AL/ESP.

Atriplex patula L. Salat de fulla estreta. Armuelle de hoja estrecha. Arroche étalée. Common orache. RUD. 1200-1540 m. rr. VII-IX.

Beta vulgaris L. Bleda. Acelga. Bette commune. Beet. RUD. 1200 m. rrr. AL/AC

Blitum bonus-henricus (L.) Rchb. [*Chenopodium bonus-henricus* L.] . Sarró, espinac de muntanya. Zurrón. Herbe du bon henri. Good-king-henry. RUD. 1200-2200 m. cc. VII-IX.

Chenopodiastrum hybridum (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch [*Chenopodium hybridum* L.] - . Chénopode à feuilles de stramoine. -. ARV/RUD. 1240 m. rrr.

Chenopodium album L. Blet. Berza perruna. Ansérine blanche. Fat hen. RUD(t). 1200-2100 m. cc. VII-VIII.

Chenopodium vulvaria L. Blet pudent. Sardinera. Chénopode fétide. Stinking goosefoot. RUD. 1240 m. rrr. VI.

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemans [*Chenopodium ambrosioides* L.] Te bord. Té de méxico. Chénopode fausse ambroisie. Wormseed. RUD. 1240 m. rrr. VII-VIII. AL/AC.

Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch [*Chenopodium polyspermum* L.] ARV(h). Blet polisperme. Cenizo polispermo. Chénopode à graines nombreuses. Manyseed goosefoot. 1200-1320 m. r. VII.

Apiaceae

Aegopodium podagraria L. - Pie de cabra. Podagraire. Wild masterwort. BOSC(br). 1200 m. rrr. VII. AME/NT.

Aethusa cynapium L. subsp. *cynapium* Julivertassa. Cicuta menor. Ciguë des jardins. Fool's parsley. RUD. 1200-1540 m. rr. VII.

Anethum foeniculum L. [*Foeniculum vulgare* Mill., *F. vulgare* subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.] Fonoll. Hinojo. Fenouil. Fennel. PRAT(s)/HERB(v). 1200-1460 m. c. VI-X.

Angelica sylvestris L. Angèlica. Angélica. Angélique des bois. Wild angelica. BOSC(br)/HERB(h)/AQUA. 1200-1900 m. c. VI-VIII.

Anthriscus sylvestris L. Cominassa. Cicutaria. Anthrisque sauvage. Cow parsley. PRAT(h)/HERB(m)/BOSC(br). 1200-2040 m. c. V-VII.

Astrantia major L. Astrància. Grande astrance. Great masterwort. HERB/PRAT(h). 1200-2010 m. cc. VI-VIII.

Astrantia minor L. Astrància menuda. Astrancia menor. Petite astrance. Lesser masterwort. MAT/HERB/PRAT. 1420-2300 m. c. VII-VIII.

Bupleurum ranunculoides L. Orella de llebre. Cuchilleja menor. Buplèvre à feuilles de graminée. Hare's-ear. PRAT(ca). 1460-1900 m. c. VII-VIII.

Carum carvi L. Comí.Comino. Cumin des prés. Caraway. PRAT/HERB(h). 1200-2000 m. c. VI-VIII.

Chaerophyllum aureum L. Cominassa. Cerefolio dorado. Cerfeuil d'or. Golden chervil. RUD. 1200-2060 m. ccc. VI-VIII.

Chaerophyllum hirsutum L. -. -. -. -. HERB(h)/AQUA(h,f)/BOSC(br). 1200-2200 m. ccc. VI-VII.

Chaerophyllum temulum L. BOSC(br)/HERB(c). 1220-1260 m. rr. VI-VII.

- Conium maculatum* L. Cicuta -. -. -. RUD(h). rrr. VII-VIII.
- Conopodium majus* (Gouan) Loret subsp. *majus* Anyol. Castañuela. Grand conopode. Earthnut. BOSC/MAT/PRAT(ac). 1200-2060 m. cc. VI-VIII.
- Coristospermum lucidum* (Mill.) Reduron, Charpin & Pimenov [*Ligusticum lucidum* Mill.] Turbit de muntanya. -. Ligistique des pyrénées. Southern lovage. ROC(t)/HERB(v). 1260-1870 m. r. VI-IX.
- Daucus carota* L. subsp. *carota* Pastanaga borda. Zanahoria silvestre. Carotte sauvage. Wild carrot. RUD/HERB/PRAT. ccc. VI-X.
- Endressia pyrenaica* (DC.) J. Gay PRAT(ac,h). 1600-2020 m. r. VII-VIII.
- Epikeros pyrenaeus* (L.) Raf [*Selinum pyrenaicum* (L.) Gouan] Selí pirinenc. Hinojo de prado. Sélin des Pyrénées. Pyrenean angelica. BOSC/MAT/PRAT (ac). 1350-2500 m. c. VII-VIII.
- Eryngium bourgatii* Gouan Espinacial/Panical blau. Cardo azul. Panicaut de bourgat. Field eryngo. PRAT. 1460-2550 m. ccc. VII-VIII.
- Eryngium campestre* L. Espinacial/Panical. Cardo corredor. Panicaut champêtre. Field eryngo. PRAT(s). 1200-1350 m. r. VI.
- Eryngium ×chevalieri* Sennen [*E. bourgatii* × *E. campestre*] PRAT. 1380 m. rrr.
- Helosciadium nodiflorum* (L.) W.D.J. Koch [*Apium nodiflorum* (L.) Lag.] Creixen bord. Berraza. Ache faux cresson. Wild celery. AQUA(cr). 1350 m. rr. VI-VIII.
- Heracleum pyrenaicum* Lam. [*Heracleum sphondylium* L. subsp. *pyrenaicum* (Lam.) Bonnier et Layens var. *pyrenaicum*] Pàmpola/Belleraca. Belleraca. Berce des Pyrénées. Pyrenean hogweed. PRAT/HERB(h). 1200-2250 m. cc. VI-VIII.
- Imperatoria ostruthium* L. [*Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch] Salsufragi. Peucédano alpino. Impératoire. Masterwort. HERB/AQUA(h). 1200-2340 m. c. VI-VIII.
- Laser trilobum* (L.) Borkh. ex G.Gaertn. Error.
- Laserpitium gallicum* subsp. *paradoxum* (A. Bolos & Font Quer) P. Monts. -. -. -. -. ROC(r,t). 1425 -1650 m. VI-VII.
- Laserpitium latifolium* L. subsp. *latifolium* Angèlica. Cominos negros. Laser à feuilles larges. Broad-leaved sermountain. BOSC/HERB/MAT/PRAT. 1250-2230 m. cc. VII-VIII.
- Libanotis pyrenaica* (L.) O. Schwarz [*Seseli libanotis* (L.) W.D.J. Koch] Sèseli pirinenc. -. Libanotis des montagnes. Mountain stone-parsley. PRAT(s)(p). 1700-2280 m. r. VII-VIII.
- Meum athamanticum* Jacq. Meu/Herba del mèu. Hinojo ursino. Cerfeuil des alpes. Baldmoney. PRAT(h,ac). 2020-2440 m. r. VII-VIII.
- Molospoppermum peloponnesiacum* (L.) Koch Coscoll. Coscollo. Couscouil. Striped Hemlock. ROC(r)(t)/HERB(m)/MAT(s)(p). 1220-2340 m. c. VI-VIII.
- Oreoselinum nigrum* Delarbre [*Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench] -. -. -. -. HERB(v). 1240-1300 m. rr. VII-IX.
- Pastinaca sativa* L. subsp. *sylvestris* (Mill.) Rouy & E.G. Camus Xirivia silvestre. Chirivía. Panais des bois. Wild parsnip. HERB/BOSC(s). 1240-1550 m. c. VII-VIII.
- Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss. -. -. -. -. ARV/RUD(t).1240 m. rrr.VII.
- Pimpinella major* (L.) Huds. L. var. *rubra* (Hoppe) Fiori et Bég. Pimpinella gran. Pimpinela mayor. Grande pimpinelle. Greater burnet-saxifrage. HERB(m,h)/PRAT(h). 1240-1850 m. r. VII-VIII.
- Pimpinella saxifraga* L. Matafaluga de prat. Pimpinela blanca. Pimpinelle Petite. Burnet Saxifrage. PRAT. 1200-2120 m. ccc.
- Ptychotis saxifraga* (L.) Loret & Barr. Orelludeta. Perejil de glera. Ptychotis saxifrage. -. ROC(t). 1240-1750 m. c. VII-VIII.
- Sanicula europaea* L. Herba de sant Llorenç. Hierba de san Lorenzo. Sanicle. Wood sanicle. BOSC(br). 1200-1350 m. r. VII-VIII.
- Seseli annuum* L. subsp. *annuum* -. Séséli annuel. -. VOR(s),ROC. 1200-1400 m. rr.

- Seseli montanum** L. subsp. *montanum* Sèseli de muntanya. -. Séseli comú. Séseli des muntanyes. -. PRAT(s). 1200-1980 m. c. VII-IX.
- Seseli montanum** subsp. *nanum* (Dufour) O. Bolòs & Vigo [S. *nanum* Duf. in Bory; S. *montanum* var. *nanum* Seg.] Sèseli. -. Séseli nain. -. ROC(ca). 2240-2760 m. rrr. VII.
- Thapsia nestleri** (Soy.-Will.) Wojew., Banasiak, Reduron & Spalik subsp. *flabellata* (P. Monts.) Fern. Prieto, Garcia Fresno, Sanna & Cires [Laserpitium *nestleri* subsp. *flabellatum* P. Monts.] PRAT/BOSC (r,h,ca). 1450-2040 m. r. VII-VIII.
- Tordylium maximum** L. -. -. -. RUD(h). 1250 m. rrr. VI-VIII.
- Torilis arvensis** (Huds.) Link Julivert bord. -. Torilis des champs. -. RUD. 1240-1620 m. r. VI-VIII.
- Torilis japonica** (Houtt.) DC. -. -. -. HERB(r)/BOSC(br). 775-1600 m. c. VI-IX.
- Trinia glauca** (L.) Dumort. Trínia. -. Trinie commune. Honewort. ROC(r)/PRAT(r) (ca). 1480-2380 m. rr. VI-VII.
- Xatartia scabra** (Lapeyr.) Meisn. Julivert d'isard. -. Persil d'isard. Xatardia. ROC(t). 2050-2750 m. r. VII-IX. PRO.

Apocinaceae

Vinca minor L. 1250 m. rrr. AL/AC.

Vincetoxicum hirundinaria Medik. [V. *hirundinaria* subsp. *intermedium* (Loret & Barrandon) Markgraf] Pebrotera borda. Hirundinaria. Dompte-venin intermédiaire. Pale swallow wort. MAT/BOSC. 1200-1850 m. cc. VI-VII.

Aquifoliaceae

Ilex aquifolium L. Grèvol. Acebo. Houx. Holly. BOSC(h). 1200-1900 m. c. V-VI.

Araliaceae

Hedera helix L. subsp. *helix* Heura. Hiedra. Lierre. Ivy. BOSC/ROC(m). 1200-1700 m. cc. VIII-XI.

Asteraceae

Achillea chamaemelifolia Pourr. -. -. Achillée à feuilles de camomille. -. ROC(r,si). 1230-1680 m. r. VII-VIII.

Achillea millefolium L. - Herba de tall/ Milfulles. Milenrama. Achillée millefeuille. Yarrow. PRAT/HERB(v). cc. V-X.

Achillea nana L. Error.

Achillea odorata L. Lladracà. Camomila. Achillée odorante. Cream flowered Sneezewort. PRAT(s). 1350-1780 m. r. VI-VIII.

Achillea ptarmica L. Error.

Achillea pyrenaica Godr. [A. *ptarmica* L. subsp. *pyrenaica* (Godr.) Heimerl] Camamilla de muntanya/Camamilla. -. Achillée des Pyrénées. -. AQUA(f). 1225-2650 m. c. VI-X.

Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kern. subsp. *alliariae* -. -. Adénostyle à feuilles d'alliaire. -. HERB(m)/MAT(n). 1500-1450 m. c. VI-IX.

Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh. subsp. *pyrenaica* (Lange) M. Dillenberger & Kadereit [A. *alliariae* subsp. *pyrenaica* (Lange) Rouy; A. *alliariae* subsp. *hybrida* auct.]. Error.

Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh. subsp. *helvetica* (Chrtek & Pouzar) Chrtek & Pouzar Antenària carpàtica. -. Antennaire des capates. -. PRAT. 2100-2750 m. c. VII-IX.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Pota de gat. -. Pied-de-chat dioïque. -. PRAT(ac). 1400-2700 m. ccc. V-VII.

- Anthemis arvensis* L. subsp. *arvensis* Camamilla borda. Manzanilla silvestre. Camomille sauvage. Corn chamomile. ARV/RUD. 1240-1320 m. rr. VI-IX.
- Anthemis cotula* L. Camamilla pudent. -. Anthémis fétide. Stinking chamomile. RUD(t). 1280 m. rrr. VI.
- Anthemis cretica* L. subsp. *carpatica* (Willd.) Grierson Àntemis de muntanya. -. Anthémis des Carpates. -. ROC/PRAT(s). r. 1970-2480 m. VI-VIII.
- Arctium lappa* L. subsp. *lappa* -. Bardana. Bardane commune. Beggar's Buttons. HERB(v). 1220 m. rrr. VIII.
- Arctium minus* (Hill) Bernh. Enganxadones/Repalassa. Lampazo. Bardane à petites têtes. Lesser Burdock. RUD. ccc. VII-IX.
- Arnica montana* L. subsp. *montana* Àrnica. Árnica. -. PRAT(ac). 1350-2410 m. r. VII-VIII. PRO.
- Artemisia absinthium* L. Donzell. Ajenjo. Absinthe. Wormwood. RUD(s). 1200-2050 m. c. VII-IX.
- Artemisia campestris* L. [A. *campestris* subsp. *glutinosa* (Besser) Batt.] Botja llemenosa. Escobilla parda. Armoise des champs. Field Sagewort. PRAT(s)/ROC(m). 1260-1380 m. rrr. VII-VIII.
- Artemisia umbelliformis* Lam. [A. *gabriellae* Braun-Blanq.] Artemisia de muntanya. -. Génépi laineux. -. ROC. 2200-2800 m. rr. VII-VIII.
- Artemisia verlotiorum* Lamotte -. -. Armoise de chine. Chinese wormwood. RUD. 1200-1340 m. c. VIII-X. AL/INV.
- Artemisia vulgaris* L. Altimiri/Altimira. -. Armoise citronnelle. Mugwort. RUD. 1200-1920 m. ccc. VI-IX.
- Aster alpinus* L. Àster alpí. Aster alpino. Aster des Alpes. -. PRAT. 1500-2800 m. c. VI-IX.
- Bellis perennis* L. Margarita/Margarideta. Bellorita silvestre. Pâquerette. Daisy. RUD(t). 1200-2000 m. c. III-VI.
- Bombycilaena erecta* (L.) Smoljan. [Micropus *erectus* L.] -. -. Cotonnière dressée. Micropus. PRAT(r). 1430 m. rrr. VI.
- Carduus carlinifolius* Lam. [C. *defloratus* L. subsp. *carlinifolius* (Lam.) Arènes] Card prim-cardo de montaña. Chardon à feuilles de carline. -. PRAT(s,r)/ROC(t). 1400-2200 m. c. 1400-2200 m. cc. VII-IX.
- Carduus carlinoides* Gouan subsp. *carlinoides* Card carlinoide. Cardo blanco pirenaico. Chardon fausse carline. Pyrenean thistle. ROC(t). 1700-2640 m. c. VII-IX.
- Carduus crispus* L. subsp. *multiflorus* (Gaudin) Franco [C. *crispus* L. subsp. *occidentalis* Chassagne et Arènes] Card cresp. Cardo crispado. Chardon à fleurs nombreuses. Welted Thistle. RUD. 1200-1800 m. rr. VI-VIII.
- Carduus nutans* L. Card nutant. -. Chardon penché. Musk thistle. RUD. 1500-1760 m. rrr. VII.
- Carlina acanthifolia* All. subsp. *cynara* (Pourr. ex Duby) Arcang. - Carlina. Carlina. Carline artichaut. -. PRAT. c. VI-IX.
- Carlina acaulis* L. subsp. *caulescens* (Lam.) Schübl. et Martens. Carlina borda. Ajonjera. Carline caulescente. Stemless carline thistle. PRAT. 1200-2500 m. c. VI-IX.
- Carlina corymbosa* subsp. *hispanica* (Lam.) O. Bolòs & Vigo [C. *hispanica* Lam.] - RUD(t). 1230 m. rrr.
- Carlina vulgaris* L. subsp. *spinosa* (Velen.) Vandas Carlina de monte. -. Carline thistle. PRAT(s). 1200-1720 m. c. VI-VII.
- Centaurea calcitrapa* L. Obriülls. Cardo estrellado. Centaurée chausse-trappe. Purple star-thistle. RUD(t)/ARV. 1200-1780 m. c. VI-IX.
- Centaurea cephalariifolia* Willk. [C. *scabiosa* subsp. *cephalariifolia* (Willk.) Greuter] -. -. -. Greater knapweed. PRAT/RUD. 1200-1880 m. c. VI-VIII.
- Centaurea jacea* L. subsp. *vinyalsii* (Sennen) O. Bolòs, Nuet et Panareda Caps de burro/Caps blaues. Centaurea de prado-. Centaurée jacée. -. PRAT. 1200-1920 m. cc. VI-X.
- Centaurea nigra* L. subsp. *nigra* Caps de burro. Aciano negro. Centaurée noire. Lesser knapweed. PRAT(h). 1240-1840 m. r. VI-IX.

- Centaurea pectinata* L. MAT(g). 1840 m. rrr.
- Centaurea triumfettii* All. subsp. *semidecurrens* (Jord.) Dostál [*C. montana* subsp. *semidecurrens* (Jord.) O. Bolòs & Vigo] -. -. -. *Centaurea triumfetti*. Squarrose Knapweed. RUD(t)/PRAT. 1980-2200 m. rr. VII-VIII.
- Cicerbita alpina* (L.) Wallr. [*Lactuca alpina* (L.) A. Gray] -. -. -. HERB(m). 2200-2340 m. rrr. VII-VIII.
- Cicerbita muralis* (L.) Wallr. subsp. *muralis* [*Mycelis muralis* (L.) Dumort.] Caps de burro. Cañamones. Centaurée noire. Lesser knapweed. BOSC(h). 1240-1780 m. c. VI-IX.
- Cichorium intybus* L. subsp. *intybus* Xicoira. Achicoria amarga. Chicorée amère. Chicory. RUD(t). rr. 1200-1280 m. VII.
- Cirsium acaulon* (L.) Scop. subsp. *acaulon* [*C. acaule* Scop.] Calcida acaule. Cardo. Cirse acaule. Dwarf Thistle. PRAT(h). 1240-2325 m. cc. VI-IX.
- Cirsium arvense* (L.) Scop. Calcida. Cardo blanco. Cirse des champs. Canada Thistle. RUD/ARV. 1200-1800 m. c. VI-IX.
- Cirsium eriophorum* (L.) Scop. Cardigassa. Cardo plumero. Cirse de Richter. Woolly thistle. PRAT(r)/RUD. 1200-2020 m. cc. VII-X.
- Cirsium monspessulanum* (L.) Hill Capferrat. Cardo hemoroidal. Cirse de Montpellier. -. AQUA(j). 1220-1460 m. r. VI-IX.
- Cirsium palustre* (L.) Scop. Cardigassa palustre. Cardo palustre. Cirse des marais. Marsh thistle. AQUA(j,m). 1200-2200 m. c. VII-IX.
- Cirsium richterianum* Gillot subsp. *costae* (Sennen & Pau) Talavera & Valdés [*C. eriophorum* var. *costae* (Sennen) O. Bolòs & Vigo] - PRAT,RUD. 1340-1550 m. rr.
- Cirsium rivulare* (Jacq.) All. Cardigassa rivular. Cardo gigante de río. Cirse des ruisseaux. Brook thistle. AQUA (j,f). 1200-1800 m. c. VI-VIII.
- Cirsium tuberosum* (L.) All. Cardigassa tuberosa. -. Cirse tubéreux. Tuberous Thistle. PRAT(h). 1520-2200 m. r. VII-VIII.
- Cirsium vulgare* (Savi) Ten. Card. Cardo borriquero. Cirse commun. Spear thistle. RUD. 1200-2100 m. c. VI-IX.
- Cirsium ×neyrae* E.G. Camus [*C. borderei* Rouy, *C. monspessulanum* × *C. palustre*] AQUA(j). 1550 m. rrr. VII.
- Cirsium ×medium* All. [*C. acaulon* subsp. *acaulon* × *C. tuberosum*] PRAT. 2120 m. rrr. VIII.
- Cota triumfetti* (L.) J. Gay [*Anthemis triumfetti* (L.) DC.] Cota de bosc. -. Anthémis de Trionfetti. Southern Dog-daisy. HERB(v)/PRAT(h). 1440-1700 m. rr. VII.
- Crepis albida* Vill. [*C. albida* subsp. *macrocephala* (Willk.) Babc.; *C. albida* subsp. *scorzoneroides* (Rouy) Babc.] - ROC. 1555-18000 m. rrr.
- Crepis blattarioides* (L.) Vill. [*C. conyzifolia* (Gouan) A. Kern.] -. -. -. PRAT(ac,h). 1900-2120 m. rrr. VII-IX.
- Crepis capillaris* (L.) Wallr. [*C. virens* subsp. *capillaris* (L.) Cout.] Crepis capil·lar. -. Crépide à tiges capillaires. Smooth Hawk's-beard. PRAT(h,t)/RUD(h).1220-1980 m. cc. VI-VIII.
- Crepis foetida* L. subsp. *foetida* -. -. Crépide fétide. Stinking hawk's-Beard. Rud(t). 1240 m. rrr. VI.
- Crepis lampsanoides* (Gouan) Tausch. BOSC(br),HERB(v). 1480-1530 m. rrr.
- Crepis mollis* (Jacq.) Asch. Crepis blana. -. Crépide molle. Northern Hawk's-beard. PRAT(h). HERB(m)/BOSC(r). 1320-2020 m. rrr. VII-VIII.
- Crepis pygmaea* L. Crepis nana. -. Crépide naine. -. ROC(t). 2420-2780 m. r. VII-IX.
- Crepis pyrenaica* (L.) Greuter Crepis pirinenca. -. Crépide des Pyrénées. -. HERB(m)/PRAT(h). 1420-2100 m. VII-VIII.
- Crepis setosa* Haller fil. subsp. *setosa* -. -. Crépide hérissée. Bristly hawk's-beard. RUD(h,t). 1220-1680 m. r. V-VIII.
- Crepis taraxacifolia* Thuill. [*C. vesicaria* L. subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell.] Cama-roja roja. -. Crépide à feuilles de pissenlit. -. RUD(h,t). 1200-1460 m. r. V-VII.
- Cynara cardunculus* L. [*C. scolymus* L.; *C. cardunculus* subsp. *scolymus* (L.) Hegi]. - Herba-col. -. -. -. ARV/RUD. 1240-1280 m. rr. VII. AL/AC.

- Doronicum austriacum* Jacq. Error.
- Doronicum grandiflorum* Lam. Dorònic de pedrusca. Árnica fals. Doronic à grandes fleurs. -. ROC(t). 2400-2700 m. rr. VII-IX.
- Doronicum pardalianches* L. Dorònic cordat. Doronico. Doronic à feuilles cordées. -. BOSC(h,br). 1200-1680 m. rr. V-VII.
- Echinops sphaerocephalus* L. subsp. *sphaerocephalus* Card d'eriçó. -. Oursin à têtes rondes. Common Globe-thistle. 1340-1620 m. rrr. VII.
- Erigeron acris* L. [E. acer L. subsp. *acer*] Herba de dolor. -. Vergerette âcre. -. PRAT. 1200-2100 m. c.VII-VIII.
- Erigeron alpinus* L. [E. *pyrenaicus* (Pourr.) A.W. Hill; E. *verguinii* Sennen] -. -. -. -. PRAT. r. 1550-2300 m. VII-IX.
- Erigeron annuus* (L.) Pers. -. Estenactis. Erigeron anual. Vergerette annuelle. Daisy fleabane. PRAT/RUD. c. 1200-2000 m. c. VI-X. AL/INV.
- Erigeron aragonensis* Vierh. [E. *uniflorus* L. subsp. *aragonensis* (Vierh.) O. Bolòs & Vigo] Erígeron aragonès. Vergerette d'Arago. -. PRAT(ac). 2000-2800 m. cc. VI-VIII.
- rErigeron canadensis* L. [Conyzia *canadensis* (L.) Cronq.] Coniza canadenca. -. Vergerette du Canada. Horseweed. RUD. 1200-1980 m. cc.VI-IX. AL/INV.
- Erigeron glabratus* Bluff & Fingerh. subsp. *occidentalis* (Vierh) A. Pujadas [E. *polymorphus* subsp. *occidentalis* Vierh.] Erígeron glabre. Vergerette glabre. Variable fleabane. PRAT(ac). 1900-2480 m. c. VII-IX.
- Eupatorium cannabinum* L. subsp. *cannabinum* Canabassa. Eupatorio. Eupatoire chanvrine. Hemp agrimony. HERB(v,h). 1200-1640 m. cc. VI-IX.
- Filago germanica* (L.) Huds. [F. *vulgaris* Lam., F. *pyramidalis* subsp. *canescens* (Jord.) O. Bolos & Vigo] -. Filago vulgar. Cotonnière commune. Common Cottonrose. PRAT(r). 1260 m. rrr. VII.
- Filago lutescens* Jord. [F. *pyramidalis* subsp. *lutescens* (Jord.) O. Bolòs & Vigo] -. Cotonnière jaunâtre. Red-tipped Cudweed. PRAT(r)/RUD(t). 1240-1420 m. rr. VI-VIII.
- Filago pyramidalis* L. [F. *obovata* Pomel; F. *pyramidalis* var. *obovata* (Pomel) Wagenitz; F. *pyramidalis* var. *prostrata* (Fiori) Wagenitz] Herba del borm. Hierba algodonera. Cotonnière à feuilles spatulées. Broad-leaved Cudweed. PRAT(r). 1260 m. rrr. VII.
- Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav. [G. *ciliata* (Raf.) S.F. Blake; G. *parviflora* subsp. *hispida* (DC.) O. Bolòs & Vigo] Galinsoga. Galinsoga à petites fleurs. Gallant soldier. ARV/RUD. 1200-1300 m. r. VI-IX. AL/ESP.
- Gnaphalium uliginosum* L. [Filaginella *uliginosa* (L.) Opiz] Gnafali uliginós. -. Cotonnière des fanges. March Everlasting. AQUA(j). 1560 m. rrr. VIII.
- Helianthus tuberosus* L. . Trumfa nyama/Nyàmera. Tupinambo. Topinambour. Jerusalem artichoke. RUD(h),BOSC(br). 1200- 1560 m. c. IX-X.
- Helminthotheca echiooides* (L.) Holub [Picris *echiooides* L.] Arpell. Lengua de gato. Picris fausse vipérine. Bristly Oxtongue. RUD. 1240 m. rrr.VII.
- Hieracium alatum* Lapeyr. -. -. -. -. BOSC(per)/MAT (ac). 1600-2450 m m. rrr. VII.
- Hieracium amplexicaule* L. Herba de l'esparver. Hieracio amplexicaule. Épervière embrassante. -. ROC(r). 1340-2640 m. c. VI-VIII.
- Hieracium bifidum* Hornem. ERROR.
- Hieracium cerinthoides* L. -. -. -. -. HERB(v,ac). 1320 m. rrr. VII.
- Hieracium cordatum* Costa [incl. H. *glaucophyllum* Scheele and H. *hispanicum* Arv.-Touv.] -. -. -. -. ROC. 1300 m. rrr. VII.
- Hieracium glaucinum* Jord. [H. *praecox* Schultz.-Bip.] -. -. Épervière bleuâtre. -. BOSC/PRAT. 1320-1680 m. c. VII.
- Hieracium gouanii* Arv.-Touv. [H. *cordifolium* subsp. *gouanii* (Arv.-Touv.) Zahn; ?H. *vernicosum* Arv.-Touv.] -. -. -. -. ROC(r)/HERB(v). 1240-1480 m. rr. VII-VIII.
- Hieracium hirsutum* Tausch Citat a prop.
- Hieracium lachenalii* Suter [H. *vulgatum* subsp. *lachenalii* (Suter) Zahn; H. *vulgatum* auct.] Citat a prop.
- Hieracium langei* Fr. -. -. -. -. BOSC(ac). 2175 m. rrr. VII.
- Hieracium lachnitis* Scheele [H. *compositum* auct., non Lapeyr.] Citat a prop.

- Hieracium murorum*** L. Esparver de murs. Hieracio comú de bosque. Épervière des murs.
Wall hawkweed. BOSC/HERB(v). 1240- 2080 m. c. VI-IX.
- Hieracium neopicris*** Arv.-Touv. Citat a prop.
- Hieracium nobile*** Gren. & Godr. - . -. -. 2400 m. rrr.
- Hieracium prenanthoides*** Vill. Citat a prop a comprovar.
- Hieracium sabaudum*** L. - . -. -. BOSC/MAT/HERB(v) (ac). 1240-1640 m. c. VII-IX.
- Hieracium schmidtii*** Tausch [*Hieracium aymericianum* Arv.-Touv.]. NO RETR.
- Hieracium solidagineum*** Fr.- BOSC. 1500 m. rrr.
- Hieracium umbellatum*** L. - . -. -. BOSC(ac). 1340 m. rrr. VII.
- Hieracium villosum*** Jacq. Citat a prop, a confirmar.
- Homogyne alpina*** (L.) Cass. Homògine. -. Homogyne des alpes. -. MAT(n). 1940-2340 m. r. VI-VIII.
- Hypochaeris radicata*** L. subsp. ***radicata*** Herba plana. Barbas de chivo. Porcelle enracinée.
Gosmore. PRAT. 1200-1890 m. cc. VI-IX.
- Jacobaea adonidifolia*** (Loisel.) Mérat [*Senecio adonidifolius* Loisel.] Herba dels talls. Suzón fino.
Séneçon à feuilles d'adonis. -. MAT(si). 1240-2200 m. c. VI-IX.
- Jacobaea leucophylla*** (DC.) Pelser [*Senecio leucophyllum* DC.] Herba blanca. Yerba blanca. Séneçon
à feuilles blanches. -. ROC(t). 1700-2850 m. c. VII-IX. PRO.
- Lactuca plumieri*** (L.) Gren. & Godr. [*Cicerbita plumieri* (L.) Kirsch.] Lletuga de muntanya. Cerraja
lechuguera. Laitue de plumier. Hairless blue sow-thistle. HERB(m). 1580-2060 m. r. VII-VIII.
- Lactuca serriola*** L. Enciam bord. Lechuga espinosa. Laitue sauvage. Prickly lettuce.
- f. serriola - RUD(h). 1200-1560 m. r. VIII.
- f. integrifolia Bogenhard RUD(he). 1300 m. r. IX.
- Lactuca virosa*** L. - RUD. 1600 m. rrr.
- Lapsana communis*** L. -. Hierba de los pechos. Lampsane commune. Common Nipplewort.
RUD(h). 1220-1620 m. c. VI-VIII.
- Leontodon hispidus*** L. subsp. ***hispidus*** (DC.) Soják Queixalets/Leontodon híspid. Leóntodon
de prado. Liondent hispide. Greater hawkbit. PRAT. 1220-2340 m. ccc. VI-IX.
- Leucanthemopsis alpina*** (L.) Heywood subsp. ***minima*** (Vill.) Holub. Margarida alpina. Piretro
alpino. Leucanthème des Alpes. Alpine moon-daisy. PRAT/ROC(t). 1920-2850 m. c. VI-X.
- Leucanthemum ageratifolium*** Pau [*L. vulgare* Lam. subsp. *puiulae* Sennen] Margarita de prat.
Margarita mayor. Marguerite. Ox-eye daisy. PRAT/HERB(h,v). 1200-1870 m. cc. V-VIII.
- Leucanthemum catalaunicum*** Vogt [*L. vulgare* subsp. *catalaunicum* (Vogt) O. Bolòs & Vigo; *L.
maximum* auct.] Margarida. -. Marguerite géante. -. PRAT(s)/ROC(t). 1450-2120 m. r. V-IX.
- Leucanthemum delarbretii*** Timb.-Lagr. subsp. ***ruscinonense*** (Jeanb. & Timb.-Lagr.) Vogt, F.
Wagner & Oberpr. [*L. monspeliense* auct., non (L.) H.J. Coste] -. -. Marguerite de Montpellier. -.
ROC(r). 1950-2800 m. rr. VI-VIII.
- Logfia minima*** (Sm.) Dumort. [*Filago minima* (Sm.) Pers.] Filago mínima. -. Cotonnière naine.
Little Cottonrose. PRAT(r). 1260-1340 m. rr. VII.
- Matricaria chamomilla*** L. [*Chamomilla recutita* (L.) Rauschert] Camamila. Camamila. Camomille
sauvage. German Chamomile. ARV/RUD(t). 1260 m. rr. VI.
- Matricaria discoidea*** DC. [*Chamomilla suaveolens* (Pursh) Rydb.; *Matricaria suaveolens* (Pursh) Buchen.,
non L.] -. -. Matricaire odorante. Pineapple weed. RUD(t). 1200-2100 m. c. VI-IX.
- Omalotheca supina*** (L.) DC. [*Gnaphalium supinum* L.] Gnafuli nan. Borosilla de montaña.
Gnaphale nain. Dwarf cudweed. AQUA(c). 2100-2720 m. r. VII-IX.
- Omalotheca sylvatica*** (L.) Sch. Bip. & F.W. Schultz [*Gnaphalium sylvaticum* L.] Gnafuli selvàtic.
Algodonosa de bosque. Gnaphale des bois. -. HERB(c). 1200-2200 m. r. VII-IX.
- Onopordum acanthium*** L. subsp. ***acanthium*** Cardot gros. Cardo borriquero. Chardon aux
ânes. Cotton Thistle. RUD(h). 1450-1670 m. rr. VII-VIII.
- Pallenis spinosa*** (L.) Cass. subsp. ***spinosa*** [*Asteriscus spinosus* (L.) Schulz Bip. subsp. *spinosus*] -
ROC(m). 1220 m. rrr.
- Pentanema conyzae*** (Griess.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M.M. Mart. Ort. [*Inula conyzae*
(Griess.) DC.] Ínula. Coniza. Herbe aux mouches. Ploughman's spikenard. HERB(v). 1200-1580 m. r. VII-IX.

- Picris hieracioides** L. [P. hieracioides subsp. rielii (Sennen) O. Bolòs & Vigo; P. hieracioides subsp. villarsii (Jord.) Nyman] Parraca. Parraca. Picris fausse épervière. Hawkweed. PRAT/HERB/ROC(t) (s). 1200-2200 m. ccc. VI-XI.
- Pilosella breviscapa** (DC.) Soják [Hieracium breviscapum DC.] Herba de l'esparver. -. Piloselle à tiges courtes. -. PRAT 1680-2720 m. cc. VII-VIII.
- Pilosella heteromelana** (Zahn) Mateo [Hieracium hypeuryum subsp. heteromelanum Zahn] PRAT(ac). 1850-2100 m. c. VII-VIII.
- Pilosella hoppeana** (Schult.) F. W. Schultz & Sch. Bip. [Hieracium hoppeanum Schult.] - ERROR.
- Pilosella lactucella** (Wallr.) P.D. Sell & C. West [Hieracium lactucella Wallr.] -. Piloselle auricule. -. PRAT(ac). 1420-2540 m. cc. VII-VIII.
- Pilosella officinarum** Vaill. [Hieracium pilosella L.] Herba cancer. Pelosilla. Piloselle. Mouse-ear hawkweed. PRAT. r. VII-VIII.
- Pilosella peleteriana** (Merat) F.W. Schultz & Sch. Bip. [Hieracium peleterianum Merat] -. Piloselle de Lepèletier. Shaggy Mouse-ear-hawkweed. PRAT/MAT(ac). 1400-2300 m. cc. VII-VIII.
- Pilosella saussureoides** Arv.-Touv. [incl. P. tardans (Peter) Soják; Hieracium niveum (Müll.-Arg.) Zahn] Pelosella. Pelosilla nívea. Piloselle. -. PRAT. cc. VI-VIII.
- Podospermum laciniatum** (L.) DC. [Scorzonera laciniata L.] Barball. Margallos. Scorsone à feuilles de chausse-trape. Cutleaf Vipergrass. RUD(t). 1320 m. rrr. VII.
- Prenanthes purpurea** L. Prenantes. Ajonjera. Prénanthe pourpre. Purple lettuce. BOSC(h). 1260-2100 m. c. VII-VIII.
- Pulicaria dysenterica** (L.) Bernh. subsp. *dysenterica* Herba de Sant Roc. Hierba de gato. Pulicaire dysentérique. Fleabane. AQUA(j). 1240-1350 m. rr. VII. MED.
- Rudbeckia laciniata** L. -. Rudbeckia laciniata L. -. HERB(h)/BOSC(r). 1240 m. rrr. AL/INV/ER.
- Schlagintweitia chamaepicris** (Arv.-Touv.) Greuter [Hieracium chamaepicris Arv.-Touv.] -. 2300 m. rrr.
- Scorzoneroidea autumnalis** (L.) Moench subsp. *autumnalis* [Leontodon autumnalis L. subsp. *autumnalis*] Leòntodon autumnal. -. Liondent d'automne. Autumn Hawkbit. RUD/PRAT (t). 1200-1820 m. c.
- Scorzoneroidea carpetana** subsp. *duboisii* (Sennen) Gallego [S. *duboisii* (Sennen) Greuter; Leontodon *duboisi* Sennen] -. Liondent de dubois. -. AQUA(f,m). 1600-2600 m. c.
- Scorzoneroidea pyrenaica** (Gouan) Holub subsp. *pyrenaica* [Leontodon *pyrenaicus* subsp. *pyrenaicus* Gouan] Leòntodon pirinenc. -. Liondent des Pyrénées. -. PRAT/ROC(r) (ac) 1820-2700 m. cc. VII-IX.
- Senecio doronicum** (L.) L. subsp. *longifolius* (Willk.) J. Calvo Llengua de bou. -. Séneçon doronic. -. PRAT(h). 1850 m. rrr. VII.
- Senecio inaequidens** DC. Seneci del Cap. Senecio de El Cabo. Séneçon du cap. Narrow-leaved ragwort. RUD/MAT. 1200-2680 m. AL/INV.
- Senecio pyrenaicus** L. in Loefl. subsp. *pyrenaicus* Leòntodon pirinenc. -. Liondent des pyrénées. Pyrenean hawkbit. ROC(t)/MAT. 1800-2750 m. c. VII-VIII.
- Senecio pyrenaicus** subsp. *caespitosus* (Brot.) Franc [Senecio *tournefortii* subsp. *caespitosus* (Brot.) Cout.]. Error.
- Senecio viscosus** L. Seneci viscós. Hierba cana viscosa. Séneçon visqueux. Fetid groundsel. ROC(t). 1320-2080 m. c. VII-IX.
- Senecio vulgaris** L. Xenixell. Casamelos. Séneçon commun. Groundsel. ARV/RUD. 1200-2000 m. cc. II-XII.
- Serratula tinctoria** L. Serràtula tintòria. Serratula. Serratule des teinturiers. Dyer's plumeless Saw-wort. BOSC/MAT/PRAT/AQUA(j,m) (ac). 1260-1600 m. cc. VII-IX.
- Silybum marianum** (L.) Gaertn. - ERUD(h). 1230 m. AL/AC.
- Solidago canadensis** L. -. Vara de oro del Canadá. Gerbe-d'or. Canadian Goldenrod. HERB(h)/BOSC(br). 1320 m. rrr. AL/INV.

- Solidago virgaurea*** L. Herba daurada. -. Solidage verge-d'or. Common goldenrod-goldenrod. BOSC/MAT/PRAT. 1200-2680 m. cc. VII-IX.
- Sonchus asper*** (L.) Hill subsp. *asper* Lletissó/Lletsó. Cerraja dentada. Laiteron piquant. Prickly sow-thistle. RUD/ARV. 1200-2000 m. cc. VI-IX.
- Sonchus oleraceus*** L. Lletissó/Lletsó. Cerraja. Laiteron maraîcher. Smooth sow thistle. RUD/ARV. 1200-1670. c. VI-IX.
- Symphyotrichum novae-angliae*** (L.) G.L. Nesom [*Aster novae-angliae* L.] Setembrines. RUD. 1220 m. rrr. AL/AC.
- Symphyotrichum pilosum*** (Willd.) G.L. Nesom [*Aster pilosus* Willd.] Setembres/Setembrines. -. -. Hairy aster. RUD(s)/PRAT(s). 1200-1280 m. r. VII-XI. AL/INV.
- Symphyotrichum ×salignum*** (Willd.) G.L. Nesom [*Aster salignus* Willd.; *S. lanceolatum* × *S. novi-belgii*] Setembrina. Cielo estrellado. Aster à feuilles de saule. Common New York aster. RUD. 1280 m. rrr. AL/AC.
- Tanacetum corymbosum*** (L.) Schultz Bip. subsp. *corymbosum* Crisantem corimbós. Tanaceto corimboso. Tanaisie en corymbes. Corymb-flower tansy. HERB(v). 1200-1800 m. cc. VI-VIII.
- Tanacetum parthenium*** (L.) Sch. Bip. Segura. Segura. Grande camomille. Feverfew. RUD. 1220-1430 m. rr. VI. AL/AC.
- Tanacetum vulgare*** L. [*Chrysanthemum tanacetum* Karsch, non Vis.] Tanarida. Tanaceto. Tanaisie. Tansy. RUD. 1200-2000 m. rr. VI-X.
- Taraxacum gasparrinii*** Lojac. [? *T. laevigatum* auct.] -. Pissenlit. -. RUD(t,r). 1280 m. rrr. VI.
- Taraxacum officinale*** Weber in Wiggers Pixallits. Diente de león. -. Common dandelion. RUD(t)/PRAT(t). ccc. II-XI.
- Taraxacum pyrenaicum*** Reut. [*T. dissectum* auct.]. Xicoia/Xicoia. -. Pissenlit découpé. -. PRAT(t)/RUD(t). 1200-2650 m. cc.
- Thrincia hispida*** Roth [*Leontodon taraxacoides* subsp. *hispidus* (Roth) Kerguélen; *L. rothii* Ball, nom. illeg.; *L. saxatilis* subsp. *rothii* Maire; *L. taraxacoides* subsp. *longirostris* Finch & P.D. Sell] -. -. Liondent à bec long. PRAT(s). 1280 m. rrr. VII.
- Tragopogon dubius*** Scop. Inflabous. -. Salsifis douteux. -. RUD(h). 1240 m. rrr. VI.
- Tragopogon pratensis*** L. Salsifí de prat. -. -. -.
- subsp. *lamottei* (Rouy) O.Bolòs et Vigo - PRAT(h). 1240-2150 m. c. VI-VIII.
- subsp. *pratensis* L. PRAT(h). 1420-1680 m. rr. VI-VIII.
- Trommsdorffia maculata*** (L.) Bernh. [*Hypochaeris maculata* L.; *H. pyrenaica* Sennen] - Herba del porc. -. Porcelle tachetée. -. PRAT(ac). 1550-2400 m. VII-VIII.
- Tussilago farfara*** L. Pota de cavall/ Peu d'euga. Tusilago. Pas-d'âne. Coltsfoot. AQUA(j,b)/BOSC(br). 1200-2100 m. c. III-IV.

Balsaminaceae

Impatiens balfourii Hook. f. BOSC(c). 1220 m. rrr. AL/INV.

Betulaceae

- Alnus glutinosa*** (L.) Gaertn. Vern. Aliso. Aulne glutineux. Black alder. BOSC(br). 1200-1600 m. c. III-V.
- Betula pendula*** Roth. Beç/Bedoll. Abedul. Bouleau verruqueux. Silver birch. BOSC(h,br). 1200-2200 m. cc. IV-V.
- Betula pubescens*** Ehrh. Beç/Bedoll pubescent. Chopa blanca. Bouleau blanc. White birch. BOSC(br). 1480-2000 m. r. IV.
- Betula ×aschersoniana*** Hayek [*B. pendula* x *B. pubescens*] BOSC(br). 1580 m. rrr.
- Corylus avellana*** L. Avellaner. Avellano. Noisetier. Common hazel. BOSC. 1200-2000 m. ccc. II-IV.

Boraginaceae

- Aegonychon purpurocaeruleum* (L.) J. Holub [*Lithospermum purpurocaeruleum* L.; *Buglossoides purpurocaeruleum* (L.) I.M. Johnst.] Mill gruà. -. Grémil bleu pourpre. Purple gromwell. BOSC(br). 1240 m. rrr. V.
- Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb. subsp. *arvensis* Ancusa arvense. Miel de avispas. Buglosse des champs. Annual bugloss. ARV. 1250 m. rr. V. AL/ESP.
- Buglossoides arvensis* (L.) I.M. Johnst. subsp. *arvensis* [*Lithospermum arvense* L. subsp. *arvense*] Mill de sol petit. Mijo de sal. Grémil des champs, Corn Gromwell. ARV. 1240-1310 m. rr. IV-VI.
- Cynoglossum officinale* L. Besneula. Viniega. Cynoglosse officinale. Hound's-tongue. HERB(r). 1680 m. rrr.
- Echium vulgare* subsp. *pustulatum* (Sm.) Bonnier & Layens [*E. vulgare* L. subsp. *argentea* (Pau) Font Quer] Viperina. Viborera comú. -. PRAT(s)/RUD(s). 1200-2000 m. IV-X.
- Echium vulgare* L. subsp. *vulgare* - Viperina. Viborera comú. -. 13-1670 m. r. VI-VII.
- Lithospermum officinale* L. Mill del sol/Mill gruà. Mijo de sol. Grémil officinal. Gromwell. 1200-2020 m. c. V-VIII.
- Myosotis alpestris* F.W. Schmidt subsp. *alpestris* [*M. sylvatica* subsp. *alpestris* (F.W. Schmidt) Gams] Miosotis alpestre. Nomeolvides alpino. Myosotis des Alpes. Alpine wood forget-me-not. PRAT. 1580-2800 m. V-VIII. cc.
- Myosotis alpestris* subsp. *pyrenaicum* (Blaise & Kerguelen) Valdes [*M. pyrenaica* auct., non Pourr.; *M. alpina* Lapeyr.] PRAT(r)/ROC(t). 2200-2580 m. r. VII-IX.
- Myosotis arvensis* (L.) Hill. subsp. *arvensis* Nomoblidis de camp. Nomeolvides. Myosotis des champs. Common scorpiongrass. ARV/RUD/HERB(v). 1200-2050 m. c. VI-VIII.
- Myosotis decumbens* subsp. *teresiana* (Sennen) Grau [*M. sylvatica* Hoffm. subsp. *teresiana* (Sennen) O. Bolòs et Vigo] Miosotis de bosc. Nomeolvides de prado. Myosotis. Wood forget-me-not. BOSC(h). 1200-2050 m. cc. V-VIII.
- Myosotis herrei* Sennen [*M. palustris* subsp. *tuxeniana* O. Bolòs & Vigo; *M. tuxeniana* (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs & Vigo] Miosotis d'aigua. -. Water forget-me-not. AQUA(f,cr)1200-1800 m. r.
- Myosotis stricta* Roem. & Schult. PRAT(r).2000-2340 m. rrr. VII-VIII.
- Pulmonaria affinis* F.W. Schultz Fulles de la mare de déu/Pulmonària de fulla ampla. -. Pulmonaire semblable. -. BOSC(br). 1220 m. rrr. V.
- Pulmonaria longifolia* (Bastard) Boreau [*P. longifolia* subsp. *cevennensis* Bolliger] Fulla o fulles de la Mare de Déu/ Pulmonària de fulla estreta. Pulmonaria. Pulmonaire à feuilles longues. -. BOSC(s)/PRAT(s). 1220-1820 m. c. IV-VI.
- Symphytum uplandicum* Nyman Consolda. Consuelda mayor. Consoude. Russian Comfrey. AQUA(h). 1240 m. rrr. VI.
- Symphytum tuberosum* L. subsp. *tuberousum* Consolda. Consuelda menor. Consoude tubéreuse. Tuberous comfrey. BOSC(h,br). 1220-1700 m. rr. V-VI.

Brassicaceae

- Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande Herba d'all. Hierba del ajo. Alliaire. Garlic mustard. RUD(h)/BOSC(h). 1200-1620 m. cc. V-VI.
- Alyssum alyssoides* (L.) L. Herba de la ràbia. Alisón calicino. Alysson à calices persistants. -. PRAT(a). 1200-2100 m. c. V-VIII.
- Alyssum cacuminum* Spaniel, Marhold & Lihová [*A. cuneifolium* auct., non Ten.] -. -. -. -. ROC(t). 2300-2700 m. c. VII-VIII.
- Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. Arabidopsis. -. Arabette de thalius. Mouse-ear cress. PRAT(a)/ARV. 1230-1380 m. rrr. IV-VI.
- Arabis alpina* L. subsp. *alpina* Àrabis alpina. Arabieta de los Alpes. Arabette des alpes. Alpine rockcress. ROC(r,t)(h)/BOSC(h). 1200-2620 m. c. V-VIII.

- Arabis ciliata*** Clairv. [*A. corymbiflora* Vest.] PRAT(s). 1500-2200 m. c. VI-VIII.
- Arabis scabra*** All. Error.
- Arabis serpillifolia*** Vill. -. -. -. ROC(r,ca). 1000-2000 m. c. VI-VII.
- Barbarea intermedia*** Boreau Barbarea pirinenca. Barbárea de hoja recortada. Barbarée intermédiaire. Intermediate yellow rocket. RUD/BOSC(br). 1200-2060 m. r. IV-VI.
- Barbarea verna*** (Mill.) Asch. -. -. -. RUD/BOSC(br). codolars. V-VI. 1125-1425 m.
- Biscutella coronopifolia*** L [*B. laevigata* subsp. *coronopifolia* (L.) Rouy & Foucaud] -. -. -. PRAT/HERB(v). 1200-1340 m. r. VI-VIII.
- Biscutella intermedia*** Gouan [*B. pyrenaica* A. Huet; *B. laevigata* subsp. *pyrenaica* (Huet) Nyman] -. -. -. ROC(t). 2000-2700 m. c. VI-VIII.
- Biscutella laevigata*** L. subsp. *laevigata* Herba de les llunetes. Anteojos. Biscutelle commune. Buckler mustard. ROC(t),PRAT(ca). 1500-2340 m.c. VI-VIII.
- Bunias erucago*** L. -. -. -. ARV. 1260-1450 m. rr. V-VI.
- Capsella bursa-pastoris*** (L.) Medik. Caps blancs/Bosses de pastor. Bolsa de pastor. Bourse-à-pasteur. Shepherd's purse. ARV/RUD. 1200-2200 m. cc. III-VI.
- Capsella rubella*** Reut. [*C. bursa-pastoris* subsp. *rubella* (Reut.) Hobkirk] RUD(t). -. -. -. 950-2050 m. rr. VI.
- Cardamine alpina*** Willd. [*C. bellidifolia* L. subsp. *alpina* (Willd.) B.M.G. Jones] Cardamina alpina. -. Cardamine des Alpes. -. AQUA(c,si). 2500-2650 m. rrr. VIII.
- Cardamine amara*** subsp. *pyrenaaea* Sennen [*C. amara* L. subsp. *amara* auct., non L.] -. -. Cresson amer. -. AQUA(f). 1200-2380 m. c. V-VIII.
- Cardamine crassifolia*** Pourr. [*C. pratensis* subsp. *nuriae* (Sennen) Sennen] Cardamine à feuilles épaisse. -. AQUA(m,f). 1600-2340 m. r. VI-VII. ***Cardamine heptaphylla*** (Vill.) O.E. Schulz Canuguera. Canudera. Cardamine à sept folioles. Pinnate coralroot. BOSC(h). 1220-1600 m. rr. IV-VI.
- Cardamine hirsuta*** L. Cardàmine hirsuta. -. Cardamine hirsute. -. PRAT(a). 1200-1350 m. rr. II-V.
- Cardamine impatiens*** L. subsp. *impatiens* -. -. -. BOSC(h,br). 1220-1670 m. cc. VI.
- Cardamine occulta*** Hornem. -. -. -. RUD. 1240 m. rrr. VI. AL/INV.
- Cardamine pentaphyllos*** (L.) Crantz Citació antiga no precisa i no retrobada.
- Cardamine raphanifolia*** Pourr. [*C. pyrenaica* (L.) Rothm., nom. illeg., non Kuntze] Cardamina pirinenca. -. Cardamine à feuilles de radis. Greater cuckooflower. AQUA(f). 1240-1720 m. cc. V-VI.
- Cardamine resedifolia*** L. -. Cardámame alpina. Cardamine à feuilles de réséda. Mignonette-leaved bittercress. ROC(r,t,si). 1480-2780 m. cc. VI-VIII.
- Coincyia monensis*** (L.) Greuter & Burdet subsp. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. [*C. cheiranthos* (Vill.) Greuter & Burdet; *Hutera cheiranthos* (Vill.) Gómez-Campo] Brassicella. -. Moutarde giroflée. wallflower cabbage. ROC(t,si). 1280-2200 m. c. VI-VIII.
- Descurainia sophia*** (L.) -. -. -. RUD(h,t). rrr. 1400 m. VI.
- Diplotaxis erucoides*** (L.) DC. subsp. *erucoides* Ravenissa blanca. Rabaniza blanca. Roquette blanche. White wall rocket. ARV. 1200-1310 m. rr. IV-V.
- Diplotaxis muralis*** L.) DC. subsp. *muralis* -. -. -. RUD(t). 800-1250 m. rr. V-VI.
- Draba aizoides*** L. -. -. -. PRAT(c,r,ca). 1900-1700 m. c. VI-VII.
- Draba dubia*** Suter [*D. dubia* subsp. *laevipes* (DC.) Braun.-Blanq.] Draba dúbia. Draba de las cumbres. Drave des frimas. Austrian whitlowgrass. ROC(r). 2200-2700 m. c. V-VII.
- Draba incana*** L. Error.
- Draba nemorosa*** L. -. -. -. RUD(t). 1600-2100 m. rr. V-VI.
- Draba siliquosa*** M. Bieb. [*D. siliquosa* subsp. *carinthiaca* (Hoppe) O. Bolòs & Vigo] -. -. -. ROC(r,t). 2000-2300 m. rr. VII-VIII.
- Draba subnivalis*** Braun-Blanq. [*D. tomentosa* subsp. *subnivalis* (Braun.-Blanq.) O. Bolòs & Vigo] -. -. -. ROC(r). 21800-2400 m. r. VII-VIII.
- Draba verna*** (L.) DC. [*Erophila verna* (L.) DC.] Pàpoles de primavera. -. Drave de printemps. -. PRAT(r). 1240-1880 m. r. V.

- Eruca vesicaria* (L.) Cav. [*E. vesicaria* subsp. *sativa* (Mill.) Thell.] Enciam, Eruga, Ruca, Ruqueta. Eruca. Roquette cultivée. Garden rocket. ARV. 875 m. rrr. V-VII.
- Erucastrum nasturtiifolium* (Poir.) O.E. Schulz subsp. *nasturtiifolium* Ravenissa groga Oruga salvaje. Fausse roquette à feuilles de cresson. Watercress-leaved rocket. RUD. 1220-1450 m. rrr. VI-VII..
- Erysimum ochroleucum* (Schleich.) DC. subsp. *pyrenaicum* Nyman [*E. sylvestre* subsp. *pyrenaicum* (Nyman) O. Bolòs & Vigo; *E. pyrenaicum* Jordan]. Erísim nan. -. Vélar des pyrénées. Decumbent treacle mustard. ROC(t). 1880-2780 m. c. VI-VIII.
- Erysimum ruscinonense* Jord. [*E. grandiflorum* Desf. subsp. *collisparsum* (Jord.) O. Bolòs & Vigo; *E. australe* Gay] Erísim de flor gran. Erísimo pirenaico. Vélar de Provence. -. ROC(t)/PRAT(s). 1220-1650 m. cc. VI-VIII.
- Fourraea alpina* (L.) Greuter & Burdet [*Arabis pauciflora* (Grimm) Garcke, *Turritis brassica* Leers] -. Arabette pauciflore. -. HERB(v,c). 1280-1780 m. c. VI-VIII.
- Hornungia alpina* subsp. *auerswaldii* (Willk.) O. Appel [*Prizelago alpina* subsp. *auerswaldii* (Willk.) Greuter & Burdet; *Hutchinsia alpina* (L.) R.Rb. in Aiton subsp. *alpina*] Hutquínzia alpina. -. Cresson de chamois. -. ROC(t). 2100-2800 m. c. VI-VII.
- Iberis amara* L. Matablat. Zarapico. Ibérис amer. Wild candytuft. ROC(t)/ARV. 1220-1540 m. c. VI-IX.
- Iberis sempervirens* L. . Carraspic sempreverd. -. Carraspique perenne. Ibérис toujours vert. Evergreen candytuft. PRAT(s). 1400-2700 m. cc. VI-VII.
- Iberis spathulata* DC. subsp. *spathulata* Carraspic espatulat. -. Ibérис spatulé. -. ROC(t,ca). 2450-2700 m. r. VI-VIII.
- Kernera saxatilis* (L.) Sweet subsp. *saxatilis* -. -. -. -. ROC(r,ca). 1650 m. rrr. VII.
- Lepidium campestre* (L.) R. Br. Morritort de camp. Mostaza salvaje. Passerage des champs. Pepperwort. ARV/RUD(t). 1220-1670 m. rr. V-VI.
- Lepidium draba* L. subsp. *draba* [*Cardaria draba* (L.) Desv. subsp. *draba*] Capellans. Draba. Passerage drave. Hoary cress. RUD(t). 1220-1260 m. rrr. IV-V.
- Lepidium graminifolium* L. -. -. -. -. RUD(t).1220 m. rrr. VII.
- Lepidium heterophyllum* Benth. subsp. *heterophyllum* -. -. Mastuerzo pirenaico. Passerage à feuilles variables. Smith's pepperwort. PRAT. 1550-2100 m. rrr. VI.
- Lunaria annua* L. subsp. *annua* . Setins. Hierba de la plata. Lunaire annuelle. Satin flower. RUD(h). 1200-1350 m. c. V.
- Lepidium villarsii* Gren. & Godr. subsp. *villarsii*. Error.
- Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K. Mey. [*Thlaspi perfoliatum* L.] -. Mostacilla brava. -. -. PRAT. 1500. rr. VI.
- Murbeckiella pinnatifida* (Lam.) Rothm. Braia pinnatífida. Cardáminte pirenaica. Arabette pennatifide. Murbekiella. ROC(t). 1700-2720 m. c. VI-VIII.
- Nasturtium officinale* R. Br. [*Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek] Creixen. Berro de agua. Cresson de fontaine. Watercress. AQUA(cr). 1220-1320 m. rr. V-VII.
- Noccaea brachypetala* (Jord.) F.K. Mey. [*Thlaspi brachypetalum* Jord.; *T. caerulescens* subsp. *brachypetalum* (Jord.) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot; *T. alpestre* subsp. *brachypetalum* (Jord.) Durand et Pittier; *T. virgatum* Godr.] Traspic alpestre. -. Tabouret à pétales courts. Small-flowered Pennycress. PRAT/MAT. 1350 m. rrr. VI.
- Noccaea occitanica* (Jord.) F.K. Mey. [*Thlaspi caerulescens* subsp. *occitanicum* (Jord.) M. Laínz; *T. alpestre* L. subsp. *alpestre* var. *tallonis* (Senn.) O. Bolòs et J. Vigo; *T. tallonis* Sennen] LOC.PROP.
- Pseudoturritis turrita* (L.) Al-Shehbaz [*Arabis turrita* L.] Turrita. -. Arabette tourette.tower cress. HERB(v). 1240- 1860 m. cc. V-VII.
- Rapistrum rugosum* (L.) All. -. -. -. -. ARV. 1240 m. rrr. VI.
- Raphanus raphanistrum* L. subsp. *raphanistrum* -. -. -. -. ARV. 1240-1300 m. rrr. VI.
- Rorippa pyrenaica* (All.) Rchb. -. -. -. -. RUD(t). 1230-1370 m. rr. VI.
- Rorippa sylvestris* (L.) Besser Creixen silvestre. -. -. RUD(a,t). 1240 m. rrr. VII.
- Sinapis arvensis* L. subsp. *arvensis* Ravenissa groga. Mostaza de los campos. Moutarde des champs. Charlock Mustard. ARV. 1240 m. rrr. VI-IX.

- Sisymbrella aspera* (L.) Spach subsp. *aspera* [*Rorippa aspera* (L.) Maire subsp. *aspera*] -. -. -. -. ARV(h). 1300 m. rrr. VI.
- Sisymbrella aspera* subsp. *praeterita* Heywood [*Rorippa aspera* (L.) Maire subsp. *praeterita* (Heywood) O. Bolòs & Vigo] -. -. -. RUD(t)(h) . 1250-1500 m. rrr. V-VII
- Sisymbrium austriacum* Jacq. subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud Sisimbri austriac. Sisimbrio austriaco. Vélar à fleurs dorées. -. RUD. 1220-2100 m. c. VI-IX.
- Sisymbrium officinale* (L.) Scop. Herba dels cantaires/Herba dels cantors. Erísimo. Herbe aux chantres. Hedge mustard. RUD(t). 1200-2000 m. cc.V-VIII.
- Thlaspi arvense* L. ARV/RUD(t). 1220-1340 m. r. IV-VIII.
- Turritis glabra* L. [*Arabis glabra* (L.) Bernh.] Àrabis glabra. -. Arabette glabre. Tower rockcress. HERB(v). 1200-1840 m. cc. V-VI.

Buxaceae

Buxus sempervirens L. Boix. Boj. Buis. Common boxwood. BOSC/MAT). 360-1850 m. cc. III-IV.

Campanulaceae

- C. caespitosa* Scop. Error.
- Campanula cochleariifolia* Lam. Campànula nana. -. Campanule à feuilles de cochléaire. Fairy's thimble. ROC(r,t,ca). 1740-2700 m. r. VII-VIII.
- Campanula erinus* L. - - -. Campanule à petites fleurs. -. PRAT(r).1280 m. rrr.
- Campanula glomerata* L. Campaneta. Campanula glomerata. Campanule agglomérée. Clustered bellflower. PRAT. 1240-2050 m. cc. VI-VIII.
- Campanula persicifolia* L. Campaneta. Campanilla silvestre. Campanule à feuilles de pêcher. Bellflower. VOR(s). 1220-1580 m. cc. VI-VIII.
- Campanula rapunculoides* L. - -. -. -. HERB(v). rr. 1260-1420 m. VI.
- Campanula rotundifolia* L. - Campaneta blava/Campaneta de fulla rodona. -. Campanule à feuilles rondes. Spanish bellflower.
subsp. *hispanica* (Willk.) O. Bolòs & Vigo [*C. rotundifolia* subsp. *catalanica* (Podlech) O. Bolòs & Vigo]. PRAT(ac). 1200-1500 m. ccc. VI-IX.
subsp. *rhomboidalis* (L.) Bonnier & Layens (Sub. *C. rhomboidalis* L.). Error.
subsp. *rotundifolia* PRAT/MAT/ROC(ac). 1350-2450 m. c. VII-IX.
- Campanula scheuchzeri* Vill. [*C. ficarioides* Timb.-Lagr.; *C. scheuchzeri* subsp. *ficarioides* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo] Campaneta/Campaneta alpina. -. Campanule fausse ficaire. -. PRAT(ac). 1600-2700 m. ccc. VII-IX.
- Campanula trachelium* L. Campaneta d'ortiga. Campanilla. Campanule gantelée. Bats-in-the-belfry. HERB(v)/BOSC(h). 1200-1880 m. cc. VII-IX.
- Jasione crispa* (Pourr.) Samp. subsp. *crispa* Jasione nana. Yasione pirenaica. Botón azul rizado. Jasione ondulée. Jasione humble . PRAT(si). 1600-2680 m. c. VII-VIII.
- Jasione laevis* Lam. subsp. *laevis* Jasione perenne. -. Jasione lisso. Smooth Sheepsbit. PRAT (ac). 1780-2660 m. r. VIII-IX.
- Jasione montana* L. Guardora de muntanya. Té de monte. Jasione des montagnes. Sheep's bit scabious. PRAT(si). 1200-2000 m. cc. VI-VIII. MED.
- Phyteuma charmelii* Vill. Fiteuma de roca. -. Raiponce de Charmeil. -. ROC(r) (ca). 1880 m. rrr. VII.
- Phyteuma globulariifolium* Sternb. & Hoppe subsp. *pedemontanum* (Rich. Schulz) Greuter, Burdet & G. Long Fiteuma globularifòlia. -. Raiponce du Piémont. Rosette-leaved rampion. PRAT(ac)/ROC(ac). 2620-2800 m. I-IX. PRO.
- Phyteuma hemisphaericum* L. Fiteuma hemisfèrica. Fiteuma alpina. Raiponce hémisphérique. Globe-headed rampion. PRAT(ac),ROC(ac). 1700-2800 m. ccc. VI-IX
- Phyteuma nigrum* F.W.Schmidt (sub *Phyteuma halleri* All.). Error.
- Phyteuma orbiculare* L. Fiteuma orbicular. Fiteuma de prado. Raiponce orbiculaire. Round-headed rampion. PRAT(ca). 1250-2000 m. r. VI-VIII.

Phyteuma spicatum L. Fiteuma d'espiga. -. Raiponce en épi. Spiked Rampion. BOSC(h), HERB(v,m). 1300-2000 m. c. VI-VIII

Cannabaceae

Humulus lupulus L. Llúpol. Lúpulo. Houblon. Common hop. BOSC(br). 1220-1260 m. rrr. VII-VIII.

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L. Xuclamel alpí. -. Lonicéra des Alpes. Cherry woodbine. BOSC (ca). 1600-1880 m. rr. VI-VII.

Lonicera nigra L. Xuclamel negre. Madreselva negra. Chèvrefeuille noir. Black-fruited honeysuckle. BOSC(h). 1350-1820 m. ccc. V-VII.

Lonicera pyrenaica L. subsp. *pyrenaica* Xuclamel de roca. Madreselva pirenaica. Chèvrefeuille des pyrénées. Pyrenean honeysuckle. ROC(ca). 1320-2300 m. c. V-VII.

Lonicera xylosteum L. Xuclamel santjoaner. Madreselva. Chèvrefeuille des haies. Fly honeysuckle. BOSC.. 1200-1840 m. c. V-VII.

Caryophyllaceae

Arenaria aggregata (L.) Loisel. subsp. *aggregata* [A. *tetraquetra* L. subsp. *condensata* Arcang.] Arenària de coixinet. Arenaria aglomerada. Sabline capitée. Sandwort. PRAT(r,ca). 1800 m. rrr. VII.

Arenaria grandiflora L. subsp. *grandiflora* Arenària de flor gran. Hierba de la piedra. Sabline à grandes fleurs. Large-flowered Sandwort. PRAT(r,s). 1800-2780 m. cc. VI-VIII.

Arenaria hispida L. Error.

Arenaria marschlinsii W.D.J. Koch -. -. Sabline de Marschlins. -. ROC(t). 2420-2780 m. rrr. VI-VII. PROT. AME/NT..

Arenaria serpyllifolia L. Arenària. Arenaria común. Sabline des murs. Thime-leaved sandwort. PRAT(a). 1200-2060 m. cc. IV-VI.

Atocion rupestre (L.) Oxelman [Silene rupestris L.] Patacs petits. Silene rupestre. Silène des rochers. Rock campion. ROC(r,t)/PRAT(a)(si). 1420-2760 m. cc. VI-VIII.

Cerastium alpinum L. var. *alpinum* Cerasti alpí. Pamplinillas de los borreguiles. Céraiste des alpes. Alpine mouse ear. PRAT(s,r). 2600 m. rr. VI-VIII.

Cerastium alpinum L. var. *nevadense* Pau [C. *alpinum* L. subsp. *lanatum* (Lam.) Asch. et Graebn.; C. *alpinum* var. *lanatum* (Lam.) Benth.] Cerasti alpí. Pamplinillas de los borreguiles. Céraiste des alpes. Alpine mouse ear. PRAT(s,r). 1920-2800 m. cc. VI-VIII.

Cerastium alpinum L. var. *glabratum* Wahlenb. [C. *alpinum* subsp. *glabratum* (Hartm.) A. Love & D. Love] Cerasti alpí. Pamplinillas de los borreguiles. Céraiste des alpes. Alpine mouse ear. PRAT(s,r). 2100 m. rrr. VI-VIII.

Cerastium alpinum L. var. *glanduliferum* W.D.J.Koch [C. *alpinum* subsp. *squalidum* (Ramond) Hultén; C. *alpinum* var. *squalidum* (Ramond) E.Rico] Cerasti alpí. Pamplinillas de los borreguiles. Céraiste des alpes. Alpine mouse ear. PRAT(s,r). 2800 m. rr. VI-VIII..

Cerastium arvense L. -. Oreja de ratón. Céraiste des champs. Field chickweed. PRAT/MAT (ac). 1400-2200 m. cc. VI-VII.

Cerastium cerastoides (L.) Britton -. -. Céraiste à trois styles. -. AQUA(c,f). 2300-2650 m. r. VVII-VIII.

Cerastium fontanum subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet [C. *fontanum* subsp. *triviale* (E.H.L.Krause) Jalas] Cerasti de Font. -. -. PRAT(h)/AQUA(j). 1220-2000 m. cc. VI-VII.

Cerastium glomeratum Thuill. Pelovella. -. Céraiste aggloméré. Sticky mouse-ear. PRAT(a). 1240 m. rr. III-V.

Cerastium pumilum Curtis [C. *pumilum* subsp. *pallens* (F.W. Schultz) Schinz et Thell] Cerasti menut. -. Céraiste nain. -. PRAT(a). 1240 m. rrr. VI.

- Cerastium pyrenaicum* J. Gay Cerasti pirinenc. -. Céraiste des pyrénées. -. ROC(t). 2400-2700 m. r. VII-VIII.
- Cerastium semidecandrum* L. Cerasti semidecandre. -. Céraiste des sables. -. PRAT(a). 1220 m. rrr. V
- Cherleria laricifolia* (L.) Iamonico subsp. *diomedis* (Braun-Blanq.) A.J. Moore & Dillenb. [*Minuartia laricifolia* (L.) Schinz subsp. *diomedis* (Braun-Blanq.) Mattf.] Minuartia laricifolia. -. Alsine de Diomède. Larch-leaf sandwort. ROC(r)/PRAT(r). 1240-2230 m. c. VII-IX.
- Cherleria sedoides* L. [*Minuartia sedoides* (L.) Hiern] Herba de la penya. -. Minuartie faux orpin. Ciphel. PRAT(c,ac). 2050-2750 m. c. VII-VIII.
- Dianthus armeria* L. subsp. *armeria* Clavell de bosc. Clavelina de montaña. Oeillet arméria. Deptford pink. PRAT/HERB(v)(si). 1220-1320 m. rr. VII-VIII.
- Dianthus carthusianorum* L. . -. -. PRAT 1200-1500 m. r. VII.
- Dianthus deltoides* L. Clavell deltoide. Clavelina de prado. Oeillet couché. -. PRAT(ac,h). 1550-2500 m. cc. VI-VIII.
- Dianthus hyssopifolius* L. subsp. *hyssopifolius* [*D. monspessulanus* L.] Clavell/Clavell de pastor. Clavel de monte. Oeillet de montpellier. -. PRAT/HERB(v). 1200-2550 m. cc. AUS.
- Dianthus seguieri* Vill. subsp. *requienii* (Godr.) Bernal, M. Laínz & Muñoz-Garm. [*D. seguieri* subsp. *cadevallii* (Sennen & Pau) O. Bolòs & Vigo; *D. seguieri* subsp. *gautieri* (Sennen) Tutin] Clavell de bosc/Clavell de muntanya. -. Oeillet de seguier. Seguier's pink. PRAT. 1200-1800 m. cc.VII-VIII.
- Dianthus superbus* L. Error.
- Dianthus sylvestris* Wulfen. Error.
- Dianthus vigoi* M. Laínz [*D. seguieri* subsp. *vigoi* (M. Laínz) O. Bolòs] PRAT. 1780-2550 m. c.
- Gypsophila repens* L. DUBT.DET.
- Herniaria alpina* Chaix Herniària alpina. -. Herniaire des Alpes. -. ROC(t). 2500 m. rrr. VII. PROT. AME/NT.
- Herniaria glabra* L. Herba de les mil granes/Cent-en-grana. Hierba de la piedra. Herniaire glabre. Rupture wort. PRAT(a)/RUD(t). 1230-1480 m. r. V-IX.
- Holosteum umbellatum* L. Holosti. Estrellada. Holostée en ombelle. Umbellate chickweed. PRAT(a)/ARV. 1240-1280 m. rrr.
- Minuartia recurva* (All.) Schinz & Thell. Minuàrtia recurvada. Minuartia arqueada. Minuartie recourbée. Sickle leaved sandwort. PRAT(si). 1500-2680 m. cc. VI-VIII.
- Minuartia rostrata* (Pers.) Rchb. [*M. rubra* (Scop.) McNeill subsp. *rostrata* (Pers.) M. Laínz] -. -. Minuartie à rostre. -. ROC(r,m). 1340-2020 m. rrr. VIII.
- Moehringia ciliata* (Scop.) Dalla Torre Citada a prop.
- Moehringia muscosa* L. Herba prima. -. Sabline des mousses. -. ROC(r,m). 1200-1980 m. c. VI-VII.
- Moehringia trinervia* (L.) Clairv. Herba prima. Arenaria trinervia. Sabline à trois nervures. Three-nerved sandwort. BOSC(h). ROPC(r). 1240-1670 m. c. V-VII.
- Myosoton aquaticum* (L.) Moench Morró d'aigua. Cerastio acuático. Céraiste d'eau. Water starwort. AQUA(c)/BOSC(br). 1220 m. rrr. VII.
- Paronychia kapela* subsp. *serpyllifolia* (Chaix) Graebn. Sanguinària/Herba sanguinària. -. Paronyque à feuilles de serpolet. -. PRAT(s,r).ROC. 1240-2560 m. c.
- Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC. Paroníquia poligonifòlia, Sanguinària. -. Paronyque à feuilles de renouée. -. ROC(t). 1940-2670 m. r. VII-VIII.
- Petrorhagia prolifera* (L.) P.W. Ball & Heywood Clavellet prolífer. Clavelina seca. Oeillet prolifère. Proliferous pink. PRAT(a). 1200-1600 m. c. V-IX.
- Rabelera holostea* (L.) M.T. Sharples & E. Tripp [*Stellaria holostea* L.] Rèvola. Estrellada. Stellaire holostée. Greater stitchwort. HER(v,c)/MAT(g). 1200-2000 m. ccc. IV-VI.
- Sabulina verna* (L.) Rchb. subsp. *verna* [*Minuartia verna* (L.) Hiern] Minuàrtia vernal. Minuarcia de primavera. Sabline de printemps. Spring sandwort. PRAT(ac,r). 2160-2770 m. c. VI-VIII.
- Sagina alexandrae* Iamonico [*S. subulata* (Sw.) C. Presl, nom. illeg., non d'Urv.] Error.
- Sagina apetala* Ard. [*S. apetala* subsp. *ciliata* (Fr.) Hook. f.] Sagina apétala. -. Sagine apétale. -. RUD(t). 1240 m. rrr. VII.

- Sagina procumbens* L. Sagina procumbent. Sagina tendida. Sagine couchée. Procumbent pearlwort. RUD(t). 1220-2100 m. r. V-VII.
- Sagina saginoides* (L.) H. Karst. [*S. linnei* C.Presl] Sagina pirinenca. -. Sagine de Linné. -. AQUA(c,m,j,f,t). 2000-2500 m. rr. VI-VII
- Saponaria ocymoides* L. Falsa alfábrega. Saponaria. Saponaire des rochers. Rock soapwort. ROC(r,t). 1240-1720 m. c. V-VII.
- Saponaria officinalis* L. Herba sabonera/Sabonera. Saponaria. Saponaire officinale. Buncing bett, Soapwort. BOSC(br). 1200-1560 m. c. VI-IX.
- Scleranthus annuus* L. Esclerant. Esclerant anual. Escleranto anual. Gnavelle annuelle. Annual knawel. PRAT(a). 1220-1540 m. c. IV-VI.
- Scleranthus perennis* L. Esclerant. -. Scléranthe vivace. -. PRAT(a). 1360-1820 m. c. VI-VII.
- Scleranthus polycarpos* L. [*S. annuus* subsp. *polycarpos* (L.) Bonnier & Layens] -. -. -. -. PRAT(a). 1300-1720 m. c. V-VII.
- Silene acaulis* (L.) Jacq. Silene acaule. Silene musgo. Silène acaule, Silène sans tiges. Moss campion. PRAT(a). 2000-2900 m. cc. VI-VIII.
- Silene borderei* Jord. Silene de bordère. -. Silène de bordère. -. PRAT/ROC. 2240-2300 m. rrr. VIII.
- Silene ciliata* Pourr. subsp. *ciliata* Herba ronyonera/Patacs. Silene ciliada. Silène cilié. -. PRAT(ac). 1460-2700 m. VII-VIII..
- Silene dioica* (L.) Clairv. Melandri vermall. Silene dioica. Compagnon rouge. Red campion. HERB(c,v)/RUD(h). 1200-2060 m. c. VI-VII.
- Silene flos-cuculi* (L.) Clairv. subsp. *flos-cuculi* [*Lychnis flos-cuculi* L. subsp. *flos-cuculi*] Flor de cucut. Flor de cuclillo. Silène fleur de coucou. Cuckoo flower. PRAT(h). 1240 m. rrr. VI-VII.
- Silene gallica* L. Molinets. Carmentilla. Silène de France. Small-flowered Catchfly. PRAT(a). 1240-1380 m. rrr. V.
- Silene latifolia* Poir. [*S. alba* (Mill.) E. H. L. Krause subsp. *divaricata* (Reichb.) McNeill et Prentice] Colitxos. Cabacínas. Compagnon blanc. White campion. RUD(h). 1200-2000 m.
- Silene nutans* L. subsp. *nutans* [*S. nutans* subsp. *brachypoda* (Rouy) Graebn. & P. Graebn.] Silene nutan. Silene colgante. Silène penché. Nottingham Catchfly. HERB(v). 1200-1980 m. ccc. VI-VIII.
- Silene saxifraga* L. Herba prima. -. Silène saxifrage. -. ROC(r,ca). 1475-2020 m. rr. VI-VII.
- Silene vulgaris* (Moench) Garcke subsp. *vulgaris* Pets o esclafidors/Colitxos. Collejas. Silène enflé. Bladder campion. HERB(v)/RUD(h)/ROC(t). 1200-2080 m. ccc. VI-VIII.
- Silene vulgaris* (Moench) Garcke subsp. *prostrata* (Gaudin) Schinz & Thell. Pets/Esclafidors/Colitxos. Collejas. Silène enflé. Bladder campion. ROC(t). 2600 m. rr. VIII.
- Spergula arvensis* L. Espèrgula de camp. -. Spergule des champs. -. ARV(si). 1230-1400 m. r. VII.
- Spergularia rubra* (L.) J. Presl & C. Presl Herba passarella. Arenaria roja. Spergulaire rouge. Sandwort. RUD(t). 1220-2040 m. c. V-VIII.
- Stellaria alsine* Grimm Rèvola de molleric. Stellaire alsine. -. AQUA(f,m). 1400- 2000 m. r. VI-VII.
- Stellaria graminea* L. Rèvola menuda. Estelaria. Stellaire à feuilles de graminée. Common starwort. PRAT(h)/AQUA(j). 1200-1960 m. ccc. VI-VII.
- Stellaria media* (L.) Vill. Morró. Yerba pajarera. Morgeline. Chickweed. RUD. 1200-2100 m. ccc. III-VIII.
- Stellaria neglecta* Weihe [*S. media* subsp. *major* Arcang.] -. -. Grande Stellaire. -. RUD/HERB(c). 1220-1780 m. rr. VI.
- Stellaria nemorum* subsp. *montana* (Pierrat) Berher [*S. nemorum* L. subsp. *glochidisperma* Murb.] -. -. -. -. BOSC(h,br). 1260-1520 m. rrr. V-VII.
- Viscaria alpina* (L.) Don [*Lychnis alpina* L.] Licnis alpina. -. Silène de suède. -. PRAT(si). 2270 m. rrr. VII.

Celastraceae

Parnassia palustris L. subsp. *palustris* Fetgera blanca. Parnasia. Parnassie des marais. Grass of Parnassus. AQUA(f,m)/PRAT(h). 1200-2700 m. cc. VII-IX.

Cistaceae

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr. ROC(ca). 1560 m. rrr. VI.

Helianthemum apenninum (L.) Mill. subsp. *apenninum* DUBT.DET. O AL/AC.

Helianthemum nummularium (L.) Mill. [*H. nummularium* subsp. *pyrenaicum* (Janch.) Hegi; *H. nummularium* subsp. *tomentosum* auct.] Morenella/Heliantem nummular. Jarilla europea. Herbe d'or. Rockrose. MED. PRAT. 1200-2700 m. ccc. V-VIII.

Helianthemum oelandicum subsp. *alpestre* (Jacq.) Ces. [*H. oelandicum* subsp. *italicum* sensu O. Bolòs & Vigo; *H. oelandicum* var. *hirtum* sensu O. Bolòs & Vigo] -. - . - . PRAT(s)/ROC (ca). 1700-2480 m. rr. VII-VIII.

Helianthemum oelandicum subsp. *italicum* (L.) Ces. Herba passerella. Jarilla. -. - . PRAT(s,r). 1220- 1980 m. c.V-VII.

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L. Corretjola. Campanilla europea. Liseron des champs. Field bindweed. 1200-1680 m. c. V-VIII.

Convolvulus sepium L. [*Calystegia sepium* (L.) R. Br.] Corretjola gran. Correhuela mayor. -. - . 1200-1280 m. rrr. VI-VIII.

Cuscuta epithymum (L.) L. Cabells. Cabello de monte. Cuscuta. Great dodder. PRAT/MAT. 1220-1880 m. cc. VI-X.

Cuscuta europaea L. Cabells. Cabello de monte. Cuscuta. Great dodder. RUD(h). 1220-2020 m. c. VI-VIII.

Cornaceae

Cornus sanguinea L. Sanguinyol. Cornejo. Cornouiller sanguin. Dogwood. BOSC/MAT(b). 1200-1440 m. c. VI-VII.

Crassulaceae

Hylotelephium maximum (L.) Holub [*Sedum maximum* (L.) Suter; *S. telephium* L. subsp. *maximum* (L.) Schinz] -. - . - . ROC(m,r)/HERB(v) (si). 1300-1660 m. r. VII-VIII.

Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba [*Sedum telephium* L.; *S. telephium* L. subsp. *fabaria* (Koch) Kirschl.] Herba grassa/Bàlsam. -. Orpin à feuilles de fève. -. ROC(r)/HERB(v). 1600-1980 m. rr. VII-IX.

Petrosedum montanum (E. P. Perrier & Songeon) Grulich [*Sedum montanum* E. P. Perrier & Songeon subsp. *montanum*, *S. rupestre* subsp. *montanum* (E. P. Perrier & Songeon) Hegi & Em. Schmid.] Ramiol Crespinell muntanyenc. Siempreviva de montaña. Orpin des montagnes. -. ROC(m,t),PRAT(r). 1200-2100 m. r. VII-VIII.

Petrosedum reflexum (L.) Grulich [*Sedum rupestre* subsp. *reflexum* (L.) Hegi & Em. Schmid, *S. rupestre* L.] Crespinell rupestre. Siempreviva menor. Orpin des rochers. Reflexed stonecrop. ROC(m,t)/PRAT(a). 1200-2100 m. cc. VI-VIII.

Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich subsp. *sediforme* [*Sedum sediforme* (Jacq.) Pau] Crespinell gros. Trigo pollo. Orpin de Nice. Pale stonecrop. ROC(m,t)/PRAT(a). 1200-1560 m. cc. VI-VIII.

Rhodiola rosea L. [*Sedum roseum* (L.) Scop.] Error.

Sedum acre L. subsp. *acre* ROC(m)/PRAT(r). 1200-2000 m. Crespinell groc. Siempreviva picante. Orpin âcre. Common stonecrop. PRAT(a)/ROC(m). 1200-1560 m. c. VI-VIII.

- Sedum album* L. Arròs de paret/Arròs. Pan de cuquiello. Orpin blanc. White stonecrop. ROC(m)/PRAT(r). 1220-2060 m. cc. VI-VII.
- Sedum alpestre* Vill. Crespinell alpestre. Pampajarito alpino. Orpin alpestre. Alpine stonecrop. AQUA(c)/ROC(t,h). 2200-2600 m. r. VII-VIII.
- Sedum anglicum* Huds. [*S. anglicum* subsp. *pyrenaicum* Lange] Crespinell. Pampajarito pirenaico. Orpin d'angleterre. English stonecrop. ROC(t)/PRAT(a). 2000-2700 m. r. VII-VIII.
- Sedum annum* L. Crespinell anual. Uva de moro. Orpin annuel. Annual stonecrop. PRAT(r). 1380-2100 m. c. VI-VII.
- Sedum atratum* L. Crespinell oscuro. Pampajarito oscuro. Orpin noirâtre. Dark stonecrop. ROC(t)/PART(a) (ca). 2100-2780 m. c. VII-VIII.
- Sedum brevifolium* DC. Crespinell. Pampajarito rojo. Orpin à feuilles courtes. Hort-leaved stonecrop. ROC(m,r)/PRAT(a). 1200-2500 m. VI-VIII.
- Sedum candolleanum* G. López [*Mucizonia sedoides* (DC.) D.A. Webb] Crespinell de congestera. -. Orpin de candolle. -. AQUA(c). 2300-2800 m. r. VII-IX.
- Sedum cepaea* L. -. -. -. -. ROC(m). 1220 m. rrr. VI.
- Sedum dasypphyllum* L. - Arròs de paret. Pampajarito glauco. Orpin à feuilles épaisses. Corsican stonecrop. ROC(m). 1200-2100 m. c. VI-VIII.
- Sedum hirsutum* All. subsp. *hirsutum* Crespinell pelut. Pampajarito peloso. Orpin hirsute. Hairy stonecrop. ROC(r). 1200-2200 m. c. V-VII.
- Sedum villosum* L. Crespinell pilós. Pampajarito de humedal. Orpin velu. -. AQUA(f,m). 1600-1300 m. r. VII-VIII.
- Sempervivum arachnoideum* L. Matafoc teranyines. Siempreviva de telarañas. Joubarbe-araignée. Cobweb house-leek. ROC(m)/PRAT(a). 1200-2300 m. c. VII-IX.
- Sempervivum montanum* L. subsp. *montanum* Matafoc/Cebes. Siempreviva. Joubarbe des montagnes. Mountain hends and chicks. ROC(m)/PRAT(a). 1300-2800 m. c. VII-VIII.
- Sempervivum tectorum* L. subsp. *tectorum* Matafoc. Siempreviva de muros. Joubarbe des toits. Jupiter's beard. ROC(m). 1200-2560 m. r. VII-VIII.
- Sempervivum ×barbulatum* Schott [*S. arachnoideum* × *S. montanum*] sub. *Sempervivum x cerdanum* Gaut. 2000 m. rrr.
- Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy subsp. *rupestris* Barretets de paret/Llombrígil de venus. Ombligo de venus. Ombilic de Vénus. Pennywort. ROC(m). cc. 1200-1500 m. c. VI-VII.

Cucurbitaceae

- Bryonia cretica* L. subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin [*B. dioica* Jacq.] Carabassina. Nuez, -. -. RUD(h)/MAT(b). 200-1540 . c. V-VIII.
- Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai Xíndria. Sandía. Melon d'eau. Watermelon. ARV/RUD/BOSC(br). 1240-1380 m. rr. VIII.

Dipsacaceae

- Dipsacus fullonum* L. Escardot/Cardó. Cardencha. -. -. RUD(h). 1200-1560 m. c. VI-VIII.
- Dipsacus pilosus* L. -. Triquitraco. Cardère poilue. -. RUD(h)/BOSC(br). 1200-1320 m. rrr. VII-VIII.
- Knautia arvensis* (L.) Coult. HERB(v). 1200 m. rrr.
- Knautia collina* (Guérin) Jord. [*K. arvensis* subsp. *collina* (Duby) Schübl. & G. Martens; *K. arvensis* subsp. *meridionalis* (Briq.) O. Bolòs & Vigo] Escabiosa borda. Escabiosa. Scabieuse des champs. -. HERB(r). 1220 m. rrr. VII.
- Knautia lebrunii* J. Prudhomme [*K. godetii* subsp. *lebrunii* (J. Prudhomme) O. Bolòs & Vigo; *K. dipsacifolia* subsp. *font-queri* Carrillo Ortuño & Ninot; *K. godetii* auct.] -. -. Knautie de godet. -. HERB(m). 1780-2200 m. rr. VI-IX.

- Knautia nevadensis*** (Szabó) Szabó [*Knautia dipsacifolia* Kreutzer subsp. *arvernensis* (Briq.) O. Bolòs et Vigo; *K. arvernensis* (Briq.) Szabó subsp. *arvernensis*] Escabiosa. -.-. BOSC/HERB(v)/PRAT 1200-2000 m. cc. VI-IX.
var. *nevadensis* [*K. arvernensis* (Briq.) Szabó; *K. dipsacifolia* f. *angustata* (Rouy) O. Bolos & Vigo; *K. arvensis* var. *involucrata* O. Bolos & Vigo, nom. illeg.] HERB(v)/PRAT 1280-1600 m. cc. VI-IX.
var. *lanceolata* (Pau) Devesa, Ortega Oliv. & J. Lopez [*K. catalaunica* Szabó; *K. dipsacifolia*. subsp. *catalaunica* (Szabó) O. Bolos & Vigo] HERB(v). 1450 m. rrr. VII.
- Knautia subscaposa*** Boiss. & Reut. [*K. arvensis* (L.) Coult. subsp. *subscaposa* (Boiss. & Reut.) Maire] Escabiosa. -.-. PRAT(h). 1200-1840 m. r. VI-IX.
- Scabiosa cinerea*** Lam. [*S. columbaria* subsp. *cinerea* (Lam.) Font Quer; *S. pirenaica* auct., non All.] Error.
- Scabiosa columbaria*** L. Escabiosa/Escapiosa. Escabiosa. Scabieuse colombaire. Small scabious. subsp. *affinis* (Gren. & Godr.) Nyman [*S. columbaria* subsp. *gramuntia* Bonnier & Layens, nom. illeg.] PRAT. 1200-1800 m. cc. VI-IX.
- subsp. *columbaria* PRAT. 1200-2200 m. r. VII-IX.
- Succisa pratensis*** Moench - AQUA(j,m)/PRAT(h). 1200-2100 m. cc. Escabiosa/Escabiosa mossegada. Escabiosa mordida. Mors-du-diable. Devil's bit scabious. AQUA(j,m)/PRAT(h). 1220-2020 m. ccc. VII-IX.

Droseraceae

Drosera rotundifolia L. Citada del Costabona (Companyó), probablement fora del municipi.

Ericaceae

- Arctostaphylos uva-ursi*** (L.) Spreng. Boixerola. Gayuba. Raisin-d'ours commun. Bearberry. MAT(n)/BOSC(per). 1400-2400 m. r. VI-VIII.
- Calluna vulgaris*** (L.) Hull Brossa/Bruguerola. Brecina. Callune. Heather. MAT/PRAT (ac). 1200-2620 m. VIII-X. ccc.
- Empetrum nigrum*** L. subsp. *hermaphroditum* (Hagerup) Böcher Èmpetrum. -.-. MAT. 2180-1270 m. VI. rrr.
- Hypopitys hypophegea*** (Wallr.) G. Don [*Monotropa hypophegea* Wallr.; *M. hypopitys* var. *glabra* Roth] Xuclapins. -.-. BOSC(h). 1340 m. rr. VI.
- Hypopitys monotropa*** Crantz [*Monotropa hypopitys* L.] BOSC(h). 1620-1780 m.r. VII.
- Kalmia procumbens*** (L.) Galasso, Bansi & F. Conti [*Loiseleuria procumbens* (L.) Desv.] Herba pedrera. Azalea alpina. Azalée couchée. -. MAT. 2080-2600 m. r. VI-VII.
- Moneses uniflora*** (L.) A. Gray [*Pyrola uniflora* L.] Pírola uniflora. -. Pirole à une fleur. -. BOSC(per,ca). 1320-1780 m. r. VI-VII.
- Pyrola chlorantha*** Sw. Pírola de flor verda. -.-. BOSC(per). 1340-1720 m. c. VI-VII.
- Pyrola minor*** L. Pírola petita. Peralito menor. Petite pirole. Small shinleaf. BOSC(per,h). 1420-2000 m. r. VI-VIII.
- Rhododendron ferrugineum*** L. Neret. Rododendro. Rhododendron ferrugineux. Alpenrose. 1200-2750 m. cc. VI-VII.
- Vaccinium vitis-idaea*** L. subsp. *vitis-idaea* Citada però no retrobada. Existeix a prop.
- Vaccinium myrtillus*** L. Nabiu. Aràndano. Myrtille. -. MAT(n)/BOSC(per) (si). 1200-2800 m. cc. VI-VII.
- Vaccinium uliginosum*** L. Nabiu uliginós. -. Myrtille des marais. Bog bilberry. MAT/BOSC/AQUA(c). 1800-2800 m. c. VI-VII.

Euforbiaceae

- Euphorbia amygdaloides*** L. subsp. *amygdaloides* Lleteresa de bosc. Lechetreznà del bosque. Euphorbe des bois. Wood spurge. BOSC/HERB(v). 1200-1600 m. c. V-VI.

- Euphorbia cyparissias* L. Lletera de fulla estreta. Lechetreznà comú. Euphorbe petit-cyprès.
-. PRAT. 1200-2200 m. cc. V-VI.
- Euphorbia exigua* L. subsp. *exigua* -. Lechetreznà romeral. -. -. PRAT(a)/ARV. rrr. VI.
- Euphorbia helioscopia* L. subsp. *helioscopia* Lleterola d'hort. Lechetreznà. Euphorbe réveille-matin, Sun spurge. ARV/RUD. 1200-2000 m. c. IV-IX.
- Euphorbia lathyris* L. Herba talpera. Tártago. Euphorbe épurge. Caper spurge. ARV. 1220-1260. rr. VI. AL/AC.
- Euphorbia nicaeensis* All. subsp. *nicaeensis* Lleteresa. -. -. -. Prat(s). 1240-1580 m. c. VI-VII.
- Euphorbia peplus* L. RUD(t). 1240-1320 m. r. VI-IX.
- Euphorbia prostrata* Aiton [*Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small] -. -. -. RUD(t). 1220-1250 m. r. VI. AL/ESP.
- Euphorbia serrata* L. f. *phylloclada* (Lge. in Wk. et Lge.) O. Bolòs et Vigo PRAT(r). 1240 m. rrr. VI.
- Euphorbia villosa* Willd. Lleteresa pilosa. -. Euphorbe poilue. -. HERB(c). 1220-1240 m. rrr. VI.
- Mercurialis annua* L. Melcoratge. Malcoraje. Mercuriale annuelle. -. ARV/RUD. 1200-1780 m. c. III-VI.
- Mercurialis perennis* L. Melcoratge de bosc. Berza perruna. Mercuriale vivace. -. 1220-1980 m. c. IV-VI.

Fabaceae

- Anthyllis montana* L. Antil·lis de muntanya. -. Anthyllide des montagnes. Mountain kidney vetch. ROC/PRAT. 1450-2225 m. r. V-VI.
- Anthyllis vulneraria* subsp. *alpestris* (Schult.) Asch. & Graebn. [*A. vulneraria* subsp. *boscii* Kerguélen; *A. vulneraria* subsp. *pyrenaica* (Beck) Cullen; *A. dillenii* Schult. ex Steud.] Citada a PRAT(ca), 1880-2450 m, rrr, però alguna de les citacions no correspon. Caldria comprovar la seva presència. DUBT.DET.
- Anthyllis vulneraria* subsp. *sampaioana* (Rothm.) Vasc. [*A. vulneraria* subsp. *foronae* (Sennen) Cullen] Vulnerària. Vulneraria. Anthyllide vulnéraire. Common Kidneyvetch. PRAT(s) 1200-1920 m. c. VI-VII.
- Anthyllis vulneraria* subsp. *vulnerarioides* (All.) Arcang. Vulnerària alpina. Vulneraria. Anthyllide fausse vulnéraire. -. PRAT(ca). 1670-2660 m. c. VI-VII.
- Astragalus alpinus* L. [*A. monspessulanus* subsp. *monspessulanus* var. *alpinus* Foucault] -. -. -. -. PRAT(ca) 2000-2700 m. rr. VII-VIII.
- Astragalus australis* (L.) Lam. -. -. -. -. PRAT(ca). 1750-2600 m. r. VII-VIII.
- Astragalus australis* var. *gerardii* (Vill.) Coulot & Rabaute [*Phaca gerardii* Vill.]. Error.
- Astragalus glycyphyllos* L. Regalíssia borda. Regaliz borde. Astragale réglisse. Wild Liquorice. BOSC(h)/HERB(v). 1340-1400 m. rrr. V-VI.
- Astragalus monspessulanus* subsp. *gypsophillus* Rouy [*A. monspessulanus* L. subsp. *chlorocyaneus* (Boiss. & Reut.) Rivas Goday & Borja] Herba de sant Llorenç. Astrágalo espigado. Astragale de montpellier. False vetch. PRAT(s)/ROC(r). 1240-1820 m. c. V-VI.
- Astragalus monspessulanus* L. subsp. *monspessulanus* Herba de sant Llorenç. Astrágalo espigado. Astragale de montpellier. False vetch. PRAT(s)/ROC(r). 1280 m. rrr. VII.
- Astragalus sempervirens* Lam. [*A. sempervirens* subsp. *catalaunicus* (Braun.-Blanq.) M. Laínz] -. -. -. -. PRAT/ROC(ca). r. 1500-2700 m VI-VII.
- Coronilla minima* L. subsp. *minima* Coroneta de fulles menudes. -. Coronille naine. -. PRAT(s,ca). 1400-2020 m. r. VI.
- Cytisophyllum sessilifolium* (L.) O. Lang [*Cytisus sessilifolius* Mill.]. Ginesta sessilifòlia. -. Cytise à feuilles sessiles. -. ROC(ca). 1700 m. rrr. VI.
- Cytisus oromediterraneus* (G. López & C.E. Jarvis) Rivas Mart., T.E. Díaz, Fern. Prieto, Loidi & Penas [*Genista balansae* (Boiss.) Rouy subsp. *europaea* (G. López et C. E. Jarvis) O. Bolòs et Vigo] Bàlec. Piorno. Génét purgatif. Pyrenean broom. MAT(s). 1600-2400 m. cc. V-VII.
- Cytisus scoparius* (L.) Link subsp. *scoparius* [*Sarrothamnus scoparius* (L.) Wimm. subsp. *scoparius*] Ginesta/Ginestell. Retama de escobas. Genêt à balais. Broom. MAT(b,g). 1200-1600(1950) m. cc. IV-VII.

- Ervilia hirsuta*** (L.) Opiz [*Vicia hirsuta* (L.) Gray] HERB(v)/RUD(h). 1220-1980 m. cc.VI-VII.
- Genista hispanica*** L. subsp. *hispanica* - . - . - PRAT(s)/ROC (ca). 1500-1800 m. rr. V-VI.
- Genista pilosa*** L. Ginestola pilosa. Ginestola. Genêt velu. Gold flash broom. PRAT/MAT/ROC(ac).1220-2000 m. cc.V-VII.
- Genista sagittalis*** L. [*Chamaespartium sagittale* (L.) P.E. Gibbs subsp. *sagittale*] Itjol/Gaiol, Abulaga. Genistrella. Arrow-jointed broom. PRAT/MAT(ac). 1200-2260 m. c. V-VII.
- Genista scorpius*** (L.) DC. Argelaga. - . - . PRAT(s,ca). 1400-1720 m. rr. IV-VI
- Hippocrepis comosa*** L. Desferracavalls. Herraduras. Hippocrépide chevelue. Horseshoe vetch. PRAT(s). 1220-2450 m. c. V-VI.
- Hippocrepis emerus*** (L.) Lassen subsp. *emerus* [*Coronilla emerus* L.] Coronil·la boscana. Aliagueto. Coronille des jardins. False senna. BOSC(s). 1220-1560 m. c. V-VI.
- Lathyrus aphaca*** L. Gerdell. Arvejo. Gesse aphaca. Yellow vetchling. ARV. 1240-1280 m. rr. V-VI.
- Lathyrus cirrhosus*** Ser. Pèsol cirrós. - . Gesse à vrilles. Cirrhose Vetchling. HERB(v)/MAT(b). 1400-1900 m. rrr. VI-VIII.
- Lathyrus latifolius*** L. Pèsol bord. Albejana basta. Gesse à larges feuilles. Perennial sweet pea. HERB(v). 1240-1280 m. rr. VI-VII.
- Lathyrus linifolius*** (Reichard) Bässler [*L. montanus* Bernh.] Guixó de muntanya. - . Gesse à feuilles de lin. - . BOSC/MAT/HERB(v)(ac). 1220-2080 m. cc. V-VIII.
- Lathyrus occidentalis*** (Fisch. & C.A. Mey.) Fritsch [*L. laevigatus* (Waldst. et Kit.) Gren.] Guixó groc. - . - . BOSC(h)/HERB(v,m). 1340-1980 m. r. VI-VII.
- Lathyrus pratensis*** L. Guixó de prat. Latiro de prado. Gesse des prés. Meadow pea. PRAT(h) AQUA. 1200- 2080 m. cc. VI-VIII.
- Lathyrus vernus*** (L.) Bernh. Guixó vernal. - . - . BOSC(h)/HERB(v). 1430-1780 m. rr. V-VI.
- Lotus alpinus*** (DC.) Ramond [*Lotus corniculatus* L. subsp. *alpinus* (DC.) Rothm.] Corona de rei. Cuernecillo alpino. Lotier des alpes. Alpine bird's-foot trefoil. PRAT. 1940-2750 m. cc. VI-VIII.
- Lotus corniculatus*** L. Banya de cabra/Corona de rei. Corona de rey. Lotier corniculé.Bird's foot trefoil. PRAT. 1200-2100 m. ccc.
- Lotus delortii*** F.W. Schultz [*L. corniculatus* subsp. *delortii* (F.W. Schultz) O. Bolòs & Vigo] - . - . Lotier de Delort. - . PRAT. 1350 m. rrr.VII.
- Lotus maritimus*** L. [*Tetragonolobus maritimus* (L.) Rothm.] . - . - . AQUA(m,j). 1440 m. rrr. V-VII.
- Lotus pedunculatus*** Cav. Lot d'aiguamoll. Cuernecillo de turbera. Lotier des des marais. Greater bird's- foot-trefoil. AQUA(j,m). 1320-1800 m. c. VI-VIII.
- Medicago arabica*** (L.) Huds. [*M. maculata* Willd.] Herba de la taca. Mielga pintada. Luzerne tachetée. Spotted bur-clover. PRAT/ARV/RUD(t). 1230-1460 m. rr. V. AL/INV.
- Medicago lupulina*** L. Fenarola menuda. Carretón. Luzerne lupuline. Black medick. PRAT(h). 1200- 2080 m. cc. V-VIII.
- Medicago minima*** (L.) L. Melgó mínim. Carretilla menor. Luzerne naine. Bur medick. PRAT(a). 1230-1620 m. r. V-VI.
- Medicago sativa*** L. subsp. *sativa* Userda/Alfals. Alfalfa. Luzerne cultivée. Alfalfa. RUD/ARV/HERB. 1200-1560 m. c. V-X. ESP.
- Medicago suffruticosa*** DC. Melgó fruticós. - . Luzerne sous-ligneuse. - . PRAT. 1260-2450 m. c. V-VIII.
- Melilotus albus*** Medik. Almegó blanc. Melilotto blanco. Mélilot blanc. White melilot. RUD(h). 1220-2000 m. c. VI-VII.
- Melilotus altissimus*** Thuill. Melilot altíssim. - . Grand mélilot. - . RUD(h). 1200-1470 m. r. VI-VIII.
- Melilotus officinalis*** (L.) Pall. Almegó oficial. Melilotto oficial. Mélilot officinal. Common melilot. RUD(h). c. VI-VIII.
- Onobrychis viciifolia*** Scop. Trepidella. - . - . HERB(r). 1260 m. rrr. VI. AL/SUB.
- Ononis cristata*** Mill. Gavó alpí. Garbancilla. Bugrane à crête. - . PRAT(r)/ROC(t) (ca). 1700-2300 m. rr. VII-IX.
- Ononis natrix*** L. . - . - . PRAT(s,r)/ROC(t) 1450-2000 m. r. VI-VIX.

- Ononis pusilla* L. subsp. *pusilla* . - . - . PRAT(r,s). 1450-1620 m. rr. VII-VIII.
Ononis rotundifolia L. . - . - . ROC(c)/PRAT(r). 1700 m. rrr.VII.
Ononis spinosa L. Gavó espinós. Gatuña. Bugrane épineuse. Spiny rest harrow. PRAT. 1220-1720 m. c. VI-VII.
Ononis striata Gouan PRAT(r)/ROC(r). 1450-2100 m. r. VII-IX.
Ornithopus perpusillus L. . - . - . PRAT(r). 1430 m. rrr. VI.
Oxytropis campestris (L.) DC. subsp. *campestris* Oxítrop campestre. -. Oxytropis des alpes. Yellow oxytropis. PRAT (s,r,ca). 1600-2500 m. cc. VI-VIII.
Oxytropis halleri Bunge subsp. *halleri* [*O. halleri* Bunge subsp. *halleri* var. *ochroleuca* Costa] Oxítrop de haller. Oxytropis azul. Oxytropis de haller. Purple Oxytropis. PRAT(s,r,ca). 1900-2800 m. c. VI-VIII.
Oxytropis pilosa (L.) DC. Error
Robinia pseudoacacia L. Escàcia. Falsa acacia. Robinier faux acacia. Black locust. BOSC/PRAT. 1200-1450 m. r. V-VI. AL/INV.
Trifolium alpinum L. Regalíssia/Regalíssia de muntanya. Regaliz de puerto. Trèfle alpin. Alpine clover. PRAT(h). 1650-2850 m. cc. VI-VIII.
Trifolium arvense L. Peu de llebre. Pata de liebre. Trèfle pied-de-lièvre. Stone clover. PRAT(a). 1200-1560 m. c. VI.
Trifolium aureum Pollich Trèvol daurat. Trébol de prado. Trèfle doré. Hop clover. PRAT/HERB(v). 1240-1800 m. r. VI-VII.
Trifolium badium Schreb. PRAT(h). 1980-2200 m. rrr. VII-VIII
Trifolium campestre Schreb. Fenarola. Trébol campesino.Trèfle des champs. Low hop clover. PRAT(s,a).1200-1860 m. cc. V-VIII.
Trifolium dubium Sibth. Trèvol menut. Trébol amarillo. Petit Trèfle jaune. Lesser trefoil. PRAT(h). 1200-1560 m. c. V-VI.
Trifolium incarnatum L. subsp. *incarnatum* trèfola, fenc, fe. . - . - . RUD(t). 1240 m. rrr. VI.
Trifolium medium L. subsp. *medium* Trèvol mitjà.Trébol de bosque. Trèfle flexueux. Zigzag clover. HERB(v). 1200-1800 m. c. VI-VII.
Trifolium montanum L. Trèvol de muntanya. Trébol de montaña. Trèfle des montagnes. Mountain clover. PRAT. 1230-2000 . c. VI-VIII.
Trifolium ochroleucon Huds. Trèvol ocroleuc. Trébol pálido. Trèfle jaune pâle. Sulphur clover. PRAT/HERB(v). c. V-VII.
Trifolium pallescens Schreb. ROC(t). 2200-2300 m. rrr. VIII.
Trifolium pratense L.
var. *pratense* Trèfola/Trèvol de prat. Trébol de prado. Trèfle des prés. Broad-leaved clover. PRAT(h). 1200-2200 m. ccc. V-IX.
var. *villosum* DC. in Lam. et DC. [var. *alpinum* Hoppe in Sturm; var. *nivale* Koch] PRAT(h, ca). 1890-2400 m. r. VII-IX.
Trifolium repens L. - Trefolet/Trevolet de prat. Trébol blanco. Trèfle blanc. White clover. PRAT(h)/RUD(t). 1200-2400 m. ccc. V-X.
Trifolium rubens L. HERB(v). - . - . 1480 m. rrr. VII.
Trifolium scabrum L. Trèvol escabre. Trébol áspero. Trèfle scabre. Rough clover. PRAT(a). 1240 m. rrr. VI.
Trifolium spadiceum L. . - . - . AQUA(m). 1770 m. rrr. VII.
Trifolium striatum L. subsp. *brevidens* (Lange) Munoz Rodr. - . - . - . PRAT(r).1240-1560 m. r. VI-VII.
Trifolium thalii Vill. . - . - . PRAT(ca).1920-2670 m. rr. VII-VIII.
Vicia angustifolia L. [V. sativa subsp. *nigra* (L.) Ehrh.] Veça. Veza. Vesce commune. Common vetch. PRAT/ARV/RUD(h). 1240- 1780 m. c. V-VI.
Vicia cracca L. [V. cracca subsp. *cracca*] - . - .- . HERB(c,v). 1350-1560 m. r. V-VII.
Vicia dasycarpa Ten. [V. villosa Roth subsp. *varia* (Host.) Corb.] Garlanda pilosa. -. Vesce bigarrée. Hairy vetch. ARV/RUD(h). 1200-1680 m. c. V-VII.
Vicia incana Gouan [V. cracca subsp. *incana* (Gouan) Rouy; V. *incana* subsp. *gerardii* Gaudin] Garlanda. Alverja. Vesce blanchâtre. Tufted vetch. HERB(v). 1460 m. rrr. VII.

- Vicia lathyroides* L. . -. -. -. PRAT. 1220 m. rrr. VI.
- Vicia onobrychoides* L. . -. -. -. HERB(v)/PRAT. 1260-1480 m. rr.VII.
- Vicia orobus* DC. * -. -. *Orobe des landes*. -. HERB(m). 1250-1940 m. rrr. VI.
- Vicia pseudocracca* Bertol. [V. villosa subsp. *pseudocracca* (Berol.) Rouy; V. villosa subsp. *ambigua* (Guss.) Kergueler] . -. -. ARV. 1240. rrr. VII.
- Vicia pyrenaica* Pourr. Arvellola pirinenca. Arveja de los Pirineo. Vesce des pyrénées. -. PRAT(s,ca). 1560-2460 m. cc. VI-VII.
- Vicia sativa* L. . -. -. ARV/RUD.1410 m. rrr. VI.
- Vicia sepium* L. Veça de bosc. Arveja silvestre. Vesce des haies. Bush vetch. HERB(v). 1200-2040 m. cc. V-VII.
- Vicia tenuifolia* Roth [V. cracca subsp. *tenuifolia* (Roth) Gaudin] HERB(v,c). 1260-1620 m. cc. VII-VIII.
- Vicia villosa* Roth [V. villosa Roth subsp. *villosa*] ARV. 1220-1230 m. rrr VI-VII.

Fagaceae

- Castanea sativa* Mill. Castanyer. *Castaño*. Châtaignier. Sweet Chestnut. BOSC(h). 1270-1310 m. rrr. VI-VII.
- Fagus sylvatica* L. Faig. Haya. Hêtre. Beech. BOSC(h). 1240-1700 m. r. IV-V.
- Quercus petraea* (Matt.) Liebl. Roure de fulla gran. Roble albar. Chêne sessile. Sessile oak. BOSC(s). 1220-1800 m. cc. V-VI.
- Quercus pubescens* Willd. [*Q. humilis* Mill.] Roure martinenc. Roble comú. Chêne pubescent. Downy oak. BOSC(s). 1450-1580 m. rr. IV-V.

Gencianaceae

- Blackstonia perfoliata* (L.) Huds. subsp. *perfoliata* Centaura groga. Centaurea amarilla. Chlore perfoliéée. Yellow-wort. PRAT(h)/AQUA(j). 1240-1600 m. rr. VI-VII.
- Centaurium erythraea* Rafn subsp. *erythraea* Herba de santa margarida. Centaura menor. Petite-centaurée commune. Common centaury. PRAT. 1540 m. rrr. VI.
- Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce AQUA(j). 1240 m. rrr. VII.
- Comastoma tenellum* (Rottb.) Toyok. [*Gentiana tenella* Rottb.] AQUA(c,ca). 1980-2740 m.rr. VII-IX.
- Gentiana acaulis* L. [*Gentiana acaulis* L. subsp. *acaulis*] Genciana/Genciana acaule. Genciana acaule. Gentiane acaule. Stemless gentian. PRAT(h). 1440-2400 m. cc. IV-VII.
- Gentiana alpina* Vill. Genciana alpina. -. Gentiane des Alpes. -. PRAT(ac). 1900-1760 m. c. VI-VIII.
- Gentiana burseri* Lapeyr. subsp. *burseri* Genciana de burser. Genciana amarilla. Gentiane de burser. -. MAT(n)/HERB(m). 1500-2400 m. c. VII-VIII. MED/ALI.
- Gentiana cruciata* L. Genciana cruciada. Genciana cruciada. Gentiane croisette. Cross gentian. PRAT(h)/HERB(v). 1500-1680 m. r. VII-VIII.
- Gentiana lutea* L. subsp. *lutea* Genciana/Genciana groga. Genciana amarilla. Gentiane jaune. Yellow gentian. PRAT(h). 1200-2280 m. cc. VI-VII. MED.
- Gentiana nivalis* L. Genciana nival. Genciana nival. Gentiane des neiges. Snow gentian. PRAT(ca). 1940-2400 m. rr. VII-X.
- Gentiana pneumonanthe* L. Gentiana d'aiguamoix. -. -. AQUA(m). 2000 m. EX RE. VII-X. PROT. AME/EN.
- Gentiana pyrenaica* L. Genciana pirinenca. Genciana pirenaica. Gentiane des pyrénées. Pyrenean gentian. PRAT(h). 1640-2400 m. cc. V-VIII.
- Gentiana utriculosa* L. Error.
- Gentiana verna* L. [*G. schleicheri* (Vacc.) Kunz; *G. terglouensis* subsp. *sleicheri* (Vacc.) Tutin] Pastorella. Genciana azul. Gentiane de printemps. Spring gentian. PRAT. 1200-2840 m. cc. IV-IX.

Gentiana ×marcaillhouana Rouy [G. lutea × G. burseri] MAT(n). 2080 m. rrr. VII.

Gentianella campestris (L.) Börner subsp. *campestris* [Gentiana campestris L. subsp. *campestris*] Genciana/Genciana campestre. Gencianela alpina. Gentiane des champs. Field gentian. PRAT(h). 1200-2800 m. cc. VI-IX.

Gentianopsis ciliata (L.) Ma subsp. *ciliata* [Gentiana ciliata L. subsp. *ciliata*; Gentianella *ciliata* (L.) Borkh.] Genciana ciliada. Genciana ciliada. Gentiane ciliée. Fringed gentian. PRAT(h). 1300-1880 m. r. VIII-X.

Swertia perennis L. Esvertia. Genciana morada. Swertie vivace. Star svertia. AQUA(m). 1980-2350 m. r. VII-IX.

Geraniaceae

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Agulles de bruixa. Aguja de pastor. Bec-de-grue à feuilles de ciguë. Common storks bill. ARV/RUD(t)/PRAT(a). 1200-2100 m. c. III-VII.

Geranium columbinum L. Gerani de colom. Geranio pie de paloma. Pied-de-pigeon. Long-stalked crane's-bill. RUD(h)/ARV/PRAT. 1200-1750 m. c. V-VIII.

Geranium dissectum L. Gerani de fulles retallades. Geranio recortado. Géranium découpé. Cut-leaf geranium. RUD(h). 1200-1580 m. r. V-IX.

Geranium molle L. Suassana blana. Geranio peloso. Géranium à feuilles molles. Dove's-foot crane's-bill. RUD. 1200-1450 m. IV-VI.

Geranium nodosum L. Gerani nuós. Geranio nodoso. Géranium à tige noueuse. Knotted cranesbill. BOSC(h). 1200-1380 m. rrr. VI-VII.

Geranium phaeum L. Gerani obscur. Geranio oscuro. Géranium brun.. Dusky cranesbill. HERB(c)/BOSC(h). 1250 m. rrr. VI-VII.

Geranium pratense L. Gerani de prat. Geranio de prado. Géranium des prés. Meadow geranium. PRAT(h)/HERB(m). 1550-1600 m. rrr. VI-VII.

Geranium pusillum L. RUD(t). 1240-1560 m. r. VII-IX.

Geranium pyrenaicum Burm. f. subsp. *pyrenaicum* Suassana pirinenca. Geranio pirenaico. Géranium des pyrénées. Pyrenean cranesbill. RUD/ HERB(v). 1200-2120 m. cc. V-IX.

Geranium robertianum L. Cicuta/Herba de Sant Robert. Geranio de San Roberto. Herbe à Robert. Herb Robert. ROC/HERB(v)(h). 1200-2000 m. cc. V-VIII.

Geranium rotundifolium L. Suassana rotundifolia. Sausana. Géranium à feuilles ronde. Round-leaved crane's-bill. RUD. 1200-1520 m. c. V-VII.

Geranium sanguineum L. Gerani sanguini. Geranio sanguíneo. Géranium rouge sang. Blood-red crane's-bil. HERB(v). 1520-1700 m. rrr. VI.

Geranium sylvaticum L. subsp. *sylvaticum* Gerani de bosc. Geranio de bosque. Géranium des forêt. Wood cranesbill. HERB(m,c,v)/PRAT(h). 1340-1980 m. c.

Gesneriaceae

Ramonda myconi (L.) Rchb. Orella d'ós. Oreja de oso. Ramondie des pyrénées. -. ROC(r). 1200-1800 m. rrr. VI.

Glossulariaceae

Ribes alpinum L. Cirerola. Grosellero de montaña. Groseillier des alpes. Alpine currant. MAT(n)/HERB(c,m). 1250-1880 m. c. V.VI.

Ribes petraeum Wulfen Grosella/Riber silvestre. Grosellero pirenaico. Groseillier des rochers. Rock red currant. BOSC/MAT(h). 1260- 1540 m. rr. V-VI.

Hipericaceae

Hypericum humifusum L. Hipèric humifús. -. Millepertuis couché. -. AQUA(j). 1500 m. rrr.

Hypericum maculatum Crantz subsp. ***maculatum*** Hipèric maculat. Hipérico no perforado. Millepertuis taché. Imperforate St, John's-wort. HERB(m,v,c)/PRAT/MAT(g). 1200-2200 m. ccc. VI-VII.

Hypericum montanum L. Hipèric muntanyenc. -. Millepertuis des montagnes. -. HERB(v)/BOSC. 1240-1620 m. c. VI-VII.

Hypericum perforatum L. Flor de cop/ Herba de Sant Joan. Hipericón. Millepertuis perforé. Perforate St. John's wort. HERB(v)/PRAT(s). ccc. 1200-2000 m. VI-VIII.

Hypericum tetrapterum Fr. Hipèric tetràpter. -. -. -. AQUA(j,c). 1220-1660 m. c. VI-VII.

Juglandaceae

Juglans regia L. Noguer. Nogal. Noyer. Walnut. BOSC(h). 1240 m. rr. V. AL/ESP.

Lamiaceae

Ajuga genevensis L. Error.

Ajuga pyramidalis L. subsp. ***pyramidalis*** Bújula piramidalis. Búgula piramidal. Bugle pyramidale. Pyramidal buble. PRAT/MAT(n). 1560-2330 m. c. VII-VIII.

Ajuga reptans L. Búgula. Consuelda media. Bugle rampante. Bugleweed. BOSC(h). 1220-1780 m. r. IV-V.

Ballota nigra L. [*B. nigra* subsp. *foetida* (Vis.) Hayek] Malrubí nere. Manrubio bastardo. -. -. RUD(h). 1240- 1620 m. c. VI-VII.

Betonica officinalis L. [*Stachys officinalis* (L.) Trevisan] Betònica. Betónica. Bétoine officinal. Betony. MAT/BOSC/PRAT(ac). 1200-2000 m. VI-VII.

Clinopodium nepeta subsp. ***sylvaticum*** (Bromf.) Peruzzi & F. Conti [*Calamintha nepeta* subsp. *sylvatica* (Bromf.) R. Morales] -. -. -. -. HERB(v)/ROC(m). 1230-1250 m. rrr. VIII-XI.

Clinopodium vulgare L. [*Satureja vulgaris* (L.) Fritsch; *Calamintha clinopodium* Benth.] Orenga borda. Clinopodio. Grand basilic. Cushion calamint. HERB(v,s)/PRAT(s). 1200-1600 m. ccc. VII.VIII.

Galeopsis angustifolia Hoffm. [*G. ladanum* subsp. *angustifolia* (Hoffm.) Celak.] Galeopsis de fulla estreta. -. Galéopsis à feuilles étroites. Red hemp-nettle. ROC(t). 1380-1680 m. rr. VI-VII.

Galeopsis ladanum L. subsp. ***ladanum*** Galeopsis vermella. -. -. Galéopsis intermédiaire. Red hemp nettle. ARV/ROC(t). 1220-1450 m. r. VI-VII.

Galeopsis pyrenaica Bartl. [*G. ladanum* L. subsp. *pyrenaica* (Bartl.) O. Bolòs] var. ***nana*** (Wk. et Costa) O. Bolòs et Vigo Galeopsis pirinenca. -. Galeopse des Pyrénées. Pyrenean hemp-nette. ROC(t). 2060-2760 m. c. VIII-IX.

Galeopsis pyrenaica Bartl. [*G. ladanum* L. subsp. *pyrenaica* (Bartl.) O. Bolòs] var. ***pyrenaica*** Galeopsis pirinenca. -. Galeopse des Pyrénées. Pyrenean hemp-nette. ROC(t). 1240-2020 m. c. VIII-IX

Galeopsis tetrahit L. subsp. ***tetrahit*** Tetrahit. Galeópside de bosque. Galéopsis tétrahit. Bristle-stem hemp nettle. RUD(h)/HERB(c). 1240-2040 m. c. VII-VIII.

Lamium album subsp. ***album*** Ortiga blanc/Ortiga morta blanca. Ortiga muerta blanca. Lamier blanc. White archangel. RUD(h). 1620-2120 m. r. VI-VIII.

Lamium amplexicaule L. Flor-rubí. Patica de gallo. -. -. ARV. 1220-1430 m. c. IV-VI.

Lamium galeobdolon (L.) Crantz subsp. ***montanum*** (Pers.) Hayek [*L. galeobdolon* auct.] Ortiga morta groga. Ortiga muerta amarilla. Lamier jaune. Yellow archangel. BOSC(h,br). 1220- 1720 m. r. V-VI.

Lamium hybridum Vill. -. -. -. -. ARV. 1240 m. rrr. V.

Lamium maculatum L. Lami maculat. -. Lamier tacheté. Spotted dead-nette. HERB(c,v)/RUD(h). r. 1200-1850 m. V-VII.

Lamium purpureum L. -. -. -. -. ARV/HERB(h). 1240-1280 m. rr. VI.

Lavandula pyrenaica DC. [*L. angustifolia* Mill. subsp. *pyrenaica* (DC.) Guinea] - Espígol. -. -. -. PRAT(r). 1100-1300 m. rrr.

- Lycopus europaeus* L. Malrubí d'aigua. Menta de lobo. Lycope. Gypsywort. AQUA(j,cr). 1220-1250 m. rrr. VII-VIII.
- Marrubium vulgare* L. - . - . - . RUD(h). 1480 m. rrr. VII.
- Melissa officinalis* L. - . - . - . BOSC(br). 1240 m. rrr. VI. AL/INV.
- Melittis melissophyllum* L Melissot. Melisa bastarda. Mélitte à feuilles de mélisse. Bastard balm. HERB(v,s)/BOSC(s). 1240 m. rrr. VI.
- Mentha aquatica* L. Menta d'aigua. Menta acuática. Menthe aquatique. Water mint. AQUA(cr). 1240 m. rrr. VII.
- Mentha arvensis* L. Menta arvense. Menta. - . AQUA(j,c). 1200-1480 m. rr. VII
- Mentha longifolia* (L.) Huds. Menta de llop/Menta boscana. Mastranzo silvestre. Menthe des bois. Downy mint. AQUA(j,c,m). 1220-2100 m. cc. VII-VIII.
- Mentha spicata* L. - . - . - . 1240 m. AQUA(h). rrr. VII. AL/ESP.
- Mentha suaveolens* Ehrh. - . - . - . AQUA(h,j). rrr. VII.
- Mentha ×rotundifolia* (L.) Huds. [*M. longifolia* x *M. suaveolens*] - . - . - . AQUA(h,j). rrr. VII.
- Nepeta cataria* L. RUD(h). 1250 m. rrr. VII. AL/AC.
- Nepeta latifolia* DC. [*N. nuda* subsp. *latifolia* (DC.) O. Bolòs & Vigo] Nepta violàcia. - . Népéta à feuilles larges. - . RUD(h). 1300-1780 m. rr. VII-VIII.
- Nepeta nepetella* L. ROC(t). 2500 m. rrr. VII.
- Origanum vulgare* L. Orenga/Moraduix. Orégano. Marjolaine sauvage. European oregano HERB(v,s),PRAT(s). 1200-1600 m. cc. VII-IX.
- Prunella grandiflora* (L.) Scholler [*P. grandiflora* (L.) Scholler subsp. *pyrenaica* (Gren. et Godr.]A. et O. Bolòs] Herba del traïdor/Prunel·la grandiflora. Consuelda mayor. Brunelle à grandes fleurs. Bigflower selfheal. MAT(g)/PRAT,HERB(v)(h). 1200-2275 m. cc. VI-IX.
- Prunella laciniata* (L.) L. Prunella blanca. Prunela blanca. Brunelle blanche. Cut leaved self-heal. PRAT(s). 1200-1620 m. c. VI-VIII.
- Prunella vulgaris* L. Prunel·la vulgar. Hierba de las heridas. Brunelle commune. Self-heal. PRAT(h),AQU(m,j). 1200-2180 m. cc.
- Prunella ×bicolor* Beck [*P. grandiflora* x *P. laciniata*] PRAT(ac). 1460 m. rrr. VII.
- Prunella ×intermedia* Link [*P. laciniata* x *P. vulgaris*] PRAT. 1560 m. rrr. VII.
- Prunella ×surrecta* Dumort. [*Prunella x coutinhoi* Rouy; *P. grandiflora* x *vulgaris*] PRAT(ac). 1480 m. rrr. VII
- Salvia glutinosa* L. Sàlvia de flor groga. - . Sauge glutineuse. Jupiter's distaff/Sticky sage. 1240-1480 m. rrr. VIII-IX.
- Salvia pratensis* L. Salvia silvestre/Sàlvia de prat. Salvia de prado. Sauge des prés. Meadow clary. PRAT(s). 1220-1720 m. c. V-VII.
- Salvia verbenaca* L. Tàrrec. Gallocresta. Sauge verbénacée. Vervain. PRAT(s,r). 1230-1280 m. rrr. V.
- Satureja montana* L. subsp. *montana* ROC(r). 1450-1800 m. rr. VII-IX.
- Scutellaria alpina* L. subsp. *alpina* Escutel·lària alpina. Tercianera alpina.Scutellaire des alpes. - . ROC(t,ca). 1580-2580 m. r. VII-VIII.
- Sideritis hirsuta* L. Herba de la feridura. Sajareña. Crapaudine hirsute. - . PRAT/ROC (s). 1380 m. rrr. VII.
- Sideritis hyssopifolia* L. . Herba del bàlsam. Rabogato pirenaico. Crapaudine à feuilles d'hysope. - . 1420-2620 m. ccc. VI-VIII.
- Stachys alpina* L. Estaquis alpina. - . Épiaire des alpes. - . HERB(c,m). 1500-1980 m. rrr. VI-VII.
- Stachys palustris* L. Estaquis palustre. Ortiga hedionda. Épiaire des marais. Marsh woundwort. AQUA(j). 1220-1260 m. rr. VI-VII.
- Stachys recta* L. Herba de Sant Antoni. Hierba de la perlesia. Épiaire droite. Perennial yellow woundwort. PRAT(s). 1240-1680 m. c. VI-VIII.
- Stachys sylvatica* L. Ortiga pudent. Betónica mayor. Épiaire des bois. Hedge woundwort. HERB(c,v). c. 1200-1780 m. VI-VII.
- Teucrium botrys* L. - . - . - . ROC(c). 1340 m. rrr. VII.

- Teucrium chamaedrys*** L. [*T. chamaedrys* subsp. *pinnatifidum* (Sennen) Rech. fil.; *T. chamaedrys* subsp. *germanicum* (F. Hermann) Rech. fil.] Camedris. Camedrio. Germandrée petit-chêne. Wild germander. ROC. 1220-1560 m. r. VI-VIII.
- Teucrium pyrenaicum*** L. subsp. *guarensis* P. Monts. Angelins. Zamarrilla pirenaica. Germandrée des Pyrénées. Pyrenean germander. PRAT(s). 1220-1880 m. c. VI-VII.
- Teucrium scorodonia*** L. Escorodònia. Camedrio de los bosques. Germandrée scorodoine. Wood sage. BOSC/MAT(g,ac). 1200-1700 m. cc. VI-VIII.
- Thymus drucei*** Ronniger [*Th. praecox* Opiz subsp. *britannicus* (Ronniger) Holub] PRAT. 1770 m. rr. VII.
- Thymus nervosus*** Willk. [*Th. serpyllum* subsp. *nervosus* (Benth.) Nyman] Farigoleta de pastor/ Serpoll. -. Thym à nervures saillantes. PRAT/ROC. 1820-2740 m. cc. VI-VIII.
- Thymus praecox*** Opiz subsp. *polytrichus* (Borbás) Jalas [*Th. serpyllum* subsp. *polytrichus* (Borbás) Briq.] PRAT(h,ac). 1780-2440 m. c. VI-X.
- Thymus pulegioides*** L. [*Th. chamaedrys* Fr.; *Th. serpyllum* L. subsp. *chamaedrys* (Fr.) Vollm.; *Th. froelichianus* Opiz; *Th. serpyllum* L. subsp. *carnolicus* (Borbás) P. Schmidt.] Farigoleta de pastor/ Serpoll. Tomillo de prado. Serpolet petit-chêne. Larger wild thyme. PRAT. 1200-2200 m. ccc. VI-IX.
- Thymus serpyllum*** subsp. *carolii* Sennen & Ronniger PRAT(r). 1240-1330 m. rr. VII.
- Thymus vulgaris*** L. subsp. *vulgaris* Farigola. Tomillo. Thym commun. Common thyme. PRAT(s)/ROC. 1240-1800 m.
- Ziziphora acinos*** (L.) Melnikov subsp. *acinos* [*Clinopodium acinos* (L.) Kuntze subsp. *acinos*; *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy subsp. *arvensis*; *Satureja acinos* (L.) Scheele subsp. *acinos*] - PRAT(r). 1260-2000 m. c.
- Ziziphora granatensis*** (Boiss. & Reut.) Melnikov subsp. *alpina* (L.) Bräuchler & Gutermann [*Clinopodium alpinum* (L.) Kuntze; *Acinos alpinus* (L.) Moench] Calament alpí. Albahaca silvestre. Calament des Alpes. Alpine calamint. ROC(t,ca). 1500-2300 m. c. VI-VII.
- Ziziphora granatensis*** (Boiss. & Reut.) Melnikov subsp. *granatensis* [*Clinopodium alpinum* (L.) Kuntze subsp. *meridionale* (Nyman) Govaerts; *Satureja acinos* subsp. *meridionalis* (Nyman) O. Bolós & Vigo] Calament alpí. -. Calament des Alpes. -. PRAT(s,a). 1240-1700 m. c. VI-VII.

Lentibulariaceae

- Pinguicula grandiflora*** Lam. Viola d'aigua. Grasilla mayor. Grassette à grandes fleurs. Large-flored butterwort. AQUA(m,f,ca). 1220-2100 m. r. VI-VII..
- Pinguicula vulgaris*** L. Pingüícula. Grasilla. Grassette commune. Butterwort. AQUA(m,f,ca). 1400-2380 m. rr. VII-VIII.

Linaceae

- Linum alpinum*** Jacq. subsp. *alpinum* [*L. perenne* subsp. *alpinum* (Jacq.) Stoj. & Stefanov] PRAT(s,t). 1980-2200 m. rr. VII.
- Linum bienne*** Mill. [*L. usitatissimum* subsp. *bienne* (Mill.) Stank.; *L. usitatissimum* subsp. *angustifolium* (Huds.) Thell.] Lli. Lino. Lin à feuilles étroites. Pale flax. PRAT(s). 1220-1480 m. r. V-VII.
- Linum catharticum*** L. Llinet purgant. Lino purgante. Lin cathartique. Fairy flax. PRAT(h,ac)/ AQUA(j). 1220-1880 m. ccc. VI-VII.
- Linum narbonense*** L. subsp. *narbonense* Lli de Narbona. Lino. Lin de narbonne. Heavenly blue flax. PRAT(ca). 1700 m. rrr. VI.
- Linum trigynum*** L. PRAT(s,r). 1340 m. rrr. VII.

Lytraceae

- Lythrum salicaria*** L. Salicària. Salicaria. Salicaire commune. Purple loosestrife. AQUA(j). 1200-1280 m. rr. VI-VIII.

Malvaceae

- Alcea rosea*** L. [*Althaea rosea* (L.) Cav.] Malva reial. Malva real. Passe-rose. Hollyhock. RUD. 1240 m. rrr. VII. ESC.
- Althaea officinalis*** L. Malví. Malvavisco. Mauve blanche. Marsh mallow. RUD. 1260 m. rrr. VII. AL/AC.
- Malva alcea*** L. [M. *alcea* subsp. *fastigiata* (Cav.) O. Bolòs & Vigo] Alcea. -.-. RUD(h). 1260 m. rrr. VII.
- Malva moschata*** L. Malva moscada. -. Mauve musquée. Musk-mallow. PRAT. 1340 m. rrr. VII.
- Malva neglecta*** Wallr. Malva de fulla petita. Malva enana. Petite mauve. Dwarf mallow. RUD(t). 1200-2100 m. cc. VI-X.
- Malva setigera*** K.F. Schimp. & Spenn. [*Althaea hirsuta* L.] ROC(m). 1380 m. rrr. VI.
- Malva sylvestris*** L. Malva. Malva. Grande mauve, Common mallow. 1200-1700 m. cc. V-VIII.
- Tilia platyphyllos*** Scop. Tell/Tell de fulla gran. Tilo común. Tilleul à grandes feuilles. Large leaved lime. BOSC(h,br). 1200-1650 m. cc. VI-VII..
- Tilia ×europaea*** L. [*T. ×vulgaris* Hayne; *T. cordata* × *T. platyphyllos*] RUD. 1240 m. rrr. VI.

Montiaceae

- Montia fontana*** L. subsp. *fontana* [M. *fontana* subsp. *variabilis* Walters] Móntia. Verdolaga de agua. Montie des fontaines. Blinks. AQUA(f). 1350-2000 m. c. VI-VII..

Moraceae

- Ficus carica*** L. ROC. 1500 m. rrr. AL/AC.

Nictaginaceae

- Mirabilis jalapa*** L. Flor de nit. Dondiego de noche. Belle-de-nuit. Four o'clock flower. RUD. 1240 m. rrr. IX. AL/AC.

Oleaceae

- Fraxinus excelsior*** L. subsp. *excelsior* Freixe (de fulla gran). Fresno. Frêne commun. Ash. BOSC(h,br). 1200-1780 m. ccc.
- Ligustrum vulgare*** L. Olivereta. Aligustre. Troène commun. Common privet. BOSC(s)/MAT(b). 1340 m. rrr. VI.

Onagraceae

- Circaeа lutetiana*** L. Herba de les encantades. Hierba de la bruja. Circée commune. -. BOSC(h,br). 1200-1460 m. rr. VI-VII.
- Epilobium alsinifolium*** Vill. . Epilobi alsinifoli. Epilobio alpino. Épilobe à feuilles d'alsine. Chickweed willowherb. AQUA(f). 1400-2600 m. c. VII-VIII.
- Epilobium anagallidifolium*** Lam. AQUA(f,c)/ROC(t,h). 2100-2580 m. r. VII-IX.
- Epilobium angustifolium*** L. subsp. *angustifolium* Cameneri. Epilobio de hojas estrechas. Laurier de saint antoine. Willow herb. HERB(c,v). 1200-2400 m. c. VII-VIII.
- Epilobium collinum*** C.C. Gmel. Epilobi roquer. -. Épilobe des collines. Hill willowherb. 1200-2620 m. c. VI-VIII.
- Epilobium hirsutum*** L. Epilobi hirsut. Hierba de San Antonio. Épilobe hirsute. Great willow herb. AQUA(j,cr,b). 1200-1520 m. c. VI-VIII.
- Epilobium montanum*** L. Epilobi muntanyenc. -. Épilobe des montagnes. -. HERB(c,v)/BOSC(h). 1240 1780 m. cc.VI-VII.

- Epilobium obscurum* Schreb. AQUA(f). 1820 m. rrr. VIII.
Epilobium palustre L. AQUA(j,m,f) .1320-1900 m. c. VII-VIII.
Epilobium parviflorum Schreb. Epilobi de flor petita. -. Épilobe à petites fleurs. -. AQUA(j,cr,b). 1240-1600 m. c. VII-VIII.
Epilobium roseum Schreb. subsp. *roseum* -. -. Épilobe rose au sens large. -. BOSC(br). 1220 m. rrr. VII.
Oenothera biennis L. [*O. suaveolens* Desf.; *O. biennis* subsp. *suaveolens* (Pers.) Rouy & Camus] Enotera groga. Enotera. Onagre bisannuelle. Common evening-primrose. RUD(h)/ROC(t)(h). 1220-1780 m. c. VII-VIII.
Oenothera rosea Aiton Onagra rosada. Yerba del golpe. Onagre rosée. Pink evening primrose. RUD(h). 1240-1280 m. r. VI.

Orobanchaceae

- Bartsia alpina* L. Bàrstia alpina. Bartsia alpina. Bartsie des Alpes. Alpine bartsia. AQU(m,f). 1820-2400 m. c. VI-VII.
Euphrasia alpina Lam. subsp. *alpina* [*E. alpina* subsp. *pulchra* (Sennen) O. Bolos & Vigo]. Eufràsia. Eufrasia alpina. Euphraise des Alpes. Alpine eyebright. PRAT. 1500 m. rrr.
Euphrasia hirtella Reut. Eufràsia. Euphraise hérissée. -. PRAT(h). 1450-1710 m. c. VII-VIII.
Euphrasia minima DC. [*E. minima* subsp. *masclansii* O. Bolos & Vigo; *E. minima* subsp. *sicardii* (Sennen) O. Bolos & Vigo] -. Petite Euphraise. Dwarf Eyebright. PRAT(si)/AQUA(c). 1980-2650 m. r. VII-IX.
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. [*E. officinalis* L. var. *nemorosa* Pers.] -. Euphraise des bois. Common Eyebright. PRAT(h). 1430-1720 m. r. VII-VIII.
Euphrasia pectinata Ten. (*E. stricta* var. *pectinata* (Ten.) O. Bolòs & Vigo) Eufràsia. Eufrasia. Euphraise pectinée. -. PRAT(h). 1260-1550 m. r. VI-VIII.
Euphrasia salisburgensis Hoppe -. Euphraise de Salzbourg. -. PRAT(ca). 1230-2340 m. c. VII-IX.
Euphrasia stricta J.F. Lehm. -. Euphraise dressé. Drug Eyebright. PRAT. 1240-1820 m. c. VII-IX
Lathraea squamaria L. Esquamària. Escuamaria. Clandestine écailleuse. Great toothwort. BOSC(h). 1340 m rrr. VI.
Melampyrum pratense subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens [*M. pratense* subsp. *oligocladum* (Beauverd) Soó; *M. pratense* subsp. *vulgatum* auct.] - Xuclador. Trigo de vaca. Mélampyre des prés. Cow-wheat. BOSC(ac). 1500 m. rrr. VII-VIII.
Melampyrum pratense L. subsp. *pratense* [*M. pratense* subsp. *alpestre* Ronniger, nom. illeg] Xuclador. Trigo de vaca. Mélampyre des prés. Cow-wheat. BOSC(ac). 1200-2140 m. r. VI-VIII.
Melampyrum sylvaticum L. subsp. *sylvaticum*. Citat, probablement es tracta d'un error.
Odontites cebennensis Coste & Soulié [*O. lanceolatus* subsp. *olotensis* (Cadevall) O. Bolòs & Vigo] -. Euphraise d'olot. -. PRAT(ca). 1200-1480 m. r. VIII-IX.
Odontites vernus subsp. *serotinus* Corb. -. -. -. PRAT(s). 1260 m. rrr. VIII.
Odontites vernus (Bellardi) Dumort. subsp. *vernus* -. Euphraise rouge. -. PRAT(h)/AQUA(j). 1230-1480 m. c. VI-VIII.
Orobanche amethystea Thuill. Frare. -. Orobanche couleur d'améthyste. -. PRAT (*Eryngium*). 1340 m-1380 m. r. VI-VII.
Orobanche caryophyllacea Sm. -. Orobanche à odeur d'oeillet. Bedstraw Broomrape. PRAT/ROC(m) (*Rubiaceae*). 1250-1420 m. r.
Orobanche crenata Forssk. Frare de les faveres. Jopo. Orobanche crénelé. Bean Broomrape. ARV. 1240 m. rrr. VI.
Orobanche gracilis Sm. [*O. crinita* auct.] Frare grácil. -. Orobanche grêle. -. PRAT (*Fabaceae*). 1230-1880 m. cc. VI-VII.
Orobanche haenseleri Reut. -. -. -. BOSC(s) (*Helleborus foetidus*). 1450-1820 m. rrr. VI-VII.
Orobanche hederae Duby -. -. -. BOSC/ROC(m). 1220-1430 m. r. VII.

- Orobanche minor* Sm. Frare. Rabo de lobo. Orobanche du trèfle. Common Broomrape. PRAT (*Trifolium*). 1240-1520 m. cc. VI-VII.
- Orobanche rapum-genistae* Thuill. Frare de ginesta. Espárrago de lobo. Orobanche du genêt. -. MAT(g,bg)/PRAT (*Cytisus*). 1220-1720 m. c. VI-VII.
- Orobanche reticulata* Wallr. Frare de cardassa. Jopo. Orobanche réticulée. -. RUD/PRAT (*Cirsium eriophorum*). 1620-1780 m. rrr. VII.
- Pedicularis comosa* L. subsp. *comosa* Pedicularis comosa. Gallarito amarillo. Pédiculaire chevelue. Crested lousewort PRAT(s)/HERB(m). 1550-2300 m. c. VI-VII.
- Pedicularis foliosa* L. subsp. *foliosa* Pedicularis foliosa. Gallarito folioso. Pédiculaire feuillée. Leafy lousewort . HERB(m). 1560-2000 m. rr. VI-VII.
- Pedicularis pyrenaica* J. Gay Pedicularis pirinenca. Felguera de puerto. Pédiculaire des pyrénées. Pyrenean lousewort. PRAT(ac). 1660-2800 m. cc. VI-VIII.
- Pedicularis sylvatica* L. subsp. *sylvatica* Pedicularis selvática. Gallarito. Pédiculaire des bois. Lousewort. PRAT(h)/AQUA(m). 1300-1880 m. r. VI-VII.
- Pedicularis tuberosa* L. Error.
- Phelipanche purpurea* (Jacq.) Soják subsp. *purpurea* [*Orobanche purpurea* Jacq.] Frare. Dedal azul de viuda. Orobanche pourpre. -. PRAT(t). 1240 m. rrr. VI.
- Rhinanthus minor* L. Esquellada petita. -. Petit Rhinanthe. Little Yellowrattle. PRAT(h). 1200-1880 m. c. VII-VIII.
- Rhinanthus pumilus* (Sterneck) Pau subsp. *pumilus* [*Rh. mediterraneus* (Sterneck) Sennen] Esquellada. Cascabelera. Rhinanthe nain. -. PRAT(h). 1200-1880 m. cc. VI-VIII.

Oxalidaceae

- Oxalis acetosella* L. subsp. *acetosella* Pa de cucut de bosc. Acederilla. Pain de coucou. Cuckoo bread, Woodsorrel. BOSC(h,br). 1230-2000 m. c. V.
- Oxalis corniculata* L. Agrella. Acederilla. Oxalide corniculée. Creeping oxalis, Creeping wood-sorrel, Procumbent yellow-sorrel. RUD/ROC(m). 1200-1420 m. c. VI-VII. AL/ESP.
- Oxalis debilis* Kunth [*O. debilis* subsp. *corymbosa* (DC.) O. Bolos & Vigo] -. -. Oxalide chétive. Pink shamrock. ARV/RUD. 1260-1320 m. rr. VI. AL/ESP.
- Oxalis latifolia* Kunth Pa de cucut de fulla ampla. Aleluya. Oxalide à larges feuilles. Garden Pink-sorrel. RUD(t). 1240 m. rrr. VI. AL/ESP.
- Oxalis vallicola* (Rose) R. Kunth -. -. -. RUD(t). 1240-1360 m. rr. VI. AL/AC.

Papaveraceae

- Chelidonium majus* L. Lletdeteresa/Herba de les orenetes. Celidonia. Grande chélidoine. Greater celandine. RUD(h). 1200-1450 m. c. V-VII.
- Corydalis solida* (L.) Clairv. subsp. *solida* -. -. -. BOSC(h)/HERB(c). 1500-1900 m. rrr. IV-V.
- Fumaria officinalis* L. subsp. *officinalis* -. -. -. ARV/RUD/ROC(m). 1240-1310 m. rr. VI.
- Papaver alpinum* var. *aurantiacum* (Loisel.) B.Bock [*P. aurantiacum* Loisel.; *P. rhaeticum* Leresche; *P. alpinum* L. subsp. *rhaeticum* (Leresche) Nyman] Paramà alpí. -. -. -. ROC(t). 2440-2700 m. rrr. VI-VIII. DUBT.DET. PRO.
- Papaver alpinum* subsp. *suaveolens* (Lapeyr. ex P.Fourn.) O.Bolòs & Vigo [*P. pyrenaicum* subsp. *suaveolens* Lapeyr. ex P.Fourn.; *P. alpinum* subsp. *lapeyrousonianum* (Greuter & Burdet) Kerguélen; *P. lapayrousonianum* Greuter & Burdet] Paramà alpí. -. -. -. ROC(t). 2120-2700 m. r. VI-VIII. PRO.
- Papaver rhoes* L. Rosella. Amapola. Coquelicot. Common poppy. ARV/RUD. 1200-2000 m. c. VI-VIII. AL/ESP.
- Papaver somniferum* L. subsp. *setigerum* (DC.) Arcang. Cascall. -. -. -. RUD. 1235 m. rrr. VI. AL/AC.
- Roemeria argemone* (L.) C. Morales, R. Mend. & Romero García [*Papaver argemone* L.] Citada a prop.

Plantaginaceae

- Antirrhinum majus* L. subsp. *majus* Gossos. Conejitos. Grand mufler. Snapdragon. ROC(r,m). 1200-1680 m.c. VI-VIII.
- Asarina procumbens* Mill. [*Antirrhinum asarina* L.) Asarina. Asarine couchée. Creeping snapdragon. ROC(r,si). 1220-2460 m. IV-IX.
- Chaenorhinum minus* (L.) Lange subsp. *minus* - . -. -. ROC(t)/ARV. 1220-2080 m. c. VI-VIII.
- Chaenorhinum origanifolium* (L.) Kostel. subsp. *organifolium* - ROC(ca). 2150 m. rrr.
- Cymbalaria muralis* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. *muralis* Picardia. Palomilla de muro. Cymbalaire des murs. Ivy-leaved toadflax. ROC(m). 1230-1260 m. r. V-VIII. AL/ESP.
- Digitalis lutea* L. subsp. *lutea* Didalera groga. Digital amarilla. Digitale jaune. Yellow foxglove. HER(v,c, m,h). 1200-1960 m. cc. VI-VIII.
- Erinus alpinus* L. Erinus. - . Érine des alpes. - . 1420-2200. rr. VI-VII.
- Globularia cordifolia* L. Lluqueta. Hierba negra. Globulaire à feuilles cordées. Matted globularia. ROC(r,ca). 1200-2200 m cc. V-VII.
- Globularia repens* Lam. [*G. cordifolia* subsp. *repens* (Lam.) Wettst.] Lluqueta de roca. Hierba negra. Globulaire naine. Thyme-leaved glove-daisy. ROC(r,ca). 1230-2650 m. cc. V-VIII.
- Globularia bisnagarica* L. [*G. punctata* Lapeyr.; *G. vulgaris* subsp. *willkommii* (Nyman) Wettst.] Barbes de vell, Senet de pobre. Globularia mayor. Globulaire commune. Common globularia. PRAT(s). 1520 m. rrr. V.
- Linaria alpina* L. subsp. *alpina* Linària alpina. Linaria alpina. Linaire des Alpes. Alpine toadflax. ROC(t). 1880-2680 m. c. VI-VIII.
- Linaria repens* (L.) Mill. Linària estriada. Linaria blanca. Linaire rampante. Pale toadflax. ROC(t). 1550-2120 m. c. VI-VIII.
- Linaria supina* (L.) Chaz. subsp. *supina* Linària supina. Mosquitas doradas. Linaire couchée. Prostrate toadflax.
var. *supina* ROC(t)/ARV. 1340-1820 m. r. VI-VIII.
var. *pyrenaica* (DC.) Duby ROC(t)/ARV. 1820-2540 m. r. VI-VIII.
- Misopates orontium* (L.) Raf. [*Antirrhinum orontium* L.) RUD(t). 1230 m. rrr. VI.
- Plantago argentea* Chaix Plantatge argentí. - . Plantain argenté. - . PRAT(s,ca). 1740-1800 m. rr. VI-VII.
- Plantago lanceolata* L. Plantatge/Plantage llarg/Plantatge estret/Plantatge de fulla estreta. Llantén de hojas estrechas. Plantain lancéolé. Ribwort plantain. RUD/PRAT(t). 1200-2150 m. cc. V-X.
- Plantago major* subsp. *intermedia* (Gilib.) Lange [*P. major* subsp. *pleiosperma* Pilg.] - Plantatge/Plantatge rodó/Plantatge gros. Llantén mayor. Plantain à grandes feuilles. Englishman's foot. AQUA(j).1500 m. rrr.
- Plantago major* L. subsp. *major* Plantatge/Plantatge rodó/Plantatge gros. Llantén mayor. Plantain à grandes feuilles. Englishman's foot. RUD(t)/PRAT(t). ccc.1200-1880 m. VII-X.
- Plantago media* L. Plantatge/Plantatge mitjà. Llantén medio. Plantain blanc. Hoary plantain. PRAT(h). 1200-2100 m. cc. VI-VIII.
- Plantago maritima* L. subsp. *serpentina* (All.) Arcang. Pedrenca serpentina. - . Plantain serpentant. - . ROC(h)/PRAT(h). 1560 m. rrr. VI.
- Plantago monosperma* Pourr. subsp. *monosperma* Plantatge monosperm. Llantén pirenaico. Plantain à une graine. Buckhorn plantain. PRAT/ROC(t). 1720-2750 m. cc. VI-VIII.
- Plantago sempervirens* Crantz [*P. cynops* L.] Plantatge de ca. Zaragatona mayor. Plantain toujours vert. Evergreen plantain. PRAT(s). 1460-1980 m. rr. V-VIII.
- Plantago subulata* L. [*P. holosteum* Scop., *P. subulata* subsp. *holosteum* (Scop.) O. Bolòs & Vigo; *P. subulata*] Pedrenca de prat. - . Plantain à feuilles en alène. PRAT(a)/ROC(r). 1300-1780 m. r. VI-VII.
- Plantago ×mixta* Domin. [*P. major* × *P. media*] PRAT. 1320 m. rrr.VI.
- Veronica alpina* L. - . -. -. AQUA(c). 2000-2600 m. r. VII-VIII.

- Veronica anagallis-aquatica* L. subsp. *anagallis-aquatica* Herba de folls. Berula. Véronique mouron d'eau. Blue water speedwell. AQUA(cr). 1200-1520 m. rr. V-VIII.
- Veronica aphylla* L. Verònica afil-la. -. Véronique à tige nue. Leafless-stemmed Speedwell. 1800-2340 m. PRAT/AQUA(c) (ca). rr. VII-VIII.
- Veronica arvensis* L. Verònica arvense. -. -. ARV/PRAT(a). 1240-2080 m. cc. V-VIII.
- Veronica beccabunga* L. subsp. *beccabunga* Creixen de cavall. Verónica de agua. Véronique des ruisseaux. Brooklime. AQUA(cr). 1200-2280 m. cc. V-IX.
- Veronica bellidiooides* L. Verònica bel·lidioide. -. Véronique fausse pâquerette. -. PRAT(s). 1940-2740 m. c. VI-VIII.
- Veronica chamaedrys* L. subsp. *chamaedrys* Verònica camedris. Verónica de bosque. Véronique petit-chêne. Germaner speedwell. BOSC(h)/HERB(h,v,m). 1220-2080 m. cc. VI-VIII.
- Veronica fruticans* subsp. *cantabrica* M. Lainz ROC(t)/PRAT(r). 1500-2720 m. ccc. VII-IX.
- Veronica fruticans* Jacq. subsp. *fruticans* [*Veronica fruticulosa* L. subsp. *saxatilis* (Scop.) Arcang.] Verònica fruticulosa. Verónica de la rocas. Véronique des rochers. Rock speedwell. PRAT(s). Citada entre 1970-2760 m, una part de les citacions han estat revisades i corresponen a la subsp. *cantabrica* o a *V. fruticulosa*. rrr. VII-VIII. DUBT.DET.
- Veronica fruticulosa* L. Verònica fruticulosa. -. Véronique ligneuse. Speedwell. PRAT(r). 1700-2780 m. c. Més rara del que es pensava, algunes citacions corresponen a *V. fruticans* subsp. *cantabrica*.
- Veronica hederifolia* L. Herba de sínia. Veronica. Véronique à feuilles de lierre. Ivy-leaf Speedwell. ARV/RUD/ROC(m). 1200-1620 m. c. V-VII.
- Veronica montana* L. Verònica de muntanya. -. Véronique des montagnes. -. 1200-1600 m. rr. V-VI.
- Veronica nummularia* Gouan Verònica nummulària. -. Véronique nummulaire. Pyrenean Speedwell. ROC(t, ca). 2200-2700 m. r. VII-VIII.
- Veronica officinalis* L. Herba de Santa Caterina/Verònica oficial. Verónica macho. Véronique officinale. Common speedwell. BOSC/MAT/PRAT(ac). 1220-2120 mm. cc. VI-VIII.
- Veronica orsiniana* Ten. [*V. austriaca* subsp. *teucrium* sensu O. Bolòs & Vigo] Verònica austriáca. -. Véronique germandrée. -. PRAT(s). 1220-1920 m. cc. VI-VIII.
- Veronica persica* Poir. Blauet/Verònica pèrsica. Borroncillo. Véronique commune. Common field speedwell. ARV/RUD. 1220-1380 m. r. IV-VI. AL/ESP.
- Veronica polita* Fr. Verònica polida. Veronica polita. Véronique brillante. Grey Field-speedwell. ARV/RUD(t). 1220-1460 m. r. V-VII.
- Veronica praecox* All. Citada erròniament.
- Veronica ponae* Gouan Verònica de Pona. Verónica pirenaica. Véronique de gouan. Spiked Pyrenean speedwell. AQUA(f). 1680-2180 m. c. VI-VIII.
- Veronica serpyllifolia* L. subsp. *serpyllifolia* [*V. serpyllifolia* subsp. *humifusa* (Dicks.) Syme] Herba de l'ull/Herba del mal d'ull/Verònica serpili-lifòlia. Verónica de prado. Véronique à feuilles de serpolet. Thymeleaf speedwell. RUD(t). 1320-2080 m. c. VI-VII.
- Veronica spicata* L. subsp. *spicata* Verònica d'espiga. -. Véronique en épi. Spiked speedwell. PRAT(s). 1900-2380 m. rrr. VII-VIII.
- Veronica triphylllos* L. Verònica trifil·la. -. Véronique digitée. -. Fingered speedwell. ARV. 1260 m. rrr. V.
- Veronica urticifolia* Jacq. Verònica latifòlia. -. Véronique à feuilles d'ortie. Nettle-leaved speedwell. BOSC(h)/ROC(h). 1220-1800 m. cc. VI-VIII.
- Veronica verna* L. -. Veronica verna. Véronique de printemps. Spring Speedwell. PRAT(r). 2020-2150 m. rrr. VI.

Plumbaginaceae

- Armeria alpina* Willd. [*A. maritima* subsp. *alpina* (Willd.) P. Silva] Gasó alpí. Mermasangre. Arméria des Alpes. Alpine thrift. Citada a PRAT(ac). 2040-2700 m. VI-VIII. Els plecs que hem pogut consultar fins al moment no presenten caràcters clarament de l'espècie, d'aspecte variable i de transició amb *A. arenaria* subsp. *arenaria*. DUBT.DET.
- Armeria arenaria* (Pers.) Schult. subsp. *arenaria* [*A. alliacea* subsp. *bupleuroides* (Godr. & Gren.) O. Bolòs & Vigo; *A. alliacea* subsp. *plantaginea* (All.) O. Bolòs & Vigo] Gasó (al-liaci). Armeria arenaria. Arméria faux buplèvre. Plantain-leaved thrift. PRAT. 1280-2100 m. cc. VI-VIII.

Armeria marginata (Levier) Bianchini [*A. majellensis* var. *marginata* Levier]. Error.

Armeria muelleri Huet [*A. maritima* subsp. *muelleri* (A. Huet) O. Bolòs & Vigo] Gasó alpí. -. Arméria de Müller. -. PRAT(si). 2220-2700 m. c. VII-VIII.

Polygalaceae

Polygala alpestris Rchb. subsp. *alpestris* [*P. vulgaris* subsp. *alpestris* (Rchb.) Rouy & Foucaud] PRAT(h,ac). 1450-2170 m. c. VI-VIII.

Polygala alpina (DC.) Steud. PRAT(ca). 2000-2800 m. rr. VII.

Polygala calcarea F.W. Schultz Herba blava. Lechera amarga. Polygala du calcaire. Chalk milkwort. PRAT(ca). 1500-2120 m. c. V-XI.

Polygala nicaeensis W.D.J. Koch subsp. *gerundensis* (O. Bolòs & Vigo) A.M. Hern. [*P. vulgaris* subsp. *gerundensis* (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot; *P. nicaeensis* Risso ex Koch in Röhling subsp. *caesalpini* Bubani ex McNeill] -. -. Polygale de Gérone. -. PRAT(s). 1380 m. rrr. VII.

Polygala vulgaris L. Polígala vulgar. -. Polygale commun. PRAT(ac). 1240-2100 m. cc. VI-VIII.

Polygonaceae

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub [*F. aubertii* (L. Henry) Holub; *Polygonum aubertii* L.] Vinya del Tibet. -. Renouée de chine. -. MAT(b). 1220-1240 m. rrr. VI. AL/INV.

Fallopia convolvulus (L.) A. Löve [*Polygonum convolvulus* L.] Fajol bord. -. -. -. ARV/RUD. 1220-1500 m. c. VI-VII.

Fallopia dumetorum (L.) Holub -. -. -. MAT(b). 1230-1490 m. rr. VI-VII.

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. [*Reynoutria japonica* Houtt.] -. Hierba nudosa japonesa. Renouée à feuilles pointues. Japanese knotweed. AQUA(h). 1240 m. rrr. AL/INV/ER.

Koenigia alpina (All.) T.M.Schust. & Reveal [*Polygonum alpinum* L.] Presseguera alpina. Polígono alpino. Renouée des Alpes. Alpine knotweed. HERB(c,si). 1520-2460 m. c. VI-VIII.

Oxyria digyna (L.) Hill Oxíria. -. Oxyria à deux styles. -. ROC(t). 2020-2700 m. r. VII-VIII.

Persicaria amphibia (L.) Delarbre [*Polygonum amphibium* L.] -. -. -. AQUA(cr). 1260 m. rrr. VII.

Persicaria bistorta (L.) Samp. subsp. *bistorta* [*Polygonum bistorta* L. subsp. *bistorta*] Bistorta. Bistorta. Bistort. PRAT(h)/AQUA/HERB(m). 1300-2180 m. cc. VI-VIII.

Persicaria hydropiper (L.) Pebre d'aigua. Persicaria picante. Poivre d'eau. Water pepper. AQUA(j,cr). 1240-1480 m. Rr. VII-VIII.

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre [*Polygonum lapathifolium* L.] Presseguera borda. Renouée à feuilles d'oseille. Curlytop knotweed. AQUA. 1220-1280 m. rr. VII.

Persicaria maculosa Gray [*Polygonum persicaria* L.] Herba presseguera. Persicaria. Persicaire. Willow weed. RUD/ARV. 1220-1780 m. r. VI-VIII.

Persicaria mitis (Schrank) Holub [*Polygonum mite* Schrank] . -. -. -. AQUA(J,cr). 1360 m. rrr. VII.

Persicaria orientalis (L.) Spach [*Polygonum orientale* L.] . -. -. -. ARV. 1320 m. rrr. AL/AC.

Persicaria vivipara (L.) Ronse Decr. [*Polygonum viviparum* L.] Bistorta vivípara. Bistorta vivípara. Renouée vivipare. Viviparous bistort. PRAT/HERB/MAT. 1700-2720 m. c. VI-VII.

Polygonum aviculare L. Passacamins. Centinodia. Renouée des oiseaux. Common knotgrass.. RUD(t). cc. VI-VIII.

Rumex acetosa L. subsp. *acetosa* Xiscoll/Agrella. Acedera. Grande oseille. Common sorrel. PRAT(h). 1240-2080 m. cc. V-VII.

Rumex acetosella L. subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb. Agrelleta. Acederilla. Petite oseille des Pyrénées. Sheep's sorrel. PRAT(a). 1240-2480 m. c. V-VII.

Rumex arifolius All. [*R. acetosa* subsp. *amplexicaulis* (Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo] Agrella. Ruibarbo bastardo. Rumex à feuilles amplexicaules. Mountain dock. HERB(m). 1780-2200 m. r. VI-VIII.

Rumex conglomeratus Paradella conglomerada. Romaza. Oseille agglomérée. Clustered dock. AQUA(j,cr)/RUD(h,h). 1240-1500 m. r. VI-VIII.

Rumex crispus L. Paradella crespa. Romaza rizada. Oseille crêpue. Curled dock. RUD(h,p). 1200-2080 m. cc.

Rumex longifolius DC. -. -. -. -. RUD(h). 1780 m. rrr. VII.

Rumex obtusifolius L. Llengua de bou. Romaza de hoja grande. Patience sauvage. Broad leaved dock. RUD(h). 1200-2200 m. cc. VII.VIII.

Rumex pulcher L. subsp. *pulcher* Paradella mollerosa. Romaza menor. Oseille gracieuse. Fiddle dock. RUD(t). 1220-1350 m. rr. VII-VIII.

Rumex scutatus L. Badola/Agrella. Acedera romana. Oseille ronde. Shield dock. ROC(t). 1220-2050 m. cc. VI-VIII.

Rumex xpratensis Mert. et Koch [R. obtusifolius x crispus] RUD. 1240 m. rr. VII.

Portulacaceae

Portulaca oleracea L. Verdolaga. Verdolaga comú. Pourpier. Green purslane. RUD/ARV 1200-1220 m. rrr. VI.

Primulaceae

Androsace argentea (C.F.Gaertn.) Lapeyr. [A. vandellii auct., non Chiov.] Andròsace imbricada. -. -. -. ROC(r,si). 1700-2200 m. c. VI-VII.

Androsace halleri L. subsp. *nuria* Schöenw. & Schneew. [A. halleri auct., non L.] Andròsace càrnica. -. -. -. PRAT. 1980-2700 m. r. VI-VII.

Androsace villosa L. subsp. *villosa* Androsace pelosa. -. -. Rock jasmin. PRAT(r). 1600-2600 m. cc. V-VII.

Androsace vitaliana (L.) Lapeyr. subsp. *vitaliana* [Vitaliana primuliflora Bertol. subsp. *canescens* O. Schwarz] . -. -. ROC(t)/PRAT(r). 2220-2700 m. c. VII-VIII.

Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. [Anagallis arvensis L. subsp. *arvensis*] Morró (blau, vermell). Morrón. Mouron des champs. Common pimpernel. RUD. 1200-1540 m. c. V-X.

Lysimachia foemina (Mill.) U. Manns & Anderb. [Anagallis foemina Mill.; A. arvensis subsp. *foemina* (Mill.) Schinz & Thell.] -. -. ROC(co). 1200 m. rrr. VI.

Primula hirsuta All. (Sub P. viscosa Vill.). Error.

Primula integrifolia L. Prímula integrifòlia. Prímula alpina. Primevère à feuilles entières. Entire-leaved primrose. PRAT(si). 1740-2640 m. cc. V-VII.

Primula intricata Gren. & Godr. [P. elatior (L.) L. subsp. *intricata* (Gren. & Godr.) Widmer] Prímula gran. Primavera. Primevère intriquée. Oxlip. PRAT. 1220-2200 m. c. V-VI.

Primula latifolia Lapeyr. subsp. *latifolia* Prímula latifòlia. Primavera de hojas grandes. Primevère à larges feuilles. Viscid primrose. ROC(si). 1500-2700 m. cc. VI-VII.

Primula veris L. [P. veris L. subsp. *columnae* (Ten.) Maire et Petitm.] Prímula vera. Prímula comú. Primevère de columna. Cowslip. BOSC(s)/HERB(v,s). 1200-1700 m. cc. V-VI.

Soldanella alpina L. subsp. *alpina* Soldanel-la alpina. Soldanelala alpina. Soldanelle des alpes. -. AQU(c,m)/PRAT(h). 1520-2500 m. c. V-VII.

Ranunculaceae

Aconitum anthora L. Tora groga. Acónito amarillo. Aconit anthore. Yellow monkshood. HERB(m)/PRAT(h)(ca). 1620-1840 m. rr. VIII-IX.

Aconitum lycoctonum L. [A. vulparia subsp. *ranunculifolium* (Rchb.) M. Laínz; A. pyrenaicum subsp. *lamarckii* (Rchb.) O. Bolòs & Vigo] Tora pirinenca. Hierba lobuna. -. -. HERB(m,c). 1200-2500 m. c. VII-IX.

Aconitum napellus L. subsp. *vulgare* Rouy & Foucaud. Tora/Tora blava. Acónito azul. Aconit commun. -. HERB(m). 1380-2600 m. ccc. VII-IX.

Actaea spicata L. Herba de sant cristòfol. Yerba de San Cristóbal. -. -. BOSC(h). 1440-1720 m. rr. VI-VII.

Adonis aestivalis L. subsp. *aestivalis* Ull de perdiu. -. Adonis d'été. Pheasant's-eye. ARV. 1300 m. rrr. VI.

- Adonis pyrenaica* DC. Adonis pirinenc. -. Adonis des Pyrénées. -. ROC(r,t). 1800-2500 m. rr. VI-VII.
- Anemone nemorosa* L. Búixol. Anémone de los bosques. Anémone des bois. Wood anemone. BOSC(h,br). 1250-1580 m. r. IV-VI.
- Anemone ranunculoides* L. Buixol groc. Anémone fausse renoncule. -. BOSC(h,br). 1250-1400 m. rrr. IV-V.
- Aquilegia alpina* L. Error.
- Aquilegia vulgaris* L. Campana/Corniol. Aguileña. Ancolie commune. Columbine. BOSC(h)/HERB(v,m). 1200-2140 m. cc. V-VII.
- Caltha palustris* L. Calta. Calta. Caltha des marais. -. AQUA(f,m). 1220-2200 m. cc.V-VI.
- Clematis recta* L. Herba bormera. Flámula de júpiter. Clématite dressée. -. HERB(v,h)/BOSC(br). 1225 m. rrr. VI-VII.
- Clematis vitalba* L. Ridorta/Vidalba. Hierba de los pordioseros. Clématite des haies. Evergreen clematis. 1200-1500. c. VI-VII.
- Delphinium montanum* DC. [D. elatum subsp. montanum (DC.) Nyman; D. elatum auct.] Esperó de muntanya. -. Dauphinelle des montagnes. -. ROC(t)/HERB(m). 1640-2650 m. rr. PROT. AME/NT..
- Delphinium verdunense* Balb. (D. peregrinum subsp. verdunense (Balb.) Cout.) ARV/ROC(t). 1220-1280 m. rrr. VII.
- Ficaria ambigua* Boreau [F. verna subsp. fertilis (Laegaard) Stace; Ranunculus ficaria subsp. fertilis Laegaard; F.verna Huds. subsp. verna; F. verna subsp. bulbifera A. Löve & D. Löve] Gatassa. Celidonia menor. Ficaire. Lesser celandine. BOSC(h,br). 1220-1600 m. rr. IV-V.
- Helleborus foetidus* L. Marxívol. Heléboro comú. Ellébore fétide. Bear's foot. BOSC(s). 1200-1880 m. cc. IV.
- Helleborus viridis* L. subsp. *occidentalis* (Reut.) Schiffn. El-lèbor verd. Eléboro verde. -. Green hellebore. BOSC(h,br). 1240- 2020 m. cc.III-IV.
- Hepatica nobilis* Schreb. [Anemone hepatica L.] Herba fetgera/Viola de llop. Hepática. Anémone hépatique. Kidneywort. BOSC. 1200-2000 m. cc. IV-VI.
- Pulsatilla alpina* (L.) Delarbret subsp. *apiifolia* (Scop.) Nyman [Anemone alpina L. subsp. *apiifolia* (Scop.) O. Bolòs & Vigo] Herba del Vent. Pulsatila. -. -. PRAT/BOSC(si). 1620-2650 m. cc. VI-VII.
- Pulsatilla alpina* subsp. *font-queri* M. Laínz & P. Monts. [Anemone alpina subsp. *font-queri* (M. Laínz & P. Monts.) O. Bolòs & Vigo] PRAT/BOSC(ca). 1400-2150 m. c. V-VII.
- Pulsatilla vernalis* (L.) Mill. [Anemone vernalis L.] Anèmone vernal. -. -. -. PRAT(si). 1800-2720 m. c. V-VI.
- Ranunculus aconitifolius* L. [R. aconitifolius L. subsp. *aconitifolius*] Ranuncle aconitifoli. Ranúnculo con hojas de acónito. Renoncule à feuilles d'aconit. Aconite-leaved Buttercup. AQUA(h). 1680-2380 m. rrr. VII.
- Ranunculus acris* subsp. *despectus* M. Laínz Gata rabiosa/Botó d'or. Botón de oro de bosque. -. -. 1200-2080 m. cc. V-VII.
- Ranunculus amplexicaulis* L LOC.PRO.
- Ranunculus angustifolius* DC. [R. pyrenaeus subsp. *angustifolius* (DC.) Rouy & Foucaud]-. -. -. -. AQUA(m). 2000 m. rrr. VII.
- Ranunculus arvensis* L. Ranuncle arvense. -. Renoncule des champs. -. ARV. 1260-1280 m. r. VI-VII.
- Ranunculus bulbosus* L. subsp. *aleae* (Willk.) Rouy & Foucaud PRAT(t). 1240 m. rrr.
- Ranunculus bulbosus* L. subsp. *bulbosus* [R. bulbosus subsp. *bulbifer* (Jord.) J.B. Neves] Gata rabiosa/Ranuncle bulbós. Botón de oro peloso. Renoncule bulbeuse. Bulbous buttercup. 1200-2180 m. ccc. V-VIII.
- Ranunculus envalirensis* Grau [R. auricomus auct., p.p.] Ranuncle daurat. -. Renoncule à têtes d'or. -. PRAT/BOSC(h). 1600-2450 m. cc. V-VII.
- Ranunculus flammula* L Mataanyells. -. Renoncule flammette. -. AQUA(f)/BOSC(br). 1320-1380 m. rrr. VIII.
- Ranunculus gramineus* L. Ranuncle de codina. -. Renoncule à feuilles de graminée. -. 1720 m. rrr. VI.

Ranunculus hederaceus L. -. - . -. AQUA(f). 1480-1500 m. rrr. VI-IX.

Ranunculus parnassifolius L. subsp. *parnassifolius* Herba del mal gra. -. Renoncule à feuilles de parnassie. -. 1920-2780 m. c. VI-VII.

Ranunculus platanifolius L. [R. *aconitifolius* subsp. *platanifolius* (L.) Rikli] Ranuncle platanifoli. Ranúnculo hoja de plátanero. Renoncule à feuilles de platane. -. HERB(m). 1430-1890 m. r. VI-VII.

Ranunculus pyrenaeus L. Ranuncle pirinenc. -. Renoncule des pyrénées. -. PRAT(h,si). 2000-2640 m. cc. V-VII.

Ranunculus repens L. - Botó d'or (repent). Botón de oro reptante. Renoncule rampante. Renoncule bulbeuse. Bulbous buttercup. PRAT(t)/RUD(t). 1200- 2080 m. ccc. V-VII.

Ranunculus ruscinonensis Landolt [R. *montanus* subsp. *ruscinonensis* (Landolt) O. Bolòs & Font Quer] PRAT(h,ac). 1350-2200 m. cc VI-VII.

Ranunculus tuberosus Lapeyr. [R. *serpens* Schrank subsp. *nemorosus* (DC.) G. López] -. Botón de oro tuberoso. -. Renoncule des bois. -. BOSC(h). 1200-2100 m. cc. VI-VIII.

Thalictrum alpinum L. Talictre alpí. -. Pigamon des Alpes. -. AQUA(c,m). 1800-2600 m. r. VI-VII.

Thalictrum aquilegiifolium L. Talictre aquilegfoli. Talictro de bosque. Colombine panachée. -. HERB(m)/PRAT(h). 1280-2040 m. r. VI-VII.

Thalictrum minus L. subsp. *saxatile* Ces. [T. *minus* L.] var. *majus* (crantz) Crépin f. *aurigeanum* (Ballet et Thm.) Flous et Gaussen. Gata rabiosa. Talictro de pedregal. -. -. HERB(v),PRAT. 1250 m. rrr. VI-VIII.

Thalictrum minus L. subsp. *saxatile* Ces. [T. *minus* L.] var. *pyrenaicum* (Jord.) O. Bolòs et Vigo [T. *minus* subsp. *pyrenaicum* Jord.] Gata rabiosa. Talictro de pedregal. -. -. HERB(v),PRAT. 1200-2400 m. c. VI-VIII.

Thalictrum simplex L. subsp. *simplex* [T. *flavum* subsp. *simplex* (L.) O. Bolòs & Vigo; T. *flavum* subsp. *costae* (Debeaux) Rouy & Foucaud; T. *flavum* subsp. *flavum* sensu O. Bolòs & Vigo] Ruibarbre de pobre. Ruibarbo de los pobres. Pigamon des rives. Common meadow rue. AQUA(j)/PRAT(h). 1470 m. rrr. VII.

Thalictrum tuberosum L. Error.

Trollius europaeus L. Cloclou o flor de Sant Pere/Rovell d'ou. Calderones. Trolle. -. PRAT(h)/HERB(m)/AQUA(f). 1220-2230 m. c. VI-VII.

Resedaceae

Reseda glauca L. -. - . -. ROC(t,ca). 1900-2200 m. c. VI-VII.

Reseda lutea L. subsp. *lutea* Gandaia. Gualdón. Réséda jaune. Wild mignonette. RUD(h). 1240-1480 m. r. VI-VIII.

Reseda luteola L. subsp. *luteola* Galda. Gualda. Réséda des teinturiers. Weld. RUD/ROC(t). 1230-1550 m. r. VI-VIII.

Reseda phyteuma L. subsp. *phyteuma* Pebrots de ruc. Gualdilla. Réséda raiponce. Corn mignonette. ARV. 1240-1260 m. rrr. V-VI.

Sesamoides interrupta (Boreau) G. López [Sesamoides *pygmaea* (Scheele) O. Kuntze] Astrocarp. -. -. -. ROC(t),PRAT(r). 2000-2660 m. r.

Rhamnaceae

Atadinus alpinus (L.) Raf. (*Rhamnus alpina* L.) Púdol. -. Nerprun des Alpes. -. ROC(r,t,ca). 1400-2200 m. c. V-VI.

Atadinus pumilus (Turra) Hauenschmid [*Rhamnus pumila* Turra] Púdol menut. -. Nerprun nain. -. 1600-2500 m. rr. V-VII.

Frangula alnus Mill. subsp. *alnus* Fràngula. Arraclán. Bourdaine. -. BOSC(h,br)/MAT(b). 1220-1400 m. rr. V-VI.

Rosaceae

Agrimonia eupatoria L. subsp. ***eupatoria*** Herba cuquera, herba del mal estrany/Agrimònia. -.

Aigremoine eupatoire. Agrimony. HERB(v,c)/PRAT. 1200-1600 m. cc. VI-IX.

Agrimonia procera Wallr. -. -. -. HERB(v,h). 1240-1480 m. rr. VI-VII.

Alchemilla gènere que requereix més estudi.

Alchemilla alpigena Hegi [A. alpina subsp. *asterophylla* sensu O. Bolòs & Vigo; A. *fontqueri* Rothm.; A. *plicatula* auct., p.p.] PRAT(ca). 1480-2400 m. r . VII.

Alchemilla alpina L. Peucrist o peu de rei/Alchemil·la alpina. Pie de león alpino. Alchémille des Alpes -. MAT(n),PRAT(si). 1800-2600 m. c. VI-VII.

Alchemilla borderei S.E. Fröhner [A. *pyrenaica* L.]. Error.

Alchemilla catalaunica Rothm. [A. alpina subsp. *catalaunica* (Rothm.) O. Bolòs & Vigo; A. *alpina* auct., p.p.; A. *plicatula* auct., p.p.] ROC. 1820 m. rrr. VII.

Alchemilla colorata Buser [A. *hybrida* subsp. *colorata* (Buser) Gams] PRAT(h,ac). 1520-2320 m. r. VII-VIII.

Alchemilla connivens Buser [A. *vulgaris* subsp. *connivens* (Buser) E.G. Camus] PRAT. 1480-2230 m. r. VI-VIII.

Alchemilla coriacea Buser [A. *vulgaris* subsp. *coriacea* (Buser) E.G. Camus] Pota de lleó. Pie de león coriáceo. -. -. AQUA(f). 1500-2100. c. VI-VII.

Alchemilla fissa Günther & Schummel [A. *fissa* subsp. *pyrenaica* (Dufour) O. Bolòs & Vigo; A. *pyrenaica* Rothm.]-. -. -. -. AQUA(c). 2150-2500 m. rr. VIII-IX.

Alchemilla flabellata Buser [A. *hybrida* subsp. *flabellata* (Buser) Gams] Pota de lleó. -. Alchémille en éventail. -. 1200-2500 m. cc. VI-VIII.

Alchemilla glaucescens Wallr. [A. *hybrida* subsp. *glaucescens* (Wallr.) O. Bolòs & Vigo] -. -. -. -. PRAT. 1280 m. rrr. VII.

Alchemilla saxatilis Buser [A. *alpina* subsp. *saxatilis* (Buser) E.G. Camus; A. *alpina* auct.] Herba de plata. -. Alchémille des rochers. -. 1200-2700 m. cc. VI-VIII.

Alchemilla straminea Buser [A. *vulgaris* subsp. *straminea* (Buser) O. Bolòs & Vigo] PRAT(h)/AQUA(f). 1700 m. rrr.

Alchemilla xanthochlora Rothm. [A. *vulgaris* subsp. *xanthochlora* (Rothm.) O. Bolòs & Vigo, A. *vulgaris* auct.] PRAT(h). 1250-2000 m. c. V-VIII.

Amelanchier ovalis Medik. ROC(r,ca). 1520 m. rrr. IV-VI.

Aphanes arvensis L. -. -. Alchémille des champs.- -.PRAT(a)/ARV. 1020-1040 m. rr. V.

Aria edulis (Willd.) M. Roem. [*Sorbus aria* (L.) Crantz] Moixera. Mostajo. Alisier blanc. -. Boscos humits. 1200-2050 m. V-VI. cc.

Aruncus dioicus (Walter) Fernald-. -. -. -. HERB(v). 1500 m. rrr.

Cotoneaster integrerrimus Medik. Cornera. Cotonéaster commun. -. MAT(b,g)/PRAT. 1650-2080 m. r. VI.

Crataegus monogyna Jacq. Arç blanc. Majuelo. Aubépine à un style. Hawthorn. MAT(b)/BOSC. 200-1760 m. ccc. V-VI.

Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. [*Potentilla fruticosa* L.] Potentil·la fructicosa. -. Potentille arbustive. -. 1780-2180 m. AQUA(f,m). r. VI-VIII. PROT. AME/NT.

Dryas octopetala L. subsp. ***octopetala*** Drias. -. Dryade à huit pétales. -. MAT(c,ca). 2000-2750 m. c. VI-VII.

Drymocallis rupestris (L.) Soják [*Potentilla rupestris* L.] ROC. 1250 m. rrr.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Reina dels prats. Reina de los prados. Reine-des-prés. Meadow sweet. HERB(h,m). 1200-1680 m. cc. VII-VIII.

Filipendula vulgaris Moench Filipèndula. Filipendula. Filipendule commune. -. PRAT(h). 1640 m. rrr. VII.

Frangaria vesca L. Maduixera. Fresa silvestre. Fraisier des bois. Wild strawberry. HERB(v,c). 1200-1840 m. cc. 1200-2000 m. ccc. V-VII.

Geum montanum L. Gèum muntanyenc. -. Benoîte des montagnes. -. PRAT(ac). 2000-2600 m. r. VII-VIII.

Geum pyrenaicum Mill. Error.

Geum rivale L. . Gèum de ribera. -. Benoîte des ruisseaux. -. 1780-1980 m. rr. VII-VIII.

Geum urbanum L. Herba de Sant Benet. Cariofilada comú. Benoîte commune. Herb bennet. RUD(h,h)/BOSC(h,br). 1200-2000 m. ccc. V-VIII.

Malus sylvestris (L.) Mill. [*Pyrus malus* L.] Pomer. Manzano. Pommier des bois. Crab apple. MAT(b). 1200-1460 m. r. V-VI.

Potentilla argentea L. Agram de porc, Argentina, Maduixera borda, Potentil·la argentina. Cincoenrama recortada. Potentille argentée. -. PRAT(r). 12860-1850 m. r. V-VIII.

Potentilla brauniana Hoppe [*P. brauneana* Hoppe] - AQUA(c,ca). 2400 m. rrr. PROT.

Potentilla crantzii (Crantz) Fritsch Potentil·la estipular. Cincoenrama alpina. -. -. PRAT(s). 1600-2700 m. cc. VI-VIII.

Potentilla erecta (L.) Raeusch. Tormentil·la. Siete en rama. Potentille tormentille. Common tormentil. PRAT/MAT(ac). 1200-2000 m. ccc. V-VIII.

Potentilla micrantha DC. Fragassa de flor petita. -. Potentille à petites fleurs. -. MAT(g)/HERB(v). 1260-1880 m. c. V-VII.

Potentilla nivalis Lapeyr. subsp. *nivalis* Potentil·la nival. Cincoenrama nival. Potentille des neiges. -. ROC(r,t). 2220-2680 m. c. VII-IX.

Potentilla pyrenaica DC. -. -. -. PRAT(ac). 1700-2220 m. c. VII-VIII.

Potentilla recta L. Potentil·la recta. Cincoenrama erguida. Potentille dressée. Roughfruit cinquefoil. PRAT(s,r). 1240-1440 m. rr. VI-VII.

Potentilla reptans L. Gram negre. Cinco en rama. Potentille rampante. Creeping cinquefoil. RUD. 1200-2000 m. cc. VI-VIII.

Potentilla sterilis (L.) Garcke Fragassa de bosc. Cincoenrama fresal. Potentille stérile. -. BOSC(h). 1300-1400 m. r. IV-V.

Potentilla verna L. [*P. neumanniana* Rchb.] Flors de la fam. Cincoenrama verna. Potentille de Neumann. -. PRAT(s). 1200-2000 m. cc.

Poterium sanguisorba L. subsp. *sanguisorba* [*Sanguisorba minor* Scop. subsp. *minor*] Pimpinella. Pimpinela menor. Petite pimprenelle. -. PRAT. 1200-2000 m. ccc. VI-VIII.

Prunus avium (L.) L. Cirer/Cirerer. Cerezo. -. Wild cherry BOSC(h). 1200-1500 m. cc. IV-V.

Prunus domestica L. Pruner/Pruner. Ciruelo. Prunier. Common plum. MAT(b). 1240-1450 m. r. IV-V.

Prunus spinosa L. Aranyoner. Espino negro. Épine noire. Blackthorn. MAT(b). 1200-1500 m. cc. IV-V.

Rosa, gènere que mereix més estudi.

Rosa agrestis Savi -. -. -. MAT(b). 900-1600 m. c. VI-VII.

Rosa andegavensis Bastard [*R. canina* subsp. *andegavensis* (Bastard) Nyman] - MAT(b), 1290 m. rrr.

Rosa canina L. [*R. canina* L. subsp. *canina*] Roser de pastor/Roser caní. Rosal silvestre. Églantier des chiens. Dog rose MAT(b). 1200-188 m. c. VI-VIII.

Rosa pendulina L. [*R. alpina* L.] Roser alpí. Rosal alpino. Églantier des alpes. -. MAT(n)/BOSC(p)/HERB(m). 1500-2200 m. cc. VI-VII.

Rosa rubiginosa L. -. -. -. MAT(b). 1340-2000 m. cc. VI-VIII

Rosa spinosissima L. [*R. pimpinellifolia* L.] -. -. -. MAT(b). 1600-2100 m. rr. VII.

Rosa stylosa Desv. [*R. canina* subsp. *stylosa* (Desv.) Masclans] -. -. -. -. MAT(b). 1240-1520 m. r. VI-VII.

Rosa villosa L. [*R. villosa* subsp. *mollis* (Sm.) Hook. fil.; *R. mollis* Sm.] MAT(b). 1450 m. rrr. VII.

Rosa vosagiaca N.H.F. Desp. [*R. coriifolia* Fries subsp. *vosagiaca* (dsp) Keller; *Rosa dumalis* Bechst. subsp. *vosagiaca* (Desp.) P. Fourn.] -. -. -. MAT(b). 1380-1760 m. r. VII-VIII.

Rubus, gènere que mereix més estudi

Rubus caesius L. - Romegueró. Zarzamora reptante. Ronce bleu. Dewberry. BOSC(br). 1200-1970 m. cc. V-VII.

“*Rubus godronii* Lecoq. & Lamotte subsp. *amplistipulus* Sudre” -. -. -. -. MAT(b)/BOSC(h). 1220-1600 m. c. VI-VII.

- Rubus hirtus** Waldst. & Kit. [R. ser. Glandulosi sensu Bolòs & Vigo] Esbarzer glandulós. -.-. MAT(b)/BOSC(h). 1280-1480 m. rrr. VII-VIII.
- Rubus idaeus** L. - Jordonera/Gerdera. Frambueso. Framboisier. Raspberry. MAT(b)/HERB(c). 1200-2200 m. cc. V-VII.
- Rubus saxatilis** L. -.-.- BOSC(ca). 1725. rrr. VII-VIII.
- Rubus ulmifolius** Schott [R. discolor auct., non Weihe et Nees] - Romeguera/Esbarzer. Zarzamora. Ronce à feuilles d'orme. Bramble. MAT(b). 1200-1575 m. cc. VI-VIII.
- Sanguisorba officinalis** L. Pimpinella major. Sanguisorba mayor. Grande pimprenelle. -. PRAT(h). 1240-2100 m. c. VII-VIII.
- Sibbaldia procumbens** L. Sibàldia. -. Sibbaldie couchée. -. AQUA(c). 2100-2740 m. rr. VII-VIII.
- Sorbus aucuparia** L. subsp. *aucuparia* Moixer de guilla. -. Serbal de cazadores. Sorbier des oiseleurs. -. BOSC(p). 1280-2020 m. c. V-VII.

Rubiaceae

- Asperula arvensis** L. - RUD(t). 1200 m. rrr.
- Asperula cynanchica** L. subsp. *cynanchica* [incl. A. *cynanchica* subsp. *brachysiphon* (Lange) O. Bolos & Vigo] ROC(r)/PRAT(r). 1400-1800 m. r. VI-VII.
- Asperula cynanchica** subsp. *pyrenaica* (L.) Nyman ROC(r)/PRAT(r). 1700-2200 m. rrr. VII.
- Cruciata glabra** (L.) Ehrend. (*Galium vernum* Scop.) Te de bosc. Crucíada glabra. Croisette glabre. -. PRAT/ROC/BOSC(h). 1200-2700 m.cc. V-VII.
- Cruciata laevipes** Opiz [*Galium cruciata* (L.) Scop.] Creuera. Cruzada. Croisette commune. Crosswort. RUD. 1220-2020 m. c. V-VI.
- Galium album** Mill. [*G. mollugo* subsp. *erectum* Syme] Espunyidera blanca. -. Caille-lait commun. -. PRAT(h). 1200-1480 m. r. VI-VIII.
- Galium aparine** L. Rèvola/Apegalós. Amor de hortelano. Gaillet accrochant. Goosegrass. ARV/RUD. 1200-2000 m. cc. V-VIII.
- Galium cometerhizon** Lapeyr. Espunyidella de pedrusca. -. Gaillet à racines chevelues. -. ROC(t). 2200-2870 m.c. VI-VIII.
- Galium estebanii** Sennen [*G. pumilum* Murray subsp. *pinetorum* (Ehrend.) Vigo; *G. pinetorum* Ehrend.] Espunyidella prima. -.-. PRAT/MAT/BOSC. 1200-1900 m. cc. VI-VIII..
- Galium lucidum** All. subsp. *lucidum* Espunyidella blanca. -.-. HERB(v)/PRAT(a). 1200-1760 m. c. VI-VIII.
- Galium marchandii** Roem. & Schult. [*G. pumilum* Murray subsp. *marchandii* (Roem. & Schult.) O. Bolos & Vigo] PRAT/BOSC/MAT/ROC(t). 1800-2680 m. c. VI-VIII.
- Galium maritimum** L. Espunyidella peluda. -.-. HERB(v). 1200-1810 m. cc. VI-VIII.
- Galium mollugo** L. - PRAT(h,d). 1300 m. rrr.
- Galium odoratum** (L.) Scop. [*Asperula odorata* L.] Espunyidella d'olor. -. Aspérule odorante. -. BOSC(h). 1700 m. rrr. VI.
- Galium palustre** L. Espunyidella palustre. Galio de río. Gaillet des marais. -. AQUA. 1340-1720 m. r. VI-VIII.
- Galium pusillum** L. - Error
- Galium pyrenaicum** Gouan - Espunyidella pirinenca. -. Gaillet des pyrénées. -. PRAT, ROC(ca). 1750-2720 m. c. VI-VIII.
- Galium uliginosum** L. -.-. PRAT/RUD(t) (h). 1450 m. rrr. VII.
- Galium verum** L. subsp. *verum* Espunyidella groga. Cuajaleche. Gaillet jaune. Lady's bedstraw. PRAT(h). 1200-2290 m. cc. VI-IX.
- Sherardia arvensis** L. Rèvola borda. Azulilla. Shérardie des champs. -. PRAT(a)/ROC(m). 1200 m.rr. VI.

Salicaceae

- Populus nigra** L. Pollancré. Alamo negro. Peuplier noir. Black poplar. BOSC(br). 1200-1550 m. r. III-IV.

- Populus tremula* L. subsp. *tremula* Trèmol/Trèmol. Álamo temblón. Peuplier tremble. Aspen poplar. BOSC(h)/HERB(c). 1240-1980 m. cc. IV-V.
- Populus ×canadensis* Moench [*P. deltoides* × *P. nigra*] Aure poll/Pollangre/Pollancré. Álamo negro. Peuplier noir. Black poplar. BOSC(br). 1260-1620 m. cc.
- Salix atrocinerea* Brot. (*S. cinerea* subsp. *oleifolia* Macgreith) Gatsaule/Gatell. Salguera. Saule roux-cendré. Grey willow. BOSC(br). 1260-1700 m. c. IV-V.
- Salix bicolor* Willd. [*S. phylicifolia* L. subsp. *bicolor* (Willd.) O. Bolòs & Vigo] Salze bicolor. Saule bicolore. -. AQUA(t). 2080 m. rrr. FENO.
- Salix caprea* L. –Gatsaule/Gatsaule. Sauce cabruno. Saule des chèvres. Goat willow. BOSC(h)/HERB(c)/ROC(t). 1200-2000 m c.. III-IV.
- Salix elaeagnos* Scop. Sarga. Sargatillo. Saule à feuilles étroites. Elaeagnus Willow. BOSC(br)/AQUA. 1200-1600 m. r. IV-V.
- Salix herbacea* L. Salenca herbàcia. -. Saule herbacé. -. AQUA(c). 2100-2680 m. r. VI-VII.
- Salix lapponum* L. [*S. lapponum* subsp. *ceretana* P. Monts.; *S. ceretana* (P. Monts.) Chmelar] Citat a prop.
- Salix purpurea* L. Saulic. Sauce rubión. Saule pourpre. -. BOSC(br)/AQUA. 1220-1640 m. c. IV-V.
- Salix pyrenaica* Gouan Salenca dels Pirineus. -. Saule des pyrénées. -. AQUA(c,f,t) (ca). 2040-2200 m. rrr. VI-VII.
- Salix reticulata* L. LOC.PRO.
- Salix retusa* L. Salenca retusa. -. Saule à feuilles rétuses. -. AQUA(c). 2000-2700 m. cc. VI-VII.
- Salix ×fragilis* L. [*S. alba* x *S. euxina* I.V. Belyaeva; *S. x rubens* Schrank] Salze blanc. Sauce. Saule fragile. Crack willow. BOSC(br). 1220-1680 m. r. IV-V.
- Salix ×quercifolia* Sennen [*S. caprea* × *S. cinerea* var. *atrocinerea*] BOSC(br). 1480 m. rr. IV.
- Salix ×schinziana* Braun-Blanq. [*S. herbacea* × *S. pyrenaica*] AQUA(c). 2110-2400 m. rrr.

Santalaceae

- Thesium alpinum* L. subsp. *alpinum* Tèsium alpí. Mimbrera roja. Thésium des alpes. -. PRAT(h)/ROC(r,h). 1530-2120 m. r. VI-VII
- Thesium humifusum* DC. [*T. divaricatum* Jan et Mert. et Koch in Röhling] Tèsium divaricat. Tesio comú. Thésium couché. -. PRAT/ROC(s). 1400-1720 m. VI-VII.
- Viscum album* L. subsp. *album* Vesc. Muérdago. -. -. BOSC(h) sobre *Fraxinus excelsior*. 1340 m. rrr. VII.
- Viscum album* L. subsp. *austriacum* (Wiesb.) Vollm. Vesc. Muérdago. -. -. BOSC (*Pinus uncinata*). 1700 m. rrr.

Sapindaceae

- Acer campestre* L. Auró blanc. Arce comú. Érable champêtre. Hedge maple. BOSC(h). 1200-1560 m. c. IV-V.
- Acer negundo* L. Negund. Negund. Arce negundo. Érable negundo. -. BOSC(br). 1200-1420 m. rrr. IV-V.
- Acer opalus* Mill. subsp. *opalus* Blada. Acirón. Érable à feuilles d'obier. Italian maple. BOSC(s). 1340-1600 m. rrr. IV-V.
- Acer platanoides* L. Erable. Arce real. -. -. BOSC(br). 1200-1440 m. rr. IV.
- Acer pseudoplatanus* L. Fal plàtan. Arce sicómoro. Érable sycomore. -. BOSC(br). 1220 m. rrr. V.

Saxifragaceae

- Chrysosplenium oppositifolium* L. Crisosplesi. Hepática dorada. Dorine à feuilles opposées. Opposite-leaved golden-saxifrage. AQUA(c). 1200-1840 m. c. IV-V.
- Heuchera sanguinea* Engelm. -. -. -. -. ROC(r). 1240 m. rrr. VII. AL/AC.

- Micranthes clusii* (Gouan) Fern. Prieto, V. Vázquez, Vallines & Cires [*Saxifraga clusii* Gouan] -.-. -. ROC(r,h). 2550 m. rrr. VIII.
- Micranthes stellaris* (L.) Galasso, Banfi & Soldano subsp. *stellaris* [*Saxifraga stellaris* L.] Saxifraga estelada. -. Saxifrage d'engler. -. AQUA(f,m). 1600-2550 m. c. VI-VIII.
- Saxifraga aizoides* L. Saxifraga groga. Saxífraga amarilla. Saxifrage faux orpin. -. AQUA(f)/ROC(h). 1200-2760 m. c. VI-VIII.
- Saxifraga androsacea* L. -.-. -. AQUA(c,f). 2340-2650 m. rr. VII-VIII.
- Saxifraga aquatica* Lapeyr. Enciam de font. -. Saxifrage aquatique. -. AQUA(f). 1900-2400 m. c. V-VIII.
- Saxifraga aspera* L. -.-. -. ROC(r),PRAT(a) (ac). 2100-2200 m. rrr. VII-VIII.
- Saxifraga bryoides* L. Saxífraga brioide. -. Saxifrage d'auvergne. -. ROC(r,t). 2100-1750 m. cc. VII-VIII.
- Saxifraga cuneifolia* L. Error.
- Saxifraga cotyledon* L. Error.
- Saxifraga exarata* Vill. Les cites es refereixen a *Saxifraga moschata* Wulfen.
- Saxifraga geranioidea* L. Herba de les setsagnies/Saxífraga geranioide. -. Saxifrage faux géranium. -. ROC(t)/MAT(n)(si). 1900-2700 m. cc. VI-VIII.
- Saxifraga granulata* L. subsp. *granulata* Saxífraga granulosa. Saxífraga comú. Saxifrage granulée. -. HERB(v). 1200-2200 m. cc. V-VII.
- Saxifraga media* Gouan Saxífraga mitjana. -. Saxifrage intermédiaire. -. ROC(r,ca). 1550-2650 m. r. VI-VII.
- Saxifraga moschata* Wulfen [*S. moschata* subsp. *fastigiata* (Luizet) P. Fourn.] Saxífraga moscada. -. Saxifrage musquée. -. ROC(r,t)/PRAT(r). 2000-2780 m. cc. VII-VIII.
- Saxifraga muscoides* All. (sub. *S. planifolia* Lap.). Error.
- Saxifraga oppositifolia* L. subsp. *oppositifolia* Saxífraga opositifòlia. Saxífraga àrtica. Saxifrage à feuilles opposées. -. ROC(t,ca). 1840-2700 m. cc. V-VII.
- Saxifraga paniculata* Mill. subsp. *paniculata* Corona de rei/Saxífraga paniculada. -. Saxifrage paniculée. -. ROC(r,ca). 1200-2720 m. cc. VI-VIII.
- Saxifraga pentadactylis* Lapeyr. subsp. *pentadactylis* Saxífraga de cinc dits. -. -. -. ROC(si,r). 2600-2750 m. r. VII-VIII.
- Saxifraga petraea* L. Error.
- Saxifraga praetermissa* D.A. Webb -.-. -. ROC(t,h)/AQUA(c,f). 2200-2600 m. rr. VIII-IX.
- Saxifraga pubescens* Pourr. subsp. *pubescens* Saxífraga pubescent. -. Saxifrage pubescente. -. ROC(r,t,si). 1550-2770 m. cc. VI-VII.
- Saxifraga rotundifolia* L. Error.

Scrophulariaceae

- Buddleja davidii* Franch. Budlèia. Lila de verano-. Buddléia de david. -. ROC. 1200-1960 m. cc. VII-IX. AL/INV.
- Scrophularia alpestris* Benth. Escrofulària alpestre. Escrofularia alpina. Scrofulaire des alpes. BOSC(br,h)/HERB(m). 1200-2000 m. c. VI-VIII.
- Scrophularia auriculata* subsp. *valentina* (Rouy) Ortega Oliv., Serra, Herrero & Muñoz Garm. [*S. auriculata* subsp. *pseudoauriculata* (Sennen) O. Bolòs & Vigo] Escrofulària aquàtica. Escrofularia acuática. Scrofulaire aquatique. Water figwort. AQUA(j,cr). 1240-1280 m. rrr. VI. M. Marcer (pers. comm. 2020).
- Scrophularia crithmifolia* Boiss. [*S. canina* subsp. *crithmifolia* (Boiss.) O. Bolòs & Vigo] Escrofulària de ca. Escrofularia de muntanya. Scrofulaire à feuilles de criste marine. -. ROC(t). 1240-1680 m. c. V-VII.
- Scrophularia nodosa* L. Escrofulària nodosa. Hierba de San Pedro. Scrofulaire noueuse. Figwort. BOSC(h)/HERB(v,c). 1200-1560 m. c. VII-IX.
- Verbascum blattaria* L. - HERB(v). 1240 m. rrr.
- Verbascum boerhavii* L. -.-. -. RUD. 1250-2020 m. c. VI-VIII.
- Verbascum chaixii* Vill. Cua de guilla/Trepó. -.-. -. HERB(v)/MAT(g)/PRAT. 1340 m. rrr. VII.

Verbascum lychnitis L. Cua de guilla/Trepó candeler. Gordolobo hembra. Molène lychnite. -. HERB(v,c). 1200-2200 m. cc. VI-IX

Verbascum pulverulentum Vill. Cua de guilla/Trepó pulverulent. Gordolobo de montaña. Molène floconneuse. -. RUD(h). 1240 2000 m. r. VI-VIII.

Verbascum thapsus L. [V. thapsus subsp. *crassifolium* (Lam.) Murb; V. thapsus subsp. *montanum* (Schrad.) Bonnier & Layens] RUD(h). Cua de guilla/Trepó joanal. Gordolobo. Molène des montagnes. Aaron's rod. RUD(h). 1200-2180 m. c. VII-IX.

Verbascum ×regelianum Wirtg. [V. lychnitis × V. pulverulentum] HERB(v). 1280 m. rr. VII.

Verbascum ×thaspi L. [V. ×spurium W.D.J. Koch; V. lychnitis × V. thapsus] HERB(v). 1300 m. rr. VII.

Solanaceae

Atropa belladonna L. Belladona. Belladona. Belladone. Deadly nightshade. RUD(t). 1250 m. rrr. VII.

Datura stramonium L. Herba talpera. Estramonio. Datura officinal. Thorn apple. ARV/RUD. 1260 m. rrr.

Hyoscyamus niger L. Herba queixalera. Beleño negro. Jusquiame noire. Henbane. RUD(s). 1540 m. rrr. VI.

Solanum dulcamara L. Dolçamara. Dulcamara. Morelle douce-amère. Bittersweet. BOSC(br)/HERB(h,c). 1220-1420 m. rr. VI-VII.

Solanum lycopersicum L. Tomaquera. Tomatera. -. -. RUD. 1220 m. rrr. VI. AL/AC.

Solanum nigrum L. Morella. Hierba mora. Morelle noire. Black nightshade. ARV/RUD(h). 1200-1600 m. rr. VI-IX.

Solanum tuberosum L. -. -. -. RUD. 1220 m. rrr. VI. AL/AC.

Solanum villosum Mill. [S. nigrum subsp. *miniatum* Willd.] -. -. -. -. RUD. 1460 m. rrr. VIII.

Thymelaceae

Daphne cneorum L. subsp. *cneorum* Dafne pirinenc. -. -. -. PRAT(ca). 2300 m. rrr.VI.

Daphne laureola L. subsp. *laureola* Senet/Senet bord/Lloreret. Lauréola. Daphné lauréole. -. BOSC(s). 1200-1540 m. c. IV-V.

Daphne mezereum L. subsp. *mezereum* Senet/Tintorell. Lauréola hembra. Daphné bois-gentil. Dwarf laurel. Spurge daphne. BOSC(h)/HERB(m). 1400-2350 m. cc. V-VII.

Thymelaea dioica (Gouan) All. Bufalaga de roca. -. Passerine dioïque. -. ROC(r,ca). 1370-2100 m. r. V-VII.

Ulmaceae

Ulmus glabra Huds. Om/Oma. -. Orme de montagne. -. BOSC(h,br). 1200-1460 m. r. IV.

Ulmus minor Mill. Om/om. Olmo. Petit orme. English elm. BOSC(h,br). 1200-1480 m. rr. III-IV.

Urticaceae

Parietaria judaica L. [P. officinalis L susp. *judaica* (L.) Béguinot] Blet de paret/Morella roquera. Parietaria. Pariétaire couchée. Pellitory of the wall. RUD/ROC(m). 1200-1460 m. rr.

Urtica dioica L. subsp. *dioica* Otriga/Ortiga gran. Ortiga mayor. Grande ortie. Stinging nettle. RUD(h). 1200-2200 m. ccc. VI-VIII.

Urtica urens L. Ortiga. -. -. -. ARV/RUD. 1240-1450 m. rr. VI.

Valerianaceae

Centranthus ruber (L.) DC. subsp. *ruber* Herba de Sant Jordi. Centranto. -. -. ROC(m)/HERB(v). 1220 1560 m. c. VI. AL/SUB.

Valeriana apula Pourr. [*V. globulariifolia* Ramond ex DC. in Lam. et DC.] Valeriana globularifòlia. -. Valériane à feuilles de globulaire. -. ROC(r, ca). 1780-2650 m. c. VI-VIII. *Valeriana montana* L. Valeriana muntanyenca.. -. Valériane des montagnes .-. ROC(t,r,ca). 1200-2010 m. c. VI-VII.

Valeriana officinalis L. Valeriana. Valeriana. Valérianie officinale. Valerian. HERB(v,h),PRAT. rr. VI-VII.

Valeriana pyrenaica L. Valeriana pirinenca. -. -. Valériane des Pyrénées. -. HERB(m)/AQUA. 1270-1700 m. rr. VII-VIII.

Valeriana stolonifera Czern. subsp. *angustifolia* Soo [*V. wallrothii* Kreyer; *V. officinalis* subsp. *collina* (Wallr.) Nyman; *V. officinalis* subsp. *tenuifolia* (Vahl: Schübl. & G. Martens.)- Valeriana. HERB(v),AQUA(he). rrr.

Valeriana tripteris L. subsp. *tripteris* [*V. montana* subsp. *tripteris* (L.) Rouy] Valeriana trisecta. -. Valériane à trois folioles. -. ROC(r,t,si). 1340-2400 m. c. VI-VII.

Valerianella dentata (L.) Pollich [incl. *V. ramosa* Bast.] -. -. -. -. ROC(m). 1250 m. rrr. VI.

Verbenaceae

Verbena officinalis L. Berbena. Verbena. Verveine officinale. Vervain. RUD(t). 1220-2000 m. c. VI-IX.

Viburnaceae

Sambucus ebulus L. Èvol, saïc pudent. Saúco menor. Hièble. Dwarf elder. 1200-1680 m. RUD. cc. V-VII.

Sambucus nigra L. subsp. *nigra* Sabuc, saïc. Saúco. Sureau noir. Common elder. BOSC. 1200-1600 m. ccc. V-VI.

Sambucus racemosa L. Sabuc, saïc racemós. Saúco de montaña. Sureau de montagne. Red elder. BOSC(h). 1300-2000 m. V-VI.

Viburnum lantana L. Cartellatge, tortellatge. Lantana. Lantane,. Wayfaring tree. BOSC(s). 1200-1660 m. c. V-VII.

Violaceae

Viola alba Besser subsp. *denhardtii* (Ten.) W. Becker Viola/Viola boscana. Violeta. Violette blanche. -. BOSC(s)/HERB(v). 1240-1550 m. c. IV.

Viola arvensis Murray [*V. tricolor* subsp. *arvensis* (Murray) Gaudin] Pensament de camp. Pensamiento. Pensée des champs. Heartsease. ARV/RUD. 1200-2450 m. c. IV-V.

Viola biflora L. subsp. *biflora* Viola groga. -. Violette jaune. -. HERB(m)/MAT(n). 1820-2400 m. c. VI-VII.

Viola canina L. [*V. canina* subsp. *montana* (L.) Hartm.; *V. canina* subsp. *silvensis* (Font Quer) O. Bolòs & Vigo] Viola/Viola canina. Violeta de robledal. Violette des chiens . -. PRAT/MAT(ac). 1360-2020 m. c. V-VI.

Viola diversifolia (Ging.) W. Becker [*V. cenisia* L. subsp. *lapeyrouseana* Rouy & Foucaud] Pensament alpí. -. Pensée de Lapeyrouse. -. ROC(t). 2100-2760 m. r. VII-VIII.

Viola hirta L. Viola/Viola hirta. -. Violette hérissée. -. PRAT(s). 1260-1540 m. r. IV-V. MED

Viola mirabilis L. Viola de fulla gran. -. Violette admirable. -. BOSC(h). rrr. 1380 m. IV.

Viola palustris L. subsp. *palustris* Viola/Viola palustre. Violeta palustre. Violette des marais. -. AQUA(m,f). 1700-1880 m. rr. IV-V.

Viola pyrenaica DC. PRAT. 1300-1600 m. rrr. IV-V.

Viola reichenbachiana Jord. [*V. sylvestris* Lam., nom. illeg.] Viola/Viola silvestre. Violeta elevada. -. -. 1260-2100 m. cc. IV-VI.

Viola riviniana Rchb. [*V. sylvestris* Lam. subsp. *riviniana* (Rchb.) Tourlet] Viola/Viola silvestre. -. Violette de rivinus. -. 130-2120 m. cc. V-VI.

Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. *rupestris* Viola/Viola rupestre. Violeta de roca. -. -. PRAT(s). 1280-2020 m. r. V-VI.

Viola tricolor L. subsp. *subalpina* Gaudin Pensament subalpí. Pensamiento. Pensée subalpine. -. RUD/PRAT/MAT. 1460-2460 m. cc. V-VII.

MONOCOTILEDÒNIES

Amaryllidaceae

Allium oleraceum L. All de serp. Ajo de cigüeña. Ail des jardins. Fied garlic. PRAT/ROC(m) (s). 1220-1620 m. rr. VII-VIII.

Allium schoenoprasum L. All junciforme. Cebollino. Ciboulette. Chives. AQUA(f,m). 1600-2250 m.VI-VIII. c.

Allium senescens L. subsp. *montanum* (F.W. Schmidt) Holub [*A. lusitanicum* Lam.; *A. fallax* Schult. & Schult.f.; *Allium fallax* Don.] -. -. Ail. -. PRAT(r). 1560-1880 m. r. VII-IX.

Allium sphaerocephalon L. All vermell. Ajo de cabeza redonda. Ail à tête ronde. Round-headed leek. PRAT(s)/ROC. 1260-1980 m. r. VII-VIII.

Allium ursinum L. subsp. *ursinum* All de bruixa. Ajo de oso. Ail des ours. Ransoms. BOSC(h,br). 1320 m. rrr. VI.

Allium victorialis L. All victorial. Ajo victorial. Ail des cerfs. Pyrenean leek. HERB(m). 1600-2200 m. c. VI-VIII.

Galanthus nivalis L. Llàgrimes de Sant Josep/Lliri de neu. Campanilla de nieve. Perce-neige. Snowdrop. BOSC(r)/HERB(m). 1200-1760 m. r. I-V.

Narcissus moschatus subsp. *moleroi* (Fern. Casas) Aedo [*N. moleroi* Fern. Casas] Narcís de muntanya. -. Jonquille de montagne. -. PRAT. 1430-2500 m. cc. V-VII.

Araceae

Lemna minor L. Llentia d'aigua. Lenteja de agua. Petite lentille-d'eau. Common duckweed. AQUA. 1220-1260 m. rr. VI.

Lemna minuta Kunth AQUA. 1480 m. rrr. AL/INV.

Asparagaceae

Anthericum liliago L. Lliri de Sant bru. Antérico. Anthéricum à fleurs de lis. -. 1240-2000 m. c. VI-VIII.

Aphyllanthes monspeliensis L. Jonça. Junquillo. Aphyllanthe de Montpellier. Blue aphyllanthes. 1300 m. rrr. IV-VI.

Convallaria majalis L. Muguet. Muguet. Lily of the valley. HERB(m). 1620 m. rrr. VI. AM.

Dipcadi serotinum (L.) Medik. subsp. *serotinum* Marcet. Jacinto bastardo. Dipcadi. Dipcadi. PRAT(a)/ROC. 1280-1770 m. rr. VI-VII.

Leopoldia comosa (L.) Parl. [*Muscari comosum* (L.) Mill.] Calabruixa grossa. Ajipuerto. Muscari à toupet. Feather Hyacinth. RUD(t). 1240 m. rrr. VI.

Loncomelos pyrenaicum (L.) J. Holub subsp. *pyrenaicum* [*Ornithogalum pyrenaicum* L. subsp. *pyrenaicum*] Ornitògal pirinenc. -. Ornithogale des Pyrénées -. PRAT(r)/ROC8r. 1780-1900 m. rrr. VII.

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt Maiàntem. -. Maianthème à deux feuilles. -. BOSC/HERB(c). 1500 m. rrr. VI-VII. PROT. AME/EN.

Muscat latifolium J. Kirk. -. -. -. PRAT(t). 1240 m. rrr. IV. AL/AC.

Muscat neglectum Ten. Calabruixa petita. Penitentes. Muscari à grappe. Grape hyacinth. PRAT/RUD. 1200-1780 m. r. V-VI.

- Ornithogalum divergens*** Boreau Llet d'ocell. Leche de gallina. Ornithogale en ombelle. Star of bethlehem. RUD/PRAT. 1200 m. rrr. VI-VII.
- Paradisea liliastrum*** (L.) Bertol. Lliri blanc/Paradísia. -. Lis des Alpes. -. PRAT(s,h). 1220-2080 m. r. VI-VIII.
- Polygonatum multiflorum*** (L.) All. Segell de ram. -. Sceau-de-Salomon multiflore. Common Solomon's seal. 1380 m. rrr. VI.
- Polygonatum odoratum*** (Mill.) Druce Segell de Salomó. Lágrimas de David. Sceau-de-Salomon odorant. Scented Solomon's seal. BOSC/HERB(m). 1240-1980 m. r. VI-VII.
- Polygonatum verticillatum*** (L.) All. Segell verticil·lat. Sello de Salomón verticulado. Sceau-de-Salomon verticillé. Whorled Solomon's seal. BOSC(h)/HERB(cl). 1430-2100 m. c. VI-VII.
- Puschkinia scilloides*** Adams . -. Escila de rayas. -. -. RUD. 1320 m. rrr. VI. AL/AC. M. Marcer (*pers. comm.* 2020).
- Scilla lilio-hyacinthus*** L. Joliu. -. Scille lis-jacinthe. -. BOSC(br). 1340 m. rrr. VI.
- Streptopus amplexifolius*** (L.) DC. Streptopus. -. Sceau-de-Salomon noueux. -. HERB(m). 1960-2080 m. rrr.

Asphodelaceae

- Asphodelus albus*** Mill. subsp. *subalpinus* Nyman [*A. albus* subsp. *delphinensis* (Gren. & Godr.) Z. Díaz & Valdés; *A. albus* auct., non Mill.]. Citat, probablement fora de l'àmbit, cal comprovació.
- Asphodelus macrocarpus*** Parl. subsp. *macrocarpus* [*A. albus* subsp. *villarsii* (Billot) I.B.K. Richardson & Smythies] Albó de muntanya. Asphodèle de villars. -. PRAT,MAT(s). 1500-2050 m. r.
- Hemerocallis fulva*** (L.) L. Assutzena rossa. Lirio de dia. Lis rouge. Orange day-lily. ROC(m)/PRAT(s). 1240 m. rrr. AL/AC.

Cyperaceae

- Carex appropinquata*** Schumach. Error.
- Carex atrata*** L. subsp. *atrata* Càrex negre. -. Laîche noirâtre. Black alpine sedge. PRAT/AQUA(c)/MAT(c)/HERB(m). 2040-2300 m. rr. VII.
- Carex capillaris*** L. -. -. -. PRAT(ca)/AQUA(m). 1820-2100 m. rrr. VII.
- Carex caryophyllea*** Latourr. Càrex vernal. -. Laîche de printemps. -. PRAT. 1240-2580 m. ccc. V-VII.
- Carex curvula*** All. subsp. *curvula* Càrex corbat. -. Laîche courbée. Alpine sedge. PRAT(h). 2200-2780 m. c. VII-VIII.
- subsp. *rosae* Gilomen -. -. Carex courbé à feuilles épaisses. -. PRAT. 2000-2670 m. rr. VII-VIII.
- Carex demissa*** Hornem. [*C. flava* subsp. *oedocarpa* (Andersson) O. Bolòs & Vigo]. rrr. AE.
- Carex digitata*** L. Càrex digitat. Cárice digitada. Laîche digitée. Finger sedge. BOSC(h). 1220-1600 m. r. V-VI.
- Carex dioica*** L. Error.
- Carex distans*** L. Càrex distant. Cárice distante menor. Laîche à épis distants. Distant sedge. AQUA(j)/PRAT(h). 1340 m-1780 m. rr. V-VI.
- Carex disticha*** Huds. -. -. Laîche distique. B rown sedge. AQUA(j,m). 1440-1880 m. rr. VII-VIII.
- Carex divulsa*** Stokes [*C. muricata* subsp. *divulsa* (Stokes) Celak] Càrex muricat. Cárice de espiga laxa. Laîche écartée. Grey sedge. RUD(t)/PRAT. 1280-1380 m. rr. VI.
- Carex echinata*** Murray Càrex estel-lat. Cárice estrellada. Laîche étoilée. Star sedge. AQUA(m,j,si). 1420-2220 m. r. VI-VII.
- Carex ericetorum*** Pollich -. -. Laîche des bruyères. Rare spring sedge. PRAT(h,ac). 1880-2600 m. cc. VI-VIII.
- Carex flacca*** Schreb. subsp. *flacca* Càrex glauc. -. Laîche glauque. Blue sedge. PRAT(h)/AQUA(j,cr). 1200-2000 m. ccc. V-VI.
- Carex flava*** L. [*C. flava* subsp. *alpina* (Kneuck.) O. Bolòs, Masalles & Vigo] Càrex groc. Cárice amarillenta. Laîche glauque. Yellow sedge. AQUA(m,j). 1800-2460 m. c. VI-VIII.
- Carex frigida*** All. Càrex frigid. -. Laîche des lieux froids. -. AQUA(m,f). 1550-2080 m. r. VI-VII.

- Carex hallerana*** Asso Càrex d'haller. Càrex hallerià. Cárice de monte. Laîche de Haller. -. PRAT/ROC(s,ca). 1480-1880 m. rr. V-VI.
- Carex hirta*** L. Càrex hirsut. Cárice pelosa. Laîche hérissée. Hairy sedge. AQUA(j)/RUD(t,h). 1380-1880 m. rr. VI-VII.
- Carex humilis*** Leyss. Càrex humil. -. Laiche basse. Dwarf Sedge. PRAT(s)/ROC(r). 1600-2000 m. rr. IV-V.
- Carex lepidocarpa*** Tausch [C. flava subsp. *lepidocarpa* (Tausch) Lange] -. Cárice amarillenta esférica. Laîche à beaux fruits. -. AQUA(m,j,ca)/PRAT(h). 1680-1900 m. rr. V-VI.
- Carex leporina*** L. [C. ovalis Gooden.] Càrex oval. Cárice ovalada. Laîche des lièvres. Oval sedge. PRAT(h)/AQUA(m,f). 1250-2230 m. c. V-VII.
- Carex mairei*** Coss. & Germ. [C. *mairii* Coss. et Germ.] -. Laiche de Maire. AQUA(j,m). rrr. 1300 m. VI.
- Carex montana*** L. -. -. -. PRAT. 1480-2010 m. rrr. VII.
- Carex myosuroides*** Vill. [Kobresia *myosuroides* (Vill.) Fiori] Elina. -. Cobrésia queue-de-souris. Bellardi's Bog-sedge. PRAT(r,ca). 1860-2780 m. r. VII-VIII.
- Carex nigra*** (L.) Reichard Càrex fosc. Cárice negra densa. Laîche brune. Black sedge. AQUA(m,f,ac). 1480-2400 m. c. VI-VII.
- Carex ornithopoda*** Willd. [C. *ornithopoda* subsp. *ornithopodoides* (Hausm.) Nyman] -. Carex pied-d'oiseau. Bird's-foot Sedge. PRAT(r,ca). 1420-2340 m. rr. VI-VII.
- Carex otrubae*** Podp. [C. *cuprina* auct., non (Heuff.) A. Kern.] -. -. -. AQUA(j,h). 1320 m. rrr. VI.
- Carex pairae*** F.W. Schultz [C. *muricata* subsp. *pairae* (F.W. Schultz) Celak.; C. *muricata* auct., non L.] Càrex muricat. -. -. RUD(t). 1380 m. rrr. VI.
- Carex pallescens*** L. -. Laîche pâle. Pale sedge. PRAT(h)/HERB(m). 1510-1880 m. rr. VII.
- Carex panicea*** L. -. Cárice negra laxa. Laîche bleuâtre. -. AQUA(j,m,ca). 1700-1900 m. r. VI-VII.
- Carex paniculata*** L. subsp. *paniculata* [C. *vaginata* auct. iber., non Tausch] Càrex paniculat. Cárice paniculada. Laîche paniculée. Greater tussock-sedge. AQUA(m,j,f,ca). 1400-1780 m. r. V-VII.
- Carex parviflora*** Host [C. *atra* subsp. *nigra* (Gaudin) Hartm.] -. Laîche à petites fleurs. -. AQUA/PRAT (ca). Estatge alpí, rr. 2250-2800 m. VII-VIII.
- Carex pyrenaica*** Wahlenb. Càrex pirinenc. -. Laîche des Pyrénées. Pyrenean sedge. AQUA(c,si). 2100-2500 m. rr. VII-VIII.
- Carex remota*** L. Càrex remot. Cárice remota. Laîche à épis espacés. Remote sedge. BOSC(br)/AQUA(j). 1220-1260 m. rr. VI.
- Carex rupestris*** All. -. -. -. ROC(ca) 2400 m. rrr. VII.
- Carex sylvatica*** Huds. subsp. *sylvatica* Càrex selvàtic. Cárice de bosque. Laiche des bois. Wood-sedge. BOSC(h). 1380-1500 m. rr. VI.
- Carex umbrosa*** Host subsp. *huetiana* (Boiss.) Sóo Càrex ombrós. Cárice umbrosa. Laîche de Huet. Shady sedge. AQUA(m)/PRAT(h). 1640- 2600 m. cc. VI-VIII.
- Carex umbrosa*** Host subsp. *umbrosa* Càrex ombrós. Cárice umbrosa. Laîche de Huet. Shady sedge. PRAT(h). 1550-1780 m. rrr. VI-VII.
- Cyperus eragrostis*** Lam. Serrana d'Amèrica. Juncia americana. Souchet robuste. Nutgrass. AQUA(j)/HERB(h)/RUD(h). 1220-1340 m. r. VIII. AL/INV.
- Cyperus flavescens*** L. [Pycreus *flavescens* (L.) Rchb.]. -. -. -. AQUA(j). 1260 m. rrr. VIII.
- Eleocharis palustris*** (L.) Roem. & Schult. subsp. *palustris* Jonquet. Junco palustre. Souchet des marais. Common spike-rush. AQUA(cr). 1680 m. rrr.
- Eleocharis quinqueflora*** (Hartmann) O. Schwarz AQUA(j,m). 2100 m. rrr. EA.
- Eriophorum angustifolium*** Honck. Cotonera angustifòlia. Algodonera de hoja estrecha. Linaigrette à feuilles étroites. Common cottongrass. AQUA(m). 1450-2000 m. rrr. VI.
- Isolepis setacea*** (L.) R. Br. [Scirpus *setaceus* L.] -. -. -. AQUA(j). 1525 m. rrr. VII.
- Isolepis cernua*** (Vahl) Roem. & Schult. [Scirpus *cernuus* Vahl] -. Isolépis penché. Low Bulrush. AQUA(j). 1220 m. rrr. VII.
- Scirpoides holoschoenus*** (L.) Soják [Scirpus *holoschoenus* L.; *Holoschoenus vulgaris* Link] Junc boval. Junco. Scirpe-jonc. Round-headed club-rush. AQUA(j). 1200-1550 m. rr. VII.

Trichophorum alpinum (L.) Pers. [*Eriophorum alpinum* L.]. Error.

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. [*Scirpus cespitosus* L.] Tricòfor. -. Scirpe cespiteux. Tufted bulrush. AQUA(m,j,ac). 2080-2250 m. rrr. VI.

Dioscoreaceae

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin [*Tamus communis* L.] Gatmaimó. Bronia negra. Herbe aux femmes battues. Black bryony. MAT(b)/BOSC(h). 1220-1480. rr. V.

Iridaceae

Crocus nudiflorus Sm. Safrà bord. Azafrán de montaña. Crocus d'automne. Leafless crocus. PRAT(h). 1500-2230 m. cc. IV-XI.

Crocus vernus (L.) Hill [*C. vernus* subsp. *albiflorus* (Schult.) Ces.] Safrà de muntanya. -. Crocus à fleurs blanches. Purple crocus. PRAT(h). 1400-2300 m. c. III-IV.

Iris germanica L. Lliri blau. -. -. -. ROC(m). 1300-1450 m. rrr. VI.

Xiphion latifolium Mill. [*Iris latifolia* (Mill.) Voss.] Lliri blau. Lirio de hoja ancha. Iris des Pyrénées. English iris. PRAT. rr. 1600-1900 m. VII-VIII.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Hoffm. Junc acutiflor. Junco de cáliz agudo. Junc à tépales aigus. Sharp-flowered rush. AQUA(j). 1320-1880 m. VII-VIII.

Juncus alpino-articulatus Chaix subsp. *alpino-articulatus* [*J. alpinus* Vill. subsp. *alpinus*] Junc alpí. Junco alpino. Junc alpin. Northern green rush. AQUA(m,j). 1600-2200 m. c. VII-VIII.

Juncus articulatus L. subsp. *articulatus* Junc articulat. Junco articulado. Junc articulé. Jointed rush. AQUA(j,m). 1220-2000 m. cc. VII-VIII.

Juncus balticus Willd. subsp. *pyrenaeus* (Jeanb. & Timb.-Lagr.) P. Fourn. [*J. pyrenaeus* Jeanb. & Timb.-Lagr.] Junc pirinenc. -. Junc des Pyrénées. -. AQUA(m). 2080-2200 m. rrr. VII-VIII. PROT. AME/NT.

Juncus bufonius L. Junc de galàpet. -. Junc des crapauds. Toad rush. AQUA(j). 1340 m-2000 m. rr. V.

Juncus bulbosus L. subsp. *bulbosus* -. -. -. AQUA(j)/HERB(m). 1920-2200 m. rrr. VII.

Juncus conglomeratus L. Junc conglomerat. Junco aglomerado. Junc aggloméré. Compact rush. AQUA(j)/PRAT(h). 1400-1900 m. c. VII-VIII.

Juncus effusus L. Junc d'estores. Junco de esteras. Junc diffus. Soft rush. AQUA(j). 1240-1970 m. ccc. VII-VIII.

Juncus inflexus L. subsp. *inflexus* Jonquina. Junco glauco. Junc glauque. Hard rush. AQUA(j)/RUD(t). 1200-1820 m. c. VI-VII.

Juncus tenuis Willd. Junc tènue. -. -. Slender rush. RUD(t). 1240-1780 m. r. VI-VII. AL/INV.

Juncus triglumis L. subsp. *triglumis* Junc tribracteat. -. Junc à trois glumes. Three-flowered rush. AQUA(m,j). 2020 m. rrr. VI. PROT.

Juncus ×diffusus Hoppe [*J. effusus* × *J. inflexus*] -. -. -. AQUA(j), 1700 m. rrr. Cita antiga.

Luzula campestris (L.) DC. Lúzula campestre. Lúzula de prado. Luzule des champs. Field wood-rush. PRAT/MAT(ac). ccc. 1240-2300 m. V-VII.

Luzula desvauxii Kunth [*L. glabrata* (Hoppe) Desv. subsp. *desvauxii* (Kunth) Buchenau] Lúzula glabra. -. Luzule de Desvaux. -. HERB(m)/AQUA(f). 1800-2500 m. c. VI-VII.

Luzula lutea (All.) DC. Lúzula groga. -. Luzule jaune. Yellow wood-rush. PRAT(ac). 2000-2700 m. cc. VI-VIII.

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. *multiflora* Lúzula multiflora. -. Luzule multiflore. Common Woodrush. PRAT. 1700 m. rrr.

Luzula nivea (L.) DC. Lúzula nivea. -. Luzule blanc de neige. Snowy wood-rush. BOSC/HERB(m) (ac). 1420-1940 m. cc. VI-VII.

- Luzula pediformis* (Chaix) DC. [*L. nutans* (Vill.) Duval-Jouve] Lúzula nutant. Lúzula colgante. Luzule penchée. -. PRAT(ac). 2000-2650 m. c. VI-VIII.
- Luzula spicata* (L.) DC. [*L. spicata* subsp. *monsignatica* P. Monts.] Lúzula d'espiga, Lúzula espigada. Lúzula espigada. Luzule d'Espagne. Spiked wood-rush. PRAT(ac). 1980-2680 m. cc. VI-VII.
- Luzula sylvatica* (Huds.) Gaudin subsp. *sylvatica* Lúzula selvàtica. -. Grande luzule. Greater wood-rush. BOSC(h)/HERB(m). 1480 m. rrr. VI.
- Oreojuncus trifidus* (L.) Záveská, Drábková & Kirschner [*Juncus trifidus* L.] Herba prima de Rojà/Jonc trífido. -. Jonc trifide. Highland rush/Three-leaved rush. PRAT(ac). 1700-2700 m. ccc. VII-VIII.

Juncaginaceae

- Triglochin palustris* L. -. Cinta de agua. Troscart des marais. Marsh arrowgrasses. AQUA(m). 1820 m. rrr. VI.

Liliaceae

- Erythronium dens-canis* L. Dent de ca, Diente de perro. Dent-de-chien. -. PRAT- 1680-1900 m. rrr. IV.
- Fritillaria pyrenaica* L. Fritil-lària. -. Fritillaire des pyrénées. -. 1800 m. rrr. VI.
- Gagea liotardii* (Sternb.) Schult. & Schult. fil. [*G. fragifera* (Vill.) E. Bayer & G. López; *G. fistulosa* Duby] -. - Gagée de Liotard. -. Citacions antigues. rrr.
- Gagea lutea* (L.) Ker Gawl. Gàgea groga. -. Gagée jaune. -. 1760 m. rrr. VI.
- Lilium candidum* L. Lliri de Sant Antoni. Lirio de Sant Antonio. Lis blanc. Madonna lily. RUD/ROC(m). 1240-1300 m. rrr. AL/AC.
- Gagea liotardii* (Sternb.) Schult. & Schult. fil. [*G. fragifera* (Vill.) E. Bayer & G. López] -. - Gagée de Liotard . -. PRAT/RUD. 2200 m. rrr. VI.
- Lilium martagon* L. Consolta vermella/Marcòlic. Martagón. Lis martagon. Martagon lily. BOSC(h)/HERB(cl,v). 1200-2400 m. cc. VII-VIII.
- Lilium pyrenaicum* Gouan Consolta/Consolta groga/Marcòlic groc. -. Lis des Pyrénées. Pyrenean lily. PRAT/HERB(m)/MAT(bg). 1500-2140 m. r. VI-VII.

Melanthiaceae

- Paris quadrifolia* L. Raïm de guineu. Uva de zorra. Parisette à quatre feuilles. Herb Paris. BOSC(h,per). 1700-1820 m. rr. V-VI.
- Veratrum album* L. Baladre. -. Vératre blanc. -. BOSC(h)/HERB(m,c)/RUD(h). 1200-2300 m. c. VII-VIII.

Orchidaceae

- Anacamptis coriophora* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase [*Orchis coriophora* L. subsp. *fragrans* (Pollini) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase; *O. coriophora* L. subsp. *martinii* (Timb.-Lagr.) Jacquet & Scappat] Abellera olorosa/Orquis olorós/Orquídia de les xinxes. .. - Orchis punaise. Bug Orchis.. PRAT. 1375 m. rrr.VI-VII.
- Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce Curraia groc. -. -. -. PRAT. 1680 m. rrr. VI.
- Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch PRAT. 1230 m. rrr.
- Coeloglossum viride* (L.) Hartm. Orquis verde. -. Orchis vert. -. PRAT(h). 1500-2000 m. r. VI-VII.
- Corallorrhiza trifida* Châtel. Orquídia d'arrel de corall. -. Racine-de-corail. - BOSC(h). 1680-1820 m. rrr. VI PROT. AME/EN.
- Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó subsp. *fuchsii* [*Orchis maculata* L. subsp. *meyeri* (Rchb.) O. Bolòs & Vigo] Orquis de Meyer. Orquis manchada comú. -. -. PRAT/HERB(v).1240-1780 m. ccc. VI-VIII.

- Dactylorhiza maculata** (L.) Soó subsp. *maculata* [*Orchis maculata* L.] Orquis maculat. Orquis manchada de turbera. -.- AQUA(m)/PRAT(h). 1420-2200 m. c. VI-VIII.
- Dactylorhiza majalis** (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. subsp. *majalis* [*Orchis majalis* Rchb.] Orquis magenc. - Dactylorhize de mai. - AQUA(m,j)/PRAT(h). 1440-2100 m. cc. VI-VIII.
- Dactylorhiza sambucina** (L.) Soó [*Orchis sambucina* L.; *O. latifolia* L.] Orquis sambucí. -.- PRAT. 1460-2100 m. r. V-VII.
- Orchis mascula** L. Orquídia mascle. - Orchis mâle. - PRAT. 1300-2000 m. c. V-VI.
- Epipactis atrorubens** (Hoffm.) Schultes subsp. *atrorubens* Epipactis vermella. Epipáctide comú. Épipactis rouge sombre. - ROC(t). 1200-1800 m. r. VI-VIII.
- Epipactis bugacensis** Robatsch [*E. rhodanensis* Gévaudan & Robatsch] Epipactis del Roine. - Epipáctide verde. - BOSC(br)/AQUA(m). 1200-1580 m. rr. VI-VIII.
- Epipactis distans** Arv.-Touv. Epipactis de fulles distants. Epipáctide distante. -.- HERB(v,c). 1580-1700 m. VII.
- Epipactis helleborine** (L.) Crantz Epipactis de fulla gran. Epipáctide mayor. Épipactis à larges feuilles. - BOSC/HERB(v,c)/PRAT. 1240-1750 m. c. VII-VIII.
- Epipactis kleinii** M.B. Crespo, M.R. Lowe & Piera Epipactis de Klein. Epipáctide menor. Épipactis à petites fleurs. - HERB(v,c). 1340 m. rrr. VII-VIII.
- Epipactis muelleri** Godfery [*E. helleborine* subsp. *muelleri* (Godfery) O. Bolòs, Masalles & Vigo] Epipactis de Müller. -.-. PRAT. 1380 m. rrr. VII.
- Epipactis phyllanthes** G.E. Sm. [*E. fageticola* (C.E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers] - Epipáctide de hayedo. -.- BOSC(h). 1200-1300 m. rrr. VII-VIII.
- Goodyera repens** (L.) R. Br. Godiera. Gudiera. Goodyère rampante. - HERB(v)/BOSC(p). 1220-1260 m. rrr. VII.
- Gymnadenia conopsea** (L.) R. Br. Caputxina olorosa. - Gymnadénie moucheron. - PRAT. 1230-2100 m. cc. VI-VIII..
- Neotinea ustulata** (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase [*Orchis ustulata* L.] Orquis socarrat. Orquis tostada. Orchis brûlé. - PRAT. 1450-2000 m. c. VI-VII.
- Neottia cordata** (L.) Rich. [*Listera cordata* (L.) R. Br.] Lístera cordifòlia. - Listère à feuilles cordées. - BOSC(p)/MAT(n). 1600 m. rrr. VI-VII.
- Neottia nidus-avis** (L.) Rich. Magraneta borda.-. Néottie nid-d'oiseau. - BOSC(h). 1240-1800 m. c.
- Neottia ovata** (L.) Bluff & Fingerh. [*Listera ovata* (L.) R. Br.] Lístera ovada. Hierba de dos hojas. Grande listère. Common twayblade. HERB(v)/BOSC/PRAT(h). 1340-1820 m. c. VI-VII.
- Nigritella austriaca** (Teppner & E. Klein) P. Delforge subsp. *iberica* (Teppner & E. Klein) L. Sáez [*Gymnadenia austriaca* (Teppner & E. Klein) P. Delforge subsp. *iberica* (Teppner & E. Klein) L. Sáez & P. Aymerich] Nigritel·la d'Àustria. -.-. PRAT(h). 1440-2040 m. c. VII-VIII.
- Nigritella gabasiana** Teppner & Klein [*Gymnadenia gabasiana* (Teppner & E. Klein) Teppner & E. Klein; *N. nigra* (L.) Rchb. subsp. *gabasiana* (Teppner & E. Klein) O. Bolòs, Masalles & Vigo] Nigritel·la de Gabas. Nigritela. -.- PRAT(h). 1450-2000 m. c. VII-VIII.
- Orchis mascula** L. Orquis mascle. -.-. PRAT. 1680 m. rrr. VI.
- Platanthera bifolia** (L.) Rich. Platantera de dues fulles. -.-. PRAT/HERB(c,v). 1240-1900 m. c. VI-VII
- Platanthera chlorantha** (Custer) Rchb. Platantera de muntanya. -.-. BOSC/PRAT/HERB(c,v). 1400-2100 m. c. V-VIII.
- Pseudorchis albida** (L.) Á. Löve & D. Löve subsp. *albida* Orquis blanc. -.-. PRAT/HERB(c). 1960-2100 m. rrr. VII-VIII.

Poaceae

- Achnatherum calamagrostis* (L.) P. Beauv. [*Stipa calamagrostis* (L.) Wahlenb.] Acnàter. -. Calamagrostide argentée. -. ROC(t). 1280-1480 m. rr. VI-VII.
- Agropyron cristatum* (L.) Gaertn. var. *pectiniforme* (Roem. & Schult.) H.L. Yang [*Agropyron cristatum* (L.) Gaertn. subsp. *pectinatum* (M. Bieb.) Tzvelev] Agropir pectinat. -. Chiendent pectiné. -. RUD(t). 1240 m. rrr. VI. AL/SUB.
- Agrostis canina* L. subsp. *canina* Agrostis canina. Agróstide de montaña. Agrostide canine. -. AQUA(m,f,si). 1800-2200 m. rr. VII-VIII.
- Agrostis capillaris* L. subsp. *capillaris* [*A. tenuis* Sibth.] Agrostis tènue. Agróstide tenue. Agrostide commune. Common bent. PRAT/MAT(ac). 1200-2000 m. ccc. VII-VIII.
- Agrostis rupestris* All. [*A. rupestris* subsp. *pyrenaica* (Pourr.) Dostal] Agrostis rupestre. -. -. -. AQUA(m,f,si). 1940-2770 m. cc. VI-VIII.
- Agrostis schraderiana* Bech. [*A. agrostiflora* (Beck) Rauschert; *Calamagrostis agrostiflora* G. Beck] -. -. -. -. HERB(m). 1680-1980 m. rr. VII-VIII.
- Agrostis stolonifera* L. [*A. alba* auct., non L.] Agrostis estolonífera. Agróstide común. Agrostide blanche. Creeping bentgrass. AQUA(cr)/RUD(t,h). 1220- 2000 m. c. VII-VIII.
- Aira caryophyllea* L. Nebulosa. -. Canche caryophyllée. -. PRAT(a,ac). 1410 m. rrr. VI.
- Alpagrostis alpina* (Scop.) P.M. Peterson, Romasch., Soreng & Sylvester [*Agrostis alpina* Scop.] -. Agróstide alpina. -. -. PRAT(ca). 1920-2500 m. rr. VII-VIII.
- Alpagrostis schleicheri* (Jord. & Verl.) P.M. Peterson, Romasch., Soreng & Sylvester [*Agrostis schleicheri* Jord. & Verl.; *A. alpina* subsp. *sleicheri* (Jord. & Verl.) Nyman] -. Agróstide jurásica. -. -. ROC(r,ca). 1700-2120 m. rr. VII-VIII.
- Anisantha madritensis* (L.) Nevski [*Bromus madritensis* L.] Bromus madrileny. -. Brome de Madrid. Compact brome. RUD(t). 1250 m. rrr. VI.
- Anisantha sterilis* (L.) Nevski [*Bromus sterilis* L.] Margall llarg. Bromo gigante. Brome stérile. -. RUD(t). 1200- 2000 m. cc. VI-VII.
- Anisantha tectorum* (L.) Nevski [*Bromus tectorum* L.] RUD(t). 1350 m. rrr. V-VII.
- Anthoxanthum odoratum* L. Gram d'olor. Grama de olor. Flouve odorante. Sweet vernal grass. PRAT(ac). 1200-2100 m. cc.
- Arrhenatherum elatius* (L.) J. Presl & C. Presl subsp. *elatius* Fromental. Avena descollada. Fromental élevé. Tall oatgrass. PRAT/HERB(v,r) (h). 1200-1820 m. ccc. VI-VII.
- Avena barbata* Link subsp. *barbata* Civada borda. Avena morisca. Avoine barbue. Slender wild oat. ARV/RUD. 1240 m. rrr. VI.
- Avenella flexuosa* (L.) Drejer [*Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.] Pèl de boc, Descàmpsia flexuosa. -. Canche flexueuse. -. BOSC/MAT/PRAT (ac). 1260-2400 m. cc. VI-VII.
- Avenula pubescens* (Huds.) Dumort. subsp. *pubescens* [*Avena pubescens* Hudson; *Helictotrichon pubescens* (Hudson) Pilger] Avenula pubescent. Avénula pelosa. -. -. PRAT(h). 1230-1980 m. c. VI-VII.
- Bellardiochloa variegata* (Lam.) Kerguélen [*B. violacea* (Bellardi) Chiov.; *Poa violacea* Bellardi] Bel-lardiocloa. -. Pâturin violacé. -. PRAT(ac). 1740-2700 m. cc. VII-VIII.
- Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng [*Dichanthium ischaemum* (L.) Roberty; *Andropogon ischaemum* L.] Albellatge fasciculat. -. Digitaire glabre. Wavy hair-grass. PRAT(s). 1200-1490 m. c. VII-IX.
- Brachypodium distachyon* (L.) P. Beauv. Fenàs anual. -. Brachypode à deux épis. -. PRAT(r). 1240 m. rrr. VI.
- Brachypodium phoenicoides* (L.) Roem. et Schultes Fenàs de marge. Lastón. Brachypode de Phénicie. False brome. -. PRAT/HERB(s). 1220-1720 m. cc. VI-VIII.
- Brachypodium sylvaticum* (Hudson) P Beauv. subsp. *sylvaticum* Fenàs de bosc. Lastón de bosque. Brachypode des bois, Brachypode des forêts. Slender false brome. BOSC(h). 1200-1680 m. ccc. VI-VIII.
- Briza media* L. Belluguets/Bellugadís (mitjà). Tembladera mediana. Brize moyenne. Quaking grass. PRAT(h). 1200-2200 m. cc.
- Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr. subsp. *erecta* [*Bromus erectus* Huds. subsp. *erectus*] Bromus erecte. Bromo erecto. Brome des prés. Erect brome. PRAT. 1200-1780 m. cc. VI-VII.

- Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub subsp. *inermis* [*Bromus inermis* Leyss. subsp. *inermis*] Bromus inerme. -. Brome inerme. -. RUD. 1240 m. rrr. VII. AL/INV.
- Bromopsis ramosa* (Huds.) Holub [*Bromus ramosus* Huds.] Bromus ramós. Bromo laxo. Brome en grappe. Hairy brome. BOSC/HERB(c,v). 1240-1450 m. rr. VII.
- Bromus commutatus* Schrad. Bromus pratense. -. Brome variable. Meadow Brome. PRAT/HERB(r). 1280 m. rrr. VI.
- Bromus hordeaceus* L. [*B. mollis* L.] subsp. *hordeaceus* Bromus hordeaci. Bromo suave menor. Brome mou. Soft brome. PRAT(h)/RUD. 1220-1700 m. c. VI-VII.
- Bromus racemosus* L. subsp. *racemosus* -. Brome en grappe. Smooth brome. PRAT(h). 1240-1260 m. rr. VI.
- Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth -. Calamagróstide arundinácea. Calamagrostide à feuilles de roseau. -. HERB(m)/BOSC (ac,h). 1320-2230 m. r. VII-VIII.
- Catapodium rigidum* (L.) F.T. Hubbard subsp. *rigidum* [*Desmazeria rigida* (L.) Tutin subsp. *rigida*] Escleropoa. Gramilla de puño. Pâturin rigide. Ferngrass. PRAT(s,r)/RUD(t). 1220-1560 m. r. V-VII.
- Ceratochloa cathartica* (Vahl) Herter [*Bromus catharticus* Vahl] Bromus catàrtic. -. Brome cathartique. Grazing brome. RUD(t). 1220-1450 m. c. VI-VIII. AL/INV.
- Cynodon dactylon* (L.) Pers. Gram. Grama. Chiendent pied-de-poule. Bermuda grass. RUD(t). 1200-1450 m. c. VII-IX.
- Cynosurus cristatus* L. -. Cola de perro fina. Crételle/Crételle des prés/Crételle à crêtes. Crested dog's-tail. PRAT(h,t). 1220-1920 m. ccc. VI-VII.
- Cynosurus echinatus* L. Cinosur equinat. Cola de perro común. Crételle épineuse. -. RUD(t)/PRAT(a,s). 1240-1500 m. r. V-VII.
- Dactylis glomerata* L. Dàctil. Dáctilo. Dactyle/Dactyle aggloméré/Dactyle pelotonné. Cock's-foot. PRAT/HERB(v,r). 1200-2010 m. ccc. VI-IX.
- Danthonia decumbens* (L.) DC [*Siegingia decumbens* (L.) Bernh.] Dantònia. Dantonía. Danthonie retombante. Heath grass. PRAT/MAT(ac). 1240-1680 m. c. VI-VII.
- Deschampsia cespitosa* subsp. *cespitosa* [*D. caespitosa* subsp. *hispanica* Vivant; *D. media* subsp. *hispanica* (Vivant) O. Bolos, Masalles & Vigo] -. Canche moyenne. Tufted hair grass. AQUA(f,m,j)/PRAT(h). 1370-2120 m. r. VII-VIII.
- Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. [*Panicum sanguinale* L.] Forcadella. Digitaria. Digitaire commune. Crabgrass. RUD/ARV. 1220-1560 m. r. VII-IX. AL/ESP.
- Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv. Pota de gall. Pata de gallo. Panic des marais. Barnyard millet. ARV/RUD. 1240 m. rrr. VII. AL/ESP.
- Eleusine indica* (L.) Gaertn. -. -. -. RUD(t). 1230 m. rrr. X.
- Elymus caninus* (L.) L. [*Agropyron caninum* (L.) P. Beauv.] Agropir caní. -. Chiendent des chiens. Bearded wheatgrass. HERB(c). 1300-1600 m. r. VI-VII.
- Elymus repens* (L.) Gould subsp. *repens* [*Agropyrum repens* (L.) P. Beauv.] Xarpolla. Agropiro común. Chiendent rampant. Couch grass. RUD(t)/HERB(h). 1240-1320 m. r. VII-VIII.
- Eragrostis barrelieri* Daveau Eragrostis. -. Éragrostide de Barrelier. Love-grass. RUD(t). 1250 m. rrr. VI.
- Eragrostis minor* Host. Eragrostis menuda. -. Éragrostide faux pâturin. Small love-grass. RUD(t). 1240-1450 m. rr. VIII.
- Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv. subsp. *pilosa* Error.
- Festuca airoides* Lam. [*F. supina* Schur] Festuca supina. -. Fétuque fausse canche. -. PRAT. 1920-2900 m. cc. VII-VIII.
- Festuca airoides* subsp. *molinieri* (Litard) O. Bolos, Vigo, Masales, & Ninot [*F. ovina* L. subsp. *molinieri* (Litard.) O. Bolos & Vigo; *F. ovina* var. *molinieri* Litardiere; *F. niphobia* (St.-Yves) Kerguelen] Citada a prop, DUBT.LOC.
- Festuca alpina* Suter [*F. ovina* subsp. *alpina* (Suter) Hack.; *F. alpina* subsp. *riverae* Chas, Kerguélen & Plonka] -. -. -. ROC(ca). 2200-2350 m. rrr. VII.
- Festuca aragonensis* (Willk.) Fuente & Ortúnez [*F. indigesta* subsp. *aragonensis* (Willk.)Kerguelen; *F. ovina* var. *aragonensis* (Willk.) O. Bolos & Vigo, *F. indigesta* var. *aragonensis* Willk.] PRAT(r). PRAT(r). 2050 m. r. VIII.
- Festuca borderei* (Hack.) Hack. [*F. ovina* subsp. *borderei* Hack.] -. -. -. PRAT(r). 2800 m. rrr. VII.
- Festuca eskia* Ramond ex DC. in Lam. et DC. Gesp. Festuca pirrenaica. Fétuque eskia -. PRAT(s). 1700-2700 m. ccc. VII-VIII.

- Festuca gautieri* (Hackel) K. Richter [*F. scoparia* A. Kerner ex Nyman] Ussona. Festuca erizo. Fétueque de Gautier. -. PRAT(s). 1200-2700 m. ccc. VII-VIII.
- Festuca glacialis* (Miégev. ex Hack.) K. Richter Festuca glacial. -. Fétueque des glaciers. -. ROC(t). 2000-2800 m. c. VIII.
- Festuca halleri* All. [*F. ovina* subsp. *halleri* (All.) Bonnier & Layens]. Citada a prop, comprovar.
- Festuca heterophylla* Lam. subsp. *heterophylla* [*F. rubra* subsp. *heterophylla* (Lam.) Hack.] Festuca heterofil·la. Festuca atlàntica. Fétueque à feuilles variables. -. BOSC(h). 1460-1600 m. rr. VII.
- Festuca lambinonii* Kerguelen [*F. arvernensis* subsp. *costei* auct., non *F. costei* (St.-Yves) Markgr.-Dann; *F. hervieri* Patzke var. *costei* (St. Yves) Auquier] Festuca arvènica. -. Fétueque de coste. -. PRAT(s,r)/ROC(r,t). 1450-2000 m. c. VII.
- Festuca liviensis* (Verg.) Markgr.-Dann. [*F. ovina* subsp. *liviensis* (Verg.) O. Bolos, Masalles & Vigo] Festuca duriúscula. -. -. -. PRAT(s). 1230-2200 m. cc. VI-VII.
- Festuca marginata* (Hack.) K. Richter subsp. *marginata* [*F. timbalii* (Hack.) Kerguelen; *F. hervieri* (St.-Yves) Patzke] -. -. -. PRAT/MAT (s)/ROC. 1420-2100 m. c. VII-VIII.
- Festuca nevadensis* (Hack.) Markgr.-Dammenb. (*F. rubra* subsp. *nevadensis* Hackel) ERROR.
- Festuca nigrescens* Lam. [*F. rubra* subsp. *commutata* (Gaudin) Markgr.-Dann.; *F. microphylla* (St.-Yves) Patzke] Festuca rogenca. Festuca oscura. Fétueque noirâtre. -. PRAT(h). 1220-2200 m. cc. VI-VII.
- Festuca rivularis* Boiss. [*F. rubra* subsp. *rivularis* (Boiss.) O. Bolos, Masalles & Vigo] -. Festuca granadina. -. -. PRAT(h)/AQUA(m,f). 1600-1980 m. rr. VIII.
- Festuca rubra* L. subsp. *rubra*. Pèl de guilla. Festuca rojiza. Fétueque rouge. PRAT(h)/AIGUA(m). 1400-2100 m. rr. VII.
- Festuca rubra* subsp. *juncea* (Hack.) K. Richt. -. -. -. -. PRAT(r). 1400-2420 m. rr. VII-VIII.
- Festuca yvesii* Sen. et Pau [*F. durissima* (Hack.) Kerg., *F. duriuscula* L. subsp. *durissima* (Hack.) K. Richter, *F. ovina* L. var. *duriuscula* (L.) Koch subvar. *durissima* Hack., *F. ovina* L. subsp. *indigesta* (Boiss.) Hack. var. *durissima* (Hack.) St. Yves] Festuca duríssima. -. Fétueque très dure. -. PRAT(s,c). 1700-2700 m. c. VII.
- Festuca varia* Haenke Citada a prop.
- Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv. Citada a prop.
- Glyceria notata* Chevall. [*G. plicata* (Fr.) Fr.; *G. fluitans* subsp. *plicata* (Fr.) St.-Lag.] Glicèria. -. Glycérie plissée. Plicate sweet-grass. AQUA(cr). 1220-1810 m. c. VI-VII.
- Helictochloa pratensis* subsp. *amethystea* (Braun-Blanq.) Romero Zarco [*Avena pratensis* subsp. *amethystea* Braun-Blanq.; *Helictochloa pratensis* subsp. *requienii* (Mutel) H. Scholz; *Avenula pratensis* subsp. *requienii* (Mutel) Romero Zarco] Citada a prop.
- Helictochloa pratensis* subsp. *iberica* (St.-Yves) Romero Zarco [*Avenula pratensis* subsp. *iberica* (St.-Yves) O. Bolos & Vigo; *A. mirandana* (Sennen) Holub] Avena. -. Avoine ibérique. -. PRAT(s). 1200-1700 m. r. VI-VII.
- Helictochloa pratensis* (L.) Romero Zarco subsp. *pratensis* [*Avenula pratensis* (L.) Dumort. subsp. *pratensis*; *Avenula pratensis* (L.) Dumort.; *Avenochloa pratensis* (L.) Holub] Avènula pratense. Avénula de prado. Avoine des prés. -. 1240-2100 m. c. VII-VIII.
- Helictochloa versicolor* (Vill.) Romero Zarco subsp. *versicolor* [*Avenula versicolor* (Vill.) M. Lainz subsp. *versicolor*] Avènula bigarrada. -. Avoine bigarrée. -. PRAT/MAT(c) (ac). 2100-2680 m. r. VII-VIII.
- Helictotrichon sedenense* (DC.) Holub subsp. *sedenense* [*Avena sedenensis* Clarion ex DC., *A. montana* Vill.] Avena montana. -. Avoine des montagnes. PRAT(s,r)/ROC(t). 1780-2720 m. cc. V-VII.
- Holcus lanatus* L. Herba molla. Heno veloso. Houlque laineuse/Houque laineuse. Common velvet grass. PRAT(h)/HERB(h)/AQUA(m,j). 1200-2000 m. ccc. VI-VII.
- Holcus mollis* L. Holcus fi. Heno blanco. Houlque molle. Creeping Soft-grass. BOSC/HERB(v) (ac). 1250-1560 m. rr. VI-VII.
- Hordelymus europaeus* (L.) Harz Citat amb dubtes.
- Hordeum murinum* L. subsp. *murinum* Ordi de Sant Joan. Cebada de ratón. Orge des rats. False barley. RUD(t). 1200-1680 m. cc. VI-VIII.
- K. macrantha* (Ledeb.) Schult. Les cites corresponen a *K. pyramidata* (Quintanar & Castroviejo, 2013).

- Koeleria pyramidata** (Lam.) P. Beauv. subsp. *pyramidata* [incl. *K. macrantha* (Ledeb.) Schult.]
-. Koeleria ramosa. Koelerie pyramidale. Prairie June grass. PRAT. 1260-2340 m. cc. VI-VIII.
- Koeleria splendens* C. Presl Les cites corresponen a *K. pyramidata* (Quintanar & Castroviejo, 2013).
- Koeleria vallesiana** (Honck.) Gaudin Gram de gos. Koeleria comú. Koelerie du Valais. -. PRAT(r,s)/ROC(r). 1200-2500 m. ccc.
- Lolium multiflorum** Lam. [*L. multiflorum* subsp. *italicum* Schinz & R. Keller] Raigràs italià. -. -. -. ARV/RUD(t). 1240-1280 m. rr. VI
- Lolium perenne** L. Margall. Ballico. Ivraie vivace. Perennial ryegrass. RUD(t). 1200-2000 m. ccc. VI-VII.
- Lolium rigidum** Gaudin subsp. *rigidum* Margall dret. Ballico. Ivraie raide. Annual ryegrass. ARV/RUD(t). 1250 m. rr. VI.
- Lolium temulentum** L. [*L. temulentum* subsp. *arvense* (With.) Tzvelev] ARV. 1460 m. rrr. VII.
- Melica ciliata** L. subsp. *ciliata* Serrell de muntanya. Mélica pelosa. Mélique ciliée. -. PRAT(s,r)/ROC(t). 1200-1500 m. rr. VI-VII.
- Melica uniflora** Retz Mèlica uniflora. Mélica de bosque. Mélique à une fleur. Wood melick. BOSC(h). 1320-1510 m. rr. VI-VII.
- Micropyrum tenellum** (L.) Link -. -. Petit nard délicat. -. PRAT/ROC(t,r,ac). 1900 m. rrr. VI.
- Molinia caerulea** (L.) Moench Alba roja. Molinia. Molinie bleue. Purple moor-grass. PRAT/AQUA(m,j,h). 1200-2000 m. ccc. VI-IX.
- Nardus stricta** L. Pèl caní. Cervuno. Nard raide. Matgrass. PRAT/AQUA(f,m). 1550-2640 m. cc. VI-VII.
- Oreochloa elegans** Sennen [*O. blanca* Deyl; *O. disticha* subsp. *blanca* (Deyl) P. Kupfer] Oreòcloa. -. Oréochloa élégant. -. PRAT(r)/ROC. 2480-2780 m. rr. VII-VIII.
- Panicum miliaceum** L. subsp. *miliaceum* Mill. Mijo. Mil d'inde. Common Millet. ARV/RUD. 1250-1290 m- rrr. VIII. AL/SUB.
- Patzkea paniculata** (L.) G.H. Loos
subsp. *paniculata* [*Festuca paniculata* (L.J Schinz et Thell. suhsp. *paniculata*; *F. spadicea* L.] Sudorn.
Festuca paniculada. Fétuque paniculée. -. PRAT(s). 1600-2400 m. c. VI-VII.
subsp. *spadicea* (L.) G.H. Loos [*Festuca paniculata* subsp. *spadicea* (L.) Litard.; *F. consobrina* Timb.-Lagr., *F. paniculata* var. *fallax* (Loret et Barr.) Litard.] Sudorn. -. Fétuque châtain. PRAT(r,ca). 1475- 1975 m. rrr. VII.
- Phalaris arundinacea** L. Fàlaris. Garzota de arroyos. Baldingère faux roseau. Reed canary grass. AQUA(b,h). 1220-1370 m. c. VI-VII.
- Phleum alpinum** L. subsp. *alpinum* [*P. commutatum* Gaud.] Flèum alpí. Fleo alpino. Fléole des Alpes. Alpine cat's-tail. AQUA(m)/PRAT(h). 1620-2600 m. c. VI-VIII.
- Phleum phleoides** (L.) Karsten Cua de rata. Fleo alargado. Fléole de Boehmer. Boehmer's cat's-tail. PRAT. 1200-1800 m. c. VI-VIII.
- Phleum pratense** L. subsp. *pratense* Flèum de prat. Fleo de prado. Fléole des prés/Fléole bulbeuse. Timothy. PRAT(h). 1200-1800 m. cc. VI-VIII.
- Phleum rhaeticum** (Humphries) Rauschert [*P. alpinum* subsp. *rhaeticum* Humphries; *P. alpinum* auct. non L.] . -. -. -. -. ERROR.
- Poa alpina** L. Poa alpina. Poa alpina. Pâturin des Alpes. Alpine meadow-grass. PRAT(h). 1300-2600 m. cc. VI-VIII.
- Poa annua** L. subsp. *annua* Pèl de bou. Espiguilla. Pâturin annuel. Annual bluegrass. RUD. 1200- 1670 m. ccc. V-VII.
- Poa cenisia** All. [*P. cenisia* subsp. *sardoa* Schmid; *P. fontqueri* Braun-Blanq.; *P. distichophylla* Gaud.]
-. Poa cenisia. Pâturin du mont Cenis. -. ROC(t). 2000-2800 m. c. VII-VIII.
- Poa chaixii** Vill. -. Poa de montaña. Pâturin de chaix. -. PRAT(ac). 1700-2500 m. r. VII-VIII.
- Poa compressa** L. -. -. -. PRAT(s,a). 1230-1620 m. r. VI-VII.
- Poa glauca** Vahl subsp. *glauca* [*P. nemoralis* L. var. *glaucantha* (Gaudin) Reichenb. et Reichehn.] - Poa de color verdemar. Pâturin glauque. Glaucous Bluegrass. Error. LOC.PROP.
- Poa laxa** Haenke subsp. *laxa* Poa laxa. -. -. -. ROC(t,r,ac). 2400-2700 m. VII-VIII.

- Poa nemoralis** L. [*P. debilis* Thuill.] Espigueta de bosc. -. Pâturin des bois. Wood bluegrass.
var. *nemoralis* BOSC(h). 1200-1800. ccc. VI-VII.
var. *firmula* Gaudin. BOSC(h). 1240 m. rrr. VI.
var. *glaucantha* (Gaudin) Reichenb. et Reichebn. F. Citada a ROC(r,m). 1280 i 2450 m. c. VII-VIII, correspondria a *Poa glauca* Vahl (Vadés & Scholz,)
Poa pratensis L. subsp. *pratensis* [*P. pratensis* var. *angustifolia* (L.) Sm.; *P. angustifolia* L.; *P. pratensis* subsp. *angustifolia* (L.) Dumort.] -. Poa de prado. Pâturin des prés. Kentucky bluegrass. PRAT/RUD(t). 1200-2120 m. ccc. V-VIII.
Poa supina Schrader [*P. annua* subsp. *varia* Gaudin; *P. annua* subsp. *supina* (Schrader) Link] Poa supina. -.-. RUD(t). 1600-2100 m. c. VI-VIII.
Poa trivialis L. subsp. *trivialis* -. Poa comú. Pâturin commun. Rough meadow-grass. PRAT(h)/AQUA(j)/RUD(h). 1200-2100 m. ccc. VI-VIII.
×**Schedololium loliaceum** (Huds.) Holub [*Schedonorus pratensis* × *Lolium perenne*; *Festuca* × *loliacea* Huds.; ×*Festulolium loliaceum* (Huds.) P. Fourn.; *Festulolium* × *ascendens* Asch. & Graebn.] RUD(t). 1250 m. rrr. VII.
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. subsp. *arundinaceus* [*Festuca arundinacea* Schreb.; *F. elatior* L. subsp. *arundinacea* (Schreb.) Hackel] Festuca arundinàcia. Festuca carrizo. Fétueque faux roseau. -. PRAT(t)/RUD(t). 1220-2020 m. ccc. VI-VIII.
Schedonorus giganteus (L.) Holub [*Festuca gigantea* (L.) Vill.] Festuca gegantina. Festuca gigante. Fétueque géante. -. BOSC(r). 1240 m. rrr. VII.
Schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv. subsp. *pratensis* [*Festuca pratensis* Huds. subsp. *pratensis*; *F. elatior* subsp. *pratensis* (Huds.) Hack.] Festuca pratense. Festuca de prado. Fétueque des prés. -. PRAT(h). 1240-1480 m. c. VI-VII.
Sesleria caerulea (L.) Ard. [*S. albicans* Schult.; *S. coerulea* (L.) Ard. subsp. *calcarea* (eelak) Hegi; *S. calcarea* (Pers.) Opiz; *S. varia* (Jacq.) Wettst.] Seslèria. -. Seslèria bleue. Blue moor grass. PRAT/BOSC(r) (ca). 1250-2200 m. cc. V-VII.
Setaria viridis (L.) P. Beauv. Serreig verd. Almorejo. Sétaire verte. Green bristle grass. ARV/RUD. 1200-1980 m. c. VII-IX. AL/ESP.
Sorghum halepense (L.) Pers. - Canyota. RUD(h),PRAT. rr. 1200-1220 m. AL/ESP.
Sporobolus indicus (L.) R. Br. [*S. poiretti* (Roem. et Schultes) Hitchc.] Cua de rata. Esporobolo. Sporobole tenace. -. RUD(t). 1240-1360 m. rr. VIII-IX. AL/AC.
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. subsp. *flavescens* [*Trisetaria flavescens* (L.) Maire] Fromental petit. Trisetaria dorada. Avoine dorée. Smut grass. PRAT(h). 1230-1810 m. c. VI-VII.
Vulpia ciliata Dumort. subsp. *ciliata* -. Vulpie ciliée. Bearded fescue. PRAT(r). 1240 m. rrr. VI.
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. subsp. *myuros* [*V. megalura* (Nutt.) Rydb.] Cua de guilla, pèl de boc. Vulpia fina. Vulpie queue-de-rat. Annual fescue. PRAT(a). 1240-1360 m. r. VI-VIII. rr.
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. subsp. *sciuroides* (Roth) Rouy [incl. *V. bromoides* (L.) Gray; *V. muralis* (Kunth) Nees] Cua de guilla, pèl de boc. Vulpia fina. Vulpie queue-de-rat. Annual fescue PRAT(a). 1220 m. rrr. VI.

Tofieldiaceae

- Tofieldia calyculata** (L.) Wahlenb. Tofièldia. -. Tofieldie calyculée. -. AQUA(m,j). 1630-1980 m. rr. VI-VII.

Typhaceae

- Sparganium erectum** subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz. & Thell. Bova borda. Espadaña erizo. Rubanier dressé. Branched Bur-reed. AQUA(cr). 1200 m. rrr.VII.
Typha latifolia L. Balca de fulla ampla. Enea. Massette à larges feuilles. Broad-leaved cat-tail. AQUA(cr). 1230 m. rrr. VI.

AGRAÏMENTS

En Jean-Marc Lewin i en Miquel Àngel Marcer han aportat informació inèdita d'alguns tàxons d'aquesta llista.

BIBLIOGRAFIA

- AYMERICH, P. & SÁEZ, LL.** 2021. *Llista Vermella de la flora vascular de Catalunya*. Actualització any 2020. Monografies de la Institució Catalana d'Història natural, 3.
- BOLÒS, O. & J. VIGO** 1984-2001. *Flora dels Països Catalans*. Vol. 1-4. Ed. Barcino. Barcelona.
- BOLÒS, O.; VIGO, J.; MASALLES, R.M. & NINOT, J.M.** 2005. *Flora Manual dels Països Catalans*. Ed. 3. Edicions 62. Barcelona.
- BRAUN-BLANQUET, J.** 1945. Notes critiques sur la Flore des Pyrénées Orientales. *Com. SIGMA*, 87: 219-236.
- BRAUN-BLANQUET, J.** 1948. La végétation alpine des Pyrénées orientales. *Mon. Estac. Est. Pir. & Inst. Esp. Edaf. Ecol. Fisiol. Veg.* 9. Barcelona.
- BUBANI, P.** 1987-1902. *Flora pyrenaea per ordines naturales gradatim digesta*. Vol. I-IV.
- CANALS, J.; GONZÁLEZ-PRAT, F. & HERNÀNDEZ, J.** 2016. *Orquídies del Ripollès*. Institutió Catalana d'Història Natural.
- CASANOVAS I POCH, L.** 1991. Estudi sobre l'estructura i l'ecologia de les mollereres pirinenques. Tesi Doctoral. Inèdit.
- CADEVALL, J. I COL-LABORADORS, 1913-1937.** *Flora de Catalunya*, 6 vols. Institut d'Estudis Catalans.
- COMPANYÓ, L.** 1864. *Histoire Naturelle du département des Pyrénées Orientales*. T. II. Règne végétal.
- COSTA, A.C.** 1864. *Introducción a la flora de Cataluña*. Imprenta del diario de Barcelona. Barcelona.
- COSTA, A.C.** 1877. *Suplemento al Catálogo razonado de plantas fanerógamas de Cataluña*. Imprenta Barcelonesa. Barcelona.
- DEVESA, J.A.; CATALAN, P.; MULLER, J.; CEBOLLA, C. & ORTUNEZ, E.** 2013. Checklist de *Festuca L.* (*Poaceae*) en la Península Ibérica. *Lagascalia* 33: 183-274.
- FOGGI, B., G. PAROLO, P. SMARDA, A. COPPI, L. LASTRUCCI, D. LAKUSIC, R. EASTWOOD & G. ROSSI** 2012. Revision of the *Festuca alpina* group (*Festuca section Festuca, Poaceae*) in Europe. *Bot. J. Linn. Soc.* 170: 618-639.
- FONT, X.** 2023. Mòdul Flora i Vegetació. Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya i Universitat de Barcelona. <http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html>
- GAUTIER, G.** 1897. *Catalogue raisonné de la flore des Pyrénées-Orientales*. Publication de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. Perpignan.
- GUARDIOLA BUFÍ, M.** 2019. *Herniaria alpina* (*Caryophyllaceae*) in the Iberian Peninsula. *Anales Jard. Bot. Madrid* 76.
- GUARDIOLA, M., M. ALABAU, X. OLIVER, J. CARRERAS & L. SÁEZ** 2018. Distribució i ecologia d'*Arenaria maschlinii* (*Caryophyllaceae*) als Pirineus. *Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.* 82: 167-170.
- GRUP DE FLORA DE SETCASES, 2022.** Una mirada botànica pels camins de Setcases. *Guia d'itineraris i excursions naturalistes*, 3. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural, Institut Botànic de Barcelona, Grup de Muntanya Vall de Caprodon i Ajuntament de Setcases.
- LEWIN, J.M.** 2017. Contribution à la connaissance des orobanches du département des Pyrénées-Orientales; *Mycologie et Botanique*. Bulletin, 32.
- LEWIN, J.M.** 2018. Compléments à la connaissance de la flore des Pyrénées-Orientales (suite 2). *Mycol. Bot. Bull. Soc. Mycol. Bot. Catalogne Nord* 33: 46-52.
- LEWIN, J.M.** 2020. Nouvelles contributions à la flore des Pyrénées-Orientales - Observations 2019-2020. *Mycol. Bot. Bull. Soc. Mycol. Bot. Catalogne Nord* 35: 39-52.
- LEWIN, J.M. & J. M. TISON** 2016. Redécouverte de *Hieracium compositum* Lapeyr. *Mycol. Bot. Bull. Soc. Mycol. Bot. Catalogne Nord* 31: 59-62.
- MATEO, G.** 2005. Aportaciones al conocimiento del género *Hieracium* L. en España, X. Novedades para el Pirineo Catalán. *Fl. Montiberica* 31: 62-69.
- MATEO, G.** 2006A. Aportaciones al conocimiento del género *Pilosella* en España, VII. *Fl. Montiberica* 32: 51-71.
- MATEO, G.** 2006B. Revisión sintética del género *Hieracium* L. en España, I. Secciones *Amplexicaulia* y *Lanata*. *Fl. Montiberica* 34: 10-24.
- MATEO, G.** 2007A. Revisión sintética del género *Hieracium* L. en España, III. Secciones *Oreadea* y *Hieracium*. *Fl. Montiberica* 35: 60-76.
- MATEO, G.** 2007B. Revisión sintética del género *Hieracium* L. en España, IV. Sect. *Prenanthoidea*, *Glutinosa*, *Barbata*, *Intybacea*, *Italica* y *Eriophora*. *Fl. Montiberica* 37: 47-62.
- MATEO, G.** 2008. Revisión sintética del género *Hieracium* L. en España, V. Sect. *Cerinthoidea*. *Fl. Montiberica* 38: 25-71.
- MATEO, G. & F. EGIDO** 2017A. Novedades sobre el género *Pilosella* Hill en España, IV. *Fl. Montiberica* 66: 145-153.

- MATEO, G. & F. EJIDO** 2017. Estudio monográfico sobre los géneros *Hieracium* y *Pilosella* en España. Con referencias a Portugal y los Pirineos franceses. *Fl. Montiberica Monogr.* 20: 1–422.
- NÈGRE, R., BAUDIERE, A. & SERVE, L.** 1982. Approche analytique sur les groupements à *Festuca paniculata* est-pyrénéens. *Doc. Phytosoc.* 6: 443–475.
- NÈGRE, R. & SERVE, L.** 1979. Prospection dans les groupements à *Festuca eskia* en Pyrénées Orientales. *Doc. Phytosoc.*, IV: 731–756.
- OLIVER, X.** 2021. Catàleg d'hàbitats de la Garrotxa i del Ripollès, 2021. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural. Inèdit.
- OLIVER , X.** 2021. Programa de Seguiment i de Conservació de la Flora amenaçada de la Garrotxa i del Ripollès, 2021. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural. Inèdit.
- OLIVER, X.** 2021. Informe sobre l'evolució de la Flora amenaçada de la Garrotxa i del Ripollès, 2020. *Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 11: 5–68.
- OLIVER, X.** 2021. Programa de Seguiment i de Conservació dels hàbitats de la Garrotxa i del Ripollès, 2021. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural. Inèdit.
- OLIVER, X. 2013; 2017; 2021.** Llista vermella de la flora vascular del Ripollès, 2013, 2017, 2021. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural. Inèdit.
- OLIVER, X. 2020, 2021 i 2022.** Catàleg sintètic de flora vascular de la vall del Catllar, El Ripollès. *Catàlegs vius de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*. Apatura Iris.
- OLIVER, X. 2021.** Catàleg sintètic de flora vascular de Setcases. *Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 10: 133–194.
- OLIVER, X. 2022.** Evolució dels hàbitats de la Garrotxa i del Ripollès, 2022. *Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 12: 3–84.
- OLIVER, X. 2023.** Catàleg sintètic de flora vascular de Setcases, el Ripollès, 2023. *Catàlegs vius de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 2023.
- OLIVER, X. 2023.** Catàleg sintètic de flora vascular del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. *Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 12: 149–216.
- SÁEZ, L.** 1997. Atlas pteridològic de Catalunya i Andorra. *Acta Bot. Barcinon.* 44: 39–167.
- SÁEZ, L.** 2000. El complex d'*Asplenium trichomanes* L. (Aspleniaceae) al nord-est de la península Ibèrica. *Orsis* 15: 27–43.
- SÁEZ, L.; AYMERICH, P. & C. BLANCHÉ** 2010. *Llibre Vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya*. Arganía Editio. Barcelona.
- SÁEZ, L. & MATEO, G.** 2016. The genus *Hieracium* (Asteraceae) in Catalonia (northeastern Iberian Peninsula, Spain). *Fl. Montiberica* 65: 88–121.
- SÁEZ, L. & AYMERICH, P.** 2021. *An annotated Checklist of the Vascular Plants of Catalonia (northeastern Iberian Peninsula)*. <https://bibdigital.rjb.csic.es/>.
- SUSPLUGAS, J.** 1942. Le sol et la végétation dans le haut Vallespir. *Com. SIGMA*, 80.
- TELA BOTANICA,** 2021. <https://www.tela-botanica.org/>.
- THOUVENOT, L.** 1999. Catalogue des types de stations forestières du Vallespir. Tome 1: Caractères écologiques régionaux et relevés types.; DDAF. Pyrénées-Orientales,
- VALDÉS, B. & SCHOLZ, H.** 2009; with contributions from Raab-Straube, E. von & Parolly, G. (2009): Poaceae (pro parte majore). Euro+Med Plantbase. <http://emplantbase.org/home.html>
- VAYREDA, E.** 1879. Plantas notables por su utilidad o rareza que crecen espontáneamente en Cataluña. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 8: 345–462.
- VAYREDA, E.** 1880. Plantas notables por su utilidad o rareza que crecen espontáneamente en Cataluña. Segunda parte. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 9: 53–130.
- VAYREDA, E.** 1882. Nuevos apuntes para la flora catalana. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 11: 41–151.
- VAYREDA, E.** 1902. Plantas de Cataluña. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 30: 491–582.
- VAYREDA, E.** 1882. *Catalech de la flora de la Vall de Núria*. Kessinger Publishing.
- VIGO, J.** 1983. Flora de la vall de Ribes. I. Generalitats. Catàleg florístic. *Acta Bot. Barcinon.* 35: 1–793.